



DODONÆI

1581

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1822/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1822/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1822/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1822/A

1822

A

4171

72804 (11)

REMBERTI DODONAEI MEDICI

CAESAREI,
MEDICINALIVM
Observationum exempla rara, re-
cognita & aucta.

*ACCESSERE ET ALIA
quaedam, quorum Elenchum pagina
post Praefationem exhibet.*



COLONIAE 94
Apud Maternum Cholinum.

M. D. LXXXI.

Cum Gratia & Privilegio Cas. Maiest.

SVMMA PRIVILEGII.

SA C R Æ Cæs. Maiestatis Priuile-
gio cautum est, ne quis Tyogra-
phus aut librarius præter expressum
consensum ac voluntatem Remb.
Dodonæi Medicinalium suarum Ob-
seruationum exempla rara in sacro
Romano Imperio, ac alijs quibuscun-
que suæ Maiestatis Regnis & Domi-
nijs imprimat, alibique impressa infe-
rat aut distrahat, sub pœna in diplo-
mate expressa. Dato Pragæ Anno 1530.
Augusti die XI.

Subsig.

Rudolphus.


*Ad mandatum Sacra Cæs.
Maiestatis proprium.*

S. Vieheuser.

A. Erstenberger.

REVERENDISSIMO
AC ILLVSTRISSIMO DOMI-
NO, DOMINO DANIELI ECCLE-
siæ Moguntinensis Archiepiscopo, Sacri
Rom. Imp. per Germaniam Can-
cellario, Principi Ele-
ctori, &c.

Remb. Dodonaus Medicus S.

 ^{ma} T E R V M R. D.
V. Reuerendis-
sime ac Illustris-
sime Princeps
Medicinalium
observationum exempla, nostra
se insinuant: Iterum patrocini
R. D. V. fauorem ambiunt, su-
periore videlicet anno R. D. V.
dedicata atq; inscripta, sed ea-
dem nunc auctiora, recognita,
& scholijs aliquot amplificata:
A 2 deinde

EPISTOLA

deinde & alijs sociata comiti-
bus. Vitis siquidem ac nonnul-
larum herbarū Historias, quæ
additæ fuerunt, nostræ de stir-
pium Historia Pemptades re-
petundarum lege restitui sibi
postulant, nec diutius auelli pa-
tiuntur. ad has etenim perti-
nent, ac suis locis ipsis inserendæ
sunt. Harum autem loco nunc
alijs successerunt, haud dissimi-
les, sed eiusdem omninò condi-
tionis & argumenti, fidi ac ido-
nei sodales. Unus est Antonij
Beniuenij Florentini Medici
ac Philosophi sua ætate clarissi-
mi, de abditis nonnullis ac ad-
mirandis morborum & sana-
tionum

DEDICATORIA.

tionum causis liber: rara quoque
 exempla continens ab ipso dili-
 genter observata, fideliterque cō-
 scripta. Potuissimus multa ex
 ijs, quæ ipse prior diligenter an-
 notavit, in nostras observatio-
 nes transtulisse ac inseruisse, no-
 bis quoque comperta. sed quia ab
 ijs abstinendum duximus, quæ
 ab alijs ante nos prodita sunt,
 annotationibus Beniuenij libro
 additis, quædam & illorum no-
 bis visa ac observata indicare
 ac referre visum fuit, sic & Be-
 niuenij auctoritatem augen-
 dam, & nobis fidem facilius ad-
 hibendam rati. Accesserunt ve-
 rò & præter Beniuenij scripta

A 3

&

EPISTOLA

Et quædam rarissima ex libris
 Valesci Tarantani, ac Alex-
 andri Benedicti, quibus quàm
 admirabilia Dei ac Naturæ
 sint opera ostenditur. Postremò
 adiectæ aliquot Historiæ sunt
 gestationis fœtus mortui in
 utero materno, quæ non mi-
 nus, imò plus admirationis ha-
 bent, quàm præcedentia exem-
 pla. Hæc autem in unum libel-
 lum contracta R.D.V. humili-
 ter offerimus ac deuotè dedica-
 mus. Nactus fuit libellus supe-
 riore anno sub R.D.V. patroci-
 nio in lucem missus, gratiam ac
 fauorem, citò multis exempla-
 ribus distractis. Qua de causa
 hunc

DEDICATORIA.

*hunc eundem auctiorem (ut
diximus) factum, & doctis so-
dalibus comitatum, iterum
R. D. V. patrocínio ac tutelæ
commendamus. Deus Opti-
mus Maximus R. D. V. di-
utissimè sanum saluumq̃
conseruet. Colonia.*

Anno 1581.

A 4

REMBER.

REMBERTVS DO-
DONAEVS LECTORI
SALVTEM.



*Q*UANTVM ad omnium ar-
tium notitiam, amice Lector ex-
perientia conferat, quantum vsus
& exercitatio valeant, ex co ma-
nifestissimum ac evidens est, quod
nulla sit non modo ars, sed nec scientia qua non
vsu experientiaq; inuenta, ab ipsis quoque incre-
mentum accipiat. Ars etenim tunc existit, cum
ex multis experientia observationibus, una de
rebus singulis nascitur notitia, ut in Metaphysi-
cis Aristoteles tradit: experientia autem ex me-
moria, eodem auctore procedit. Multa enim, in-
quit, eiusdem rei memoria, unius experientia
vim efficiunt. Galenus verò experientiam non
modo memoriam, sed & observationem eorum
esse ait, qua sapè eodem modo comperta & per-
fecta sunt. Hac autem citra exercitationem con-
sequi nequeunt. Quid si quidem observare pote-
rit, cuius tandem memoriam habebit, qui exer-
citatione caret? Habet in omnibus momentum
exercitatio maximum, quaecunque obscura, cog-
nitu difficilia, hac dilucida ac facilia reddit. Si
quis hanc negligat, inquit Galenus, etiam optimo
præditus ingenio, nunquam tamen illis melior
artifex euadet, qui ingenij dotibus inferiores, ex-
erci-

AD LECTOREM .

exercitatione & studio superant: His verbis quantum exercitationi ac experientiae in quavis arte tribuendum, ostendere volens. Quod etsi ita se habeat, ac nulla sit ars, in qua non exercitatio & memoria in primis sint necessariae: tamen in nonnullis amplius ac magis, quam in plerisque desiderari videntur: veluti in his, quae non ex penitus cognitis ac plenè perspectis, & nunquam fallentibus rebus continentur. Cuiusmodi ars est medica, in qua pleraque incerta, multa latentia non satis perspecta, quae coniectura quadam, artificiali tamen, subinde magis quàm ratione assequi datur. Naturalium etenim rerum notitiam haec ars coniunctam habet, & de his quae in aperto haud sunt, sed latent ac conspectum fugiunt, iudicat. Rerum autem naturae notitia, nec facilis, nec expedita. Nam praeter quod adeo innumera ac infinita sint à Deo Opt. Max. creata, ut nec ingenio comprehendere, nec hominis aetas ad cognoscendum sufficiat, multorum etiam facultates tales sunt, ut non ex sensilibus qualitatibus, sed per solam experientiam cognoscantur: ut sunt quae essentiae proprietatem ac substantiae formam consequuntur. Ad quarum notitiam comparandam diligenti observatione ac exercitio in primis opus est. Desiderantur & eadem, ut de internis ac latentibus humani corporis affectibus rectè iudicetur. Non modò autem quae corporis pars laboret, cognoscere satis est, sed quales sint morbi sine

A S

affectus

EPISTOLA

*affectus, & quid expectandum, qualiter finiendi
 praescire expedit brevisne videlicet, an longus fu-
 turus sic moribus, salutarisne, an exitialis, per
 crisin, aut alio modo terminandus. Quomodo au-
 tem haec sciri queant, multis Hippocratis ac Ga-
 leni scriptis docetur. Extant illius Aphorismi,
 praedictionum ac praeotionum varij libri, tum
 & de morbis inscripti: Galeni de affectorum lo-
 corum notitia, de crisibus, & alij eiusmodi. In
 quibus clarè ac dilucidè quomodo praesentes sin-
 gularum partium affectus agnosci queant, doce-
 tur, & quid in singulis expectandum, quidue fu-
 turum, ostenditur. Non tamen tam exquisitè, ut
 non quandoque medicum falli contingat. Nam
 & exercitissimus etiam medicus, ac in artis
 operibus diutissimè versatus, quantumvis acri
 ingenio praeditus, veritatem quandoq; haud asse-
 quitur. Proinde non temerè κρείσς καλεπὴ siue
 iudicium difficile in Aphorismorum initio ab
 Hippocrate asseritur, qui etiam se senem verita-
 tem haud assequutum & deceptum fuisse ingenuè
 agnoscit: lib. 5. de morbis popularibus. Atque ex
 his manifestum, experienciā, longi temporis exer-
 citationem, haud fallibilē memoriā, in medico vel
 plurimum requiri. Tantum abest, ut vel citra ex-
 ercitationem, vel paucorum annorum studiis ars
 comprahēdi queat: ut nonnulli somniantes aut ci-
 tius delirantes sibi persuadent. Fieri tamen potest,
 ut ab huiuscemodi medicis nonnulli curētur, sed
 fortu-*

AD LECTOREM.

*fortuna (quæ ubiq; plurimum etiam potest) nō ar-
tis sciētia aut industria. Tale enim aliquid ipsis
cōtingit, quale navigādi haud peritis nautis. Se-
cundo vento dū hi vela laxant, propitio flumine
aut mari navigant, ac calū sudū est, nullaq; tem-
pestates suboriuntur, etiā delinquētes ac negligē-
tius navim dirigētes, in errore nō deprehendun-
tur, & aequē portū ac periti assequuntur. Sed cum
ventorum turbines omnia perturbant, seuiunt
tēpestates, fluctibus naues iactantur, tum demum
quā imperiti, et quā dirigende regendeq; na-
vis parū experti deprehenduntur. Haud aliter sa-
nē cū nō exercitatis medicis agitur. Quādo enim
homines nihil graue patientes, neq; aliquo magno
morbo occupatos curant, etiam à recta methodo
subinde deviantes, nō cito deliquisse deprehendū-
tur, imo dum errore quodam morbi protrahunt,
ad sanitatem agro reuerso magnū aliquid præsti-
tisse putātur. Vbi autem vehemens difficilis mor-
bus huiusmodi hominibus curandus cōtingit, tūc
demum illorū ignorantia sese prodit, dum veluti
palantes nunc huc, nunc aliō consilia sua dirigunt:
nec quod statuāt ac definiāt, certi habēt quicquā.
Atq; sic demum illorum manifesta sic imperitia:
& quantū experientia medico conferat, diligensq;
multorum observatio conducat, palām apparet.
Quæ omnia Medicina Princeps Hippocrates
diligenter considerans ac expēdens, tum & vete-
res illi, qui vel filij vel discipuli, nonnullorū libro-
rum,*

EPISTOLA

rum, ut existimatur, auctores, qui huius nomine
 ascribuntur, non satis habuerunt, multis praecep-
 tionibus artem docuisse, sed & exempla addi ope-
 raprecium rati sunt: & iam eorū, quae circa mu-
 tationes aëris ac temporum constitutiones, quā-
 penes egrotantes diligenter ab ipsis considerata ac
 observata, veluti libri, ἐπιδημιῶν, siue de morbis
 popularibus, manifeste ostendunt: exemplis utri-
 usque generis abundantes. Hoc autem modo nec
 exigua, nec infrugifera arti medica accessio facta
 est. Exemplis siquidem, partim quae praeceptioni-
 bus continentur, facilius in memoriam reuocan-
 tur, aut ob oculos posita eidem citius commendan-
 tur: partim verò ad nouas praeceptiones via para-
 tur. Ubi etenim eadem saepius observata fuerint
 similia, tandem praeceptum ac regula nascitur.
 Nam artem experientia facit exemplo monstran-
 te viam. Veterum horum laudabile istud insti-
 tutum nonnulli posterioris ac nostrae aetatis viri
 doctissimi imitati sunt, qui ab ipsis diutina exer-
 citatione cognita, editis scriptis studiosis commu-
 nicarunt. rara quidem & abdita, quorum in an-
 ecessorum scriptis similia haud extant. In horum
 numero vel primus occurrit Antonius Benue-
 nius medicus sua aetate admodum celebris, qui
 rarissimarum aliquot observationum libellum
 reliquit, titulum cui fecit: De abditis nonnullis,
 ac mirandis morborum & sanationum causis.
 Alexander Benedictus paucula quaedam etiam
 exem-

AD LECTOREM.

exempla suis libris rarissimorum casuum inseruit: quemadmodum & Valescus Tarantanus olim, & in suo de medendis morbis Philonio. Iacobus Hollerius, & Valleriola viri doctissimi observationes quoque suas haud vulgares ediderunt. Clarissimus Ioannes Fernellius tamen si de industria huiusmodi argumentum non videatur tractasse, in libris tamen de partium morbis & symptomatis quosdam refert affectus, quales apud nullum alium descripti reperiuntur. In eodem autem ac simili argumento nos nunc versamur, clarissimos ac doctissimos viros si non assequi, saltem subsequi aliquo conantes modo. Scripsimus idcirco & nonnulla de admirandis, nec passim obuijs affectibus, quos supra quadraginta annos, quibus in artis exercitio versamur, observatos habemus. Potuissimus plura exempla adferre, sed ab ijs libenter abstinuimus, quæ alij ante nos descripserunt. Hæc verò à nobis litteris mandata, licet fortassis opinionem ac fidem superare videantur, sic tamen se habuisse affirmare verè possumus. Cum autem hæc medicinalium observationum exempla, iam secundo in lucem ventura erant, ipsa recognouimus, & non exigua accessione locupletauimus, ac additis scholijs etiam illustrare studuimus. Adiunximus verò & his similis argumenti librum Antonij Beniuenij Medici Florentini, cui titulum ipse fecit, De abditis morborum & sanationum causis:

cum

EPIST. AD LECTOREM.

*cum paucis aliquot annotationibus nostris : ac
deinde & exempla quædam ex Valesci Taran-
tani, & Alexandri Benedicti libris transcri-
pta, rara ceriè & admiranda quoque. quibus ac-
cesserunt & Historia aliquot gestationis in
utero fœtus mortui Matthiæ Cornacis, Egi-
dij Hertogij, & Achillis Gassari: quæ rarissi-
mè contingentibus non temerè annumeranda
sunt. His autem qualibuscunque be-
nignè ac feliciter fruerè*

Anno 1581.

(:.)

ELEN.

ELENCHVS EORVM
QV AE HOC LIBRO
continentur.

Remb. Dodonæi Medici Cæsarei Medicinalium obseruationum exempla rara aucta & recognita, scholijsque amplificata.


Antonij Beniuenij Florentini Medici & Philosophi, de abditis nonnullis ac mirandis morborum ac sanationum causis cum Annotationibus Dodonæi.

Medicinalium obseruationum exempla rara Valesci Tarantani, & Alexandri Benedicti.

Historiæ gestationis foetus mortui in utero, Matthiæ Cornacis Rom. Regis Medici, Aegidij Hertogij Medici, Achillis Gassari Medici.

Physiologices Medicinæ partis, Tabulæ expeditæ per Rembertum Dodonæum olim conscriptæ, nunc primum editæ.

*Apollonij Menabeni Tr. de Alce
Historia Cerui ranguiferi
Dodonæi de Alce Epistola*



AVCTORES QVI IN
MEDICINALIVM OBSER-
VATIONVM EXEMPLIS, AC IN
*eorundem scholijs, tum & in annotationi-
bus Beniueni citantur.*

Aëtius.	Hieronymus Fraca-
Albucaſis.	ſtorius.
Alexander Benediſt.	Hippocrates.
Amatus Luſitanus.	Iacobus Hollerius.
Andreas Veſalius.	Ioannes Fernellius.
Antonius Beniuenius.	Ioannes Langius.
Archigenes apud Aë-	Leonidas apud Aëti-
tium.	um.
Auicenna.	Martinus Akakia.
Bernard ⁹ Gordonius.	Matthias Cornax.
Cœlius Aurelianus.	Michaël Sauonarolus
Conradus Geſnerus.	Paulus Aegineta.
Cornelius Celfus.	Rhaſis.
Cornelius Gemma.	Suſdas.
Galenus.	Valeſcus Tharanta-
Guido de Cauliaco.	nus.
Guilhelmus Salicetus	

A

HIPPO.

HIPPOCRATIS APHO-
RISMI, QUI VEL IN OBSER-
VATIONVM MEDICINALIVM EX-
emplis, vel in eorundem scholijs, aut anno-
tationibus Dodonæi, citantur, vel
breuiter enarrantur.

Lib. 2.	42.	Soluere Apoplexiam fortem.	
		fol. 21. & 23.	
3.	12.	Si vero hyems.	fol. 25
4.	11.	Quibus tormina.	97
5.	1.	Convulsio ex helleboro.	211
	3.	Vbi sanguis plurimus.	205
	13.	Quicumque spumosum.	60
	33.	Menstruis deficientibus.	38
	34.	Mulieris sanguinem.	67
	40.	Quibuscunque mulieribus.	28
6.	37.	Ab Angina.	39
	48.	Lienosis	222
7.	51.	Quibus cerebrum sphacelatū.	6
	60.	Quibus cerebrum aliqua.	2

RERVM

RERVM ET VERBO-
RVM MEMORABILIVM
in obseruationum medici-
narium exemplis
Index.

A.

A <i>Bdominis musculorum inflammatio.</i>	
70	
<i>Abscessus mesenterij.</i>	185
<i>Abscessus ossium.</i>	299
<i>Abscessus tonsillarum foras erumpentes.</i>	38
<i>Abscessus Theriaci apertus.</i>	237
<i>Acus assumpta per urinam reddita.</i>	170. &
300	
<i>Acus perforato stomacho exit.</i>	169
<i>Alapa mortuus.</i>	285
<i>Alui excrementa intra peritoneum collecta</i>	90
<i>Aneurisma.</i>	122
<i>Angina difficilis.</i>	41.45.192
<i>Angina incisa.</i>	192
<i>Ano clauso natus.</i>	181.183
<i>Apoplexia fortissima qualis.</i>	19.21.23
<i>ab Aqua inter cutem curata.</i>	285
<i>Aqua inter cutem.</i>	156
<i>laborans rusticus liberatur.</i>	157
<i>Aqua inter cutem: vide Hydrops.</i>	
<i>Aqua potu frigidissimo homo perit.</i>	163

A 2

Arteria

INDEX.

<i>Arteria incisa.</i>	206.207
<i>Ascites.</i>	159
<i>Aurium vermes.</i>	290
B.	
<i>Brachium ab humero diductum.</i>	250
C.	
<i>Calculo euulso mulier sanata.</i>	112.248
<i>Calculus spontè excidens.</i>	112.246
<i>Calculi in vesica XII.</i>	111
<i>Calculus in vesica spontè ruptus.</i>	108
<i>Calculus pulmonis.</i>	57.176.
<i>vide Lapis.</i>	
<i>Calidior humore caput petente puella mortua.</i>	
269	
<i>Callus in arteria cordi vicinus.</i>	190
<i>Callus in mesaraicis.</i>	191.192
<i>Callus ventriculi.</i>	191
<i>Claudus ex casu liberum gressum recepit.</i>	214
<i>Clausus anus.</i>	181.183.255
<i>Clausum intestinum.</i>	184
<i>Clausura naturalia.</i>	180.183
<i>Capitis vulnus.</i>	4.5
<i>Capitis os erosum.</i>	166
<i>Capilli nigri post casum capillorum canorum.</i>	
291	
<i>Catalepsis.</i>	12.276
<i>Catarrhus suffocans.</i>	24.25
<i>Catochus.</i>	9.12.15.204.276
<i>Catochus absque feбри.</i>	13
<i>Catochus ex vermibus.</i>	295
<i>Catochus in senē.</i>	16
	Carci-

INDEX.

<i>Carcinomate exagitato mors sequuta.</i>	239
<i>Carnis frustulum eiectum.</i>	257
<i>Caros quid sit.</i>	19
<i>Caruncula in meatu penis.</i>	103
<i>Cerebri concussio.</i>	1.2.5.294
<i>Cerebrum punctim laesum.</i>	7
<i>Cerebrum spaciellatum.</i>	6
<i>Cochlearia.</i>	83
<i>à Cœliaco morbo curatus.</i>	280
<i>Cœliacus morbus qualis sit.</i>	282
<i>Coles incisus non potuit sanari.</i>	233
<i>Colum intestinum flatu distentum.</i>	95
<i>Coma agrypnon.</i>	12
<i>Comitialis morbus.</i>	202.203.266
<i>Conuulsio ex utero.</i>	267
<i>Conuulsiones pueris à lumbricis.</i>	262
<i>Cordis arterie tuberculum adnatum.</i>	189
<i>callus adnatus.</i>	190
<i>Cordis pars patefacta.</i>	197
<i>Cordis tunica lesa curata.</i>	229
<i>Cor pilis refertum.</i>	251.252
<i>Cornu è vulnere natum.</i>	200

D.

<i>Dentes noui vetula nati.</i>	291
<i>Destillatio quandoque citò interimit.</i>	25
<i>Diabetes.</i>	107
<i>Dysenteria.</i>	264
<i>Dysenteria à quartana aliquando liberat.</i>	221.
	222

<i>Diuretica fortia calculosis noxia.</i>	110
<i>Diureticorum intempestiuus usus periculosus.</i>	
115.	A 3 Elephan-

INDEX.

E.

Elephantia.	267
Elephantiasis Græcorum ab Arabum Elephantia differt.	125. 268
Elephantia Arabum quid sit.	125
cur sic dicatur.	269
Elephantia Arabica causa humor ad alimentum destinatus.	127
ab Elephantiasi liberatus.	172
Enterocœle.	229
Epiploocœle.	ibidem
Excrementa per pudendum muliebri reddita.	

F.

Fames valida.	215
Febris ex horrore flammæ.	225
ex Febri statim mors.	252
Femoris os erosum.	247
Fluxus oratione curatus.	200
Fœtor pestilentie quandoque remedium.	298
Fœtus in utero mortuus membratim exemptus.	
306. 324	
Fœtus mortuus XIII. annis in utero gestatus.	321.
325	
Fœtus mortui in utero gestati ossa per abscessum apertum expurgata & exempta.	332
Fons in agro Leodiensi.	51. 104. 107. 109
Fortuna nonnulli curantur.	285
Frigidissimum emplastrum mortem attulit.	161
Frigidissimo aquæ potu vir perit.	163
ex Frigidissimi vini haustu defectio.	ibidem
Frigidi lactis, cui ademptum est butyrum nocumenta	
164. 165	Frontis

INDEX.

<i>Frontis vulnere senex à cœcitate liberatus.</i>	296
<i>Fulmine attoniti.</i> G.	174
<i>Gangrana à digito pedis incipiens lethalis.</i>	68.
128.237	
<i>Gelatus.</i>	274
<i>Gemini pueri.</i>	286
<i>Genu miraculo sanatum.</i>	150
<i>Gonorrhœa venerea.</i>	103
<i>Gula abscessus.</i> H.	278
<i>Hæmorrhoides.</i>	121
<i>ex Helleboro conuulsio lethalis.</i>	211
<i>Hæmoptoe in phthisim transit.</i>	27.28
<i>Hydrocœle.</i>	98
<i>Hydrocœles periculosa sectio.</i>	102
<i>Hydrophobia à morsu canis.</i>	31.33
<i>Hydrophobia non diuturnus affectus.</i>	33
<i>Hydrope correptum bonis visceribus præditum esse oportet, si sanus fieri volet.</i>	65
<i>Hydrops.</i>	65.156.157.158
curatur aqua potione,	159
<i>Hydrops uteri.</i>	121
<i>Hydromphalon.</i>	65
<i>Hyposarca.</i>	159
<i>ex Horrore flammæ febris.</i>	225
<i>Horrore puer mortuus.</i>	227
curatus. I.	228
<i>Iecur induratum.</i>	141
<i>Inflatio uteri.</i>	120
<i>Ilei dolor.</i>	93.196.282
<i>Ileos hæmatites qualis Hippocrati morbus.</i>	87
<i>Incubus qualis.</i>	30
A 4	Insu-

INDEX.

<i>Insania.</i>	26.269
<i>Insania nocturna.</i>	29
<i>Intestino clauso vita finitur.</i>	184
<i>Intestinorum dolore mortua.</i>	188
<i>Intestinorum dolores & tormina frigidis curata.</i>	
289	
<i>Intestino graciliore scisso vita amittitur.</i>	244
<i>Intestina prolapsa ex umbilico & ex utero.</i>	144
<i>ab Intestinorum torminibus viscera erosa.</i>	264.
265	
<i>Intestinorum tunica tussi scissa.</i>	228
<i>Iocinoris vlcus.</i>	69
spacelus.	72
<i>Ischuria.</i>	114
L.	
<i>Lachryma sanguinea.</i>	37
<i>Lactis frigidi, cui ademptum est butyrum, nocu- menta.</i>	164 165
<i>Lapis ex intestinis eiectus.</i>	167.168
<i>Lapis tussi expulsus.</i>	175
<i>Lapide percussus.</i>	3
<i>Lapides in tunica hepatis.</i>	140
<i>Lapides in vesica fellis.</i>	141.263
<i>Lateris dolor in phthisi.</i>	56
<i>à Lepra liberatus per incuriam.</i>	170.171
<i>Lethargi causa.</i>	18
<i>Lethargus morbus difficilis.</i>	15.17.
<i>Lethargici pectore suppurantur.</i>	27
<i>à Lienis vitio curatus.</i>	280
<i>λιθότομος temerarius.</i>	113
<i>Lycantropia quid sit.</i>	31
Lumbrici.	

INDEX.

<i>Lumbricus latus.</i>	256
<i>Lumbrici lati acrotundi.</i>	254
<i>Lumbrici puero molesti.</i>	261
<i>à Lumbricis convulsiones.</i>	262
<i>Lues venerea.</i>	137

M.

<i>Mania.</i>	26.29.269
<i>Mania cum Melancholia affinitatem habet.</i>	29
<i>Mania in hemoptoën conuersa.</i>	27.271
<i>Matricis ventositas.</i>	120
<i>Maximos casus omnia succedunt grauiissima.</i>	3
<i>Melancholia cum Mania affinitatem habet.</i>	29
<i>Melicera pro carbunculo indicata.</i>	232
<i>Memoria amissa ac recuperata.</i>	12.204
<i>Mensibus non prodeuntibus corpora feminarum morboſa.</i>	38
<i>Menti ulcus dentis euulſione ſanatum.</i>	173
<i>Mesenterij inflammatio & abſceſſus.</i>	186.187
<i>Miraculo genu ſanatum.</i>	150
<i>liberatus.</i>	152
<i>Mola.</i>	119
<i>Mola ventoſa.</i>	292
<i>Morbus comitialis.</i>	266
<i>Morbus gallicus.</i>	129
<i>Mortui corpore aperto qua reperta.</i>	69.258
<i>Mortuus fœtus unco extrahitur.</i>	181.182
<i>Mortuus fœtus per incisionem eximitur.</i>	183
<i>Mulier vulua carens vixit annis decem.</i>	155
<i>Mulier à malo ſpiritu oppreſſa.</i>	148
<i>Mulier poſt LX. annum ter peperit.</i>	292

A S

Mutui

INDEX.

Mutus leſis nervis factus. 260

Mutus ſanguinis miſſione reſtitutus. 236

N.

Nares exulceratæ. 178

Nasturtium hortenſe. 83

Naturalia clauſa. 183

curantur. 180

Nervis leſis vox deperdita. 260

Nernorum cervicis tenſio. 276

Nernorum diſtentio. 205. 213

Nigri capilli renati poſt canorum capillorum.

caſum. 291

O.

Oculo perforato viſus reſtitutus. 242

Oris græve olentia. 62

Orthopnœa. 49

Os ſuræ reſecatam. 176

Oſſium abſceſſus. 299

Os capitis eroſum. 165. 166. 167

Oeſophagi inflammatio ab impactu piſcis oſſe.

39.

Ozæna. 179

P.

Pediſ tumor. 125

Peripneumonia popularis. 52

Peſtilenti febre correptus. 213

Petroſi oſſis fiſſura. 1

Phrenitis unde fiat. 18

Phrenitici qui dicantur. 8. 269

Pilule Iliacæ Rhæſis. 93

Plenitudo nimia ſanguinis miſſione ſanata. 235

Pulmo-

INDEX.

<i>Pulmonis calculus.</i>	57
<i>spacelus.</i>	59
<i>Pulmonis substantia in pus conuersa.</i>	43
<i>Pus per urinam redditum.</i>	198. 302

Q.

<i>Quartana accessio inclinante fit die.</i>	221
<i>Quartana accessionis diem mutat.</i>	ibidem
<i>Quartanam malè curatam sanitas & mors sequuta.</i>	218. 221
<i>Quartana morbus longus.</i>	219

R.

<i>Ramex quomodo fiat</i>	229
<i>à Ramice curatus perijt.</i>	101. 240. 241
<i>Ranunculus lingue affectus curatus.</i>	34. 35
<i>Ranunculus cum tonsillarum inflammatione curatus.</i>	35
<i>Respiratio composita actio.</i>	21
<i>Respirandi difficultas.</i>	47. 225

S.

<i>Sagitta carminibus euulsa.</i>	177
<i>Sagittæ ferrum dorso impactum post biennium per inferna descendit.</i>	303
<i>Sanguinis è brachio detractio incommode fit mulieribus ab utero affectis.</i>	15
<i>Sanguinis è gingiuis profluvium.</i>	36
<i>Sanguis glutinis modo concreescens lethalem aut diuturnum morbum significat.</i>	19
<i>Sanguinea lachryma.</i>	37
<i>Sanguinis copiosa missio qualia pericula adferat.</i>	205. 207. 216
<i>Sanguinis missione iocinoris vitiū curatum.</i>	243
<i>Sangu i-</i>	

INDEX.

<i>Sanguinis missione mutus restitutus.</i>	236
<i>Sanguinis missicne plenitudo soluta.</i>	234
<i>Sanguinis profusio vulneratis prodest.</i>	295
<i>Sanguinis ex poro fluxus.</i>	1+2.143
<i>Sanguis spumofus.</i>	59
<i>Sanguinis ex vena detracti cōsideratio.</i>	13.15.19
<i>Sanguis vite thesaurus.</i>	217
<i>Sanguinis vomitus.</i>	63
<i>Sanguinis vomitus ex liene.</i>	64.65
<i>Sanguinis vomitus ex utero.</i>	65.67.176
<i>Sanguinis cum urina exitus.</i>	80
<i>Scorbutus.</i>	81
<i>Scorpij venenum frigidum.</i>	215
<i>Scorpione ictus frigidum sudavit.</i>	ibid.
<i>Scorpius in cerebro natus.</i>	272
<i>Serapium ex Adiantho.</i>	58
<i>Sapor vigilans.</i>	12
<i>profundus.</i>	1-12
<i>Spasmo Cynico mortua.</i>	273
<i>Sphacelo correptus puer.</i>	128
<i>Sphacelus iocinoris.</i>	72
<i>pulmonis.</i>	59
<i>Spirandi difficultate mortuus.</i>	225
<i>Sternutatione teli pars reiecta.</i>	305
<i>Stomachi elenatio.</i>	195
<i>Stomachi vitium sanatum.</i>	230
<i>Strangulatio ex re in asperā arteriā delapsa.</i>	303
<i>Struma ingentis magnitudinis curatum.</i>	160
<i>Sudore represso sanatus.</i>	212
<i>Suffocationis periculum.</i>	47
<i>Superfœtatio.</i>	287
	<i>Tabes</i>

INDEX.

T.

<i>Tabes missione sanguinis curata.</i>	199
<i>Teli pars sternutatione post XXV. annos reiecta.</i>	
305	
<i>Theriaca abscessus apertus.</i>	237
<i>Tenuioris intestini morbus.</i>	282
<i>Tetanus.</i>	277
<i>Tympanites.</i>	96.97.250
<i>Tormina intestinorum frigida curata.</i>	289
<i>Tonsillarum inflammatio & abscessus.</i>	280
<i>Tuberculum supra cordis arteriam.</i>	189
<i>Tussis sanguinis missione curata.</i>	222
<i>Tussi scissa intestinorum tunica.</i>	228

V.

<i>Ulcus iocinoris.</i>	69
<i>Ulcus menti dentis euulsione sanatum.</i>	173
<i>Ulcera narium.</i>	178
<i>Venerea gonorrhœa.</i>	103
<i>Venerea lues.</i>	137
<i>Vene in naribus sectio mortis causa extitit.</i>	297
<i>ex Vento mors subsequuta.</i>	249
<i>Ventriculi ulcus.</i>	61
<i>Veratro epoto strangulatus.</i>	209
<i>ex Veratro albo mors.</i>	210.211
<i>Vermes in auribus.</i>	290
<i>Vermes Cucurbitini.</i>	255.256
<i>Vermes crucis similes.</i>	254
<i>Vermium multitudo eiecta.</i>	253
<i>Vermis è nare proiectus.</i>	271
<i>Vermis vomitu proiectus.</i>	137
<i>Vermis ex pectore propulsus.</i>	245
<i>Vermis</i>	

INDEX.


<i>Vermis in vesica.</i>	246
<i>Vini frigidissimi haustum defectio consequuta.</i>	163
<i>Virgo aliquot mensibus à cibo abstinuit.</i>	297
<i>Vir lactavit puerum suum.</i>	301
<i>Virgo lac habuit in uberibus.</i>	302
<i>Viscerum internorum omnium corruptela.</i>	67
<i>Umbilicus prominens.</i>	64.146
<i>Umbilici unitas soluta.</i>	193.194
<i>Voluulus sanguineus.</i>	87
<i>Vomitu menses proiecti.</i>	65.67.176
<i>Vomitu vermis proiectus.</i>	137
<i>Vomitus sanguinis.</i>	63.65.67.176
<i>Urina ex ano.</i>	147
<i>Urina ex alienis locis profluens.</i>	181.259
<i>Urina per foramen reddita.</i>	247
<i>Urinæ incontinentia ab exciso calculo.</i>	114.290
<i>Urinæ incontinentia ex lapsu.</i>	262
<i>Urina intra peritoneum collecta.</i>	88
<i>Urinæ profluvium.</i>	106
<i>Urina rubens ex debilitate renum.</i>	78
<i>Urina rubens in morbo frigido.</i>	74.75
<i>Urina sanguine permista.</i>	80
<i>Urina stillicidium.</i>	117
<i>Urinæ suppressio.</i>	114
<i>retentio.</i>	115.148
<i>Vteri inflatio.</i>	292.
<i>Vteri morbus inedia curatus.</i>	283
<i>Vteri strangulatione correptæ videntur Catoeho occupatæ,</i>	15
<i>Vulnere frontis à cæcitate senex liberatus.</i>	297

FINIS.

ERRATA SIC CORRIGITO.

Folio 58. Linea 22. lege vnciæ quatuor.
73. 22. Vrinæ autem. 79. 23. sanitati tandem.
98. 18. erythroide. 101. 5. referens. eodem, 20.
affectum renem. 121. 1. De aquosi. 138. 20. ven-
triculo. 158. 7. per annum nihil. 181. 21. cōnaf-
cuntur. 189. 3. altiore callo. 194. 18. nequeunte.
200. 18. detractioni menstrua. 205. 22. conuul-
siones. 207. 13. adde. Cap. L. 212. 3. conuulsio-
nem. 223. 18. Quæro igitur. 291. 12. casum ca-
norum. 298. 2. interfectorum. 321. 14. vtero
gerit. 331. 21. mundificare. 335. 24. & ab alijs.
eodem, 27. & Arabum. eodem, 28. probata.
330. 15. scribit. 361. 25. corpus nervosum, me-
dia. 365. 30. conduntur. 381. 30. ardore in

Reliqua leuiora errata, & numeri folio-
rum errorem beneuolus Lector corrigat.




REMBERTI
DODONAEI MEDICI
CAESAREI,

MEDICINALIUM OBSER-
uationum exempla rara.

*De Cerebri concussione, &
ossis petrosi fissura.*

CAPVT I.



VIDAM cum ba-
culo crasso, ad fini-
stram capitis par-
tem, supra aurem
percussus, non ex-
istimabatur insigni-
ter læsus. Nam
cutis integra, nullam læsionis notam
ostēdebat: osse interim petroso, quod
subest, fissio, ac secundum latitudinem
magnam rimam habente. Huic mox
superuenit sopor, non tām profundus
tamen, quin interpellatus excitari fa-
cilè potuerit: excitatus verò, facilè ite-
rum

rum oculis conclusis, in soporem relapsus est: donec tandem post (plus minus) dies 14. grauem soporem, à quo excitari non potuit, mors sequeretur. Decubitus toto tēpore erat supinus, vrina & aluus rarò reddebantur, tandem etiam citra sensum profluebant. lenta admodum, sed nunquam remittens, aderat febricula. Capite huius post mortem aperto, reperta est durior cerebri membrana, sub osse petroso, sanguine omninò suffusa, purulento etiam circa cerebrum humore consistente.

S C H O L I O N.

Concussum autem huic fuisse cerebrū aperto capite satis apparuit, quanquā & hoc ex ipsa ossis petrosi insigni rima satis manifestum: neq; enim tam violentus ictus absque cerebri concussione fieri potuit. Cur autem non statim mutus factus fuerit, perquirendum videtur. Ait enim Hippocrates: Quibus cerebrum aliqua ex parte concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri: sect. septimæ, Apho. 60. Eadem verò & de morbis primo, sed minus concisis verbis habentur: Si cerebrum, inquit, concussum fuerit

MEDICINAL OBSERVAT. 3

rit, ac doluerit eius qui percussus, mutum statim fieri necesse est: ac neque videre neque audire. Sed hic Aphorismus, aut hæc Hippocratis verba, non de quavis cerebri concussione, neque de tali, qualem descripsimus, sunt intelligenda, sed de violentissima tantum, veluti cum cerebrum concuti contingit (vt Galenus interpretatur) propter casum aliquem totius corporis violentum ex locis altioribus factum. Iacent enim tunc eodem quo apoplectici modo, absque sensu pariter ac motu. Quando verò minus violenta est concussio, non statim muti redduntur, sed tardius & aliquot post dies demum: veluti percusso huic contigit, tum & illi, de quo Hippo. Epidemion quinto: Qui lapide, ait, in capite percussus est à Macedone, corruit. Tertia die voce destitutus erat, anxietas, febris tenuis, pulsus non valdè in temporibus. Nihil omnino audiebat, neque sapiebat, non quietus, sed quarta mouebatur, humiditas circa frontem, & sub nasum, & vsque ad mentum, & mortuus est. Veluti enim maximos & violentissimos casus, omnia grauisima succedunt: ita minores, molesta minus consequuntur accidentia: aut tardius superueniunt.


B

2

De

4 E X E M P L A
*De vulnere cutis capitis, quod
seuissima subsequuta sunt
symptomata.*

C A P V T II.

 LTERI vulnus illatum in superiore capitis sinistra parte, cum instrumento retuso, sed nonnulli ponderis, quod existimabatur periculi exors, vtpotè cranei osse illæso: idcirco etiam negligentius curatum. Superuenit huic & sopor ille, qualis superiori. ex castris, vbi vulnus acceperat, tunc in vicinam urbem translatus fuit. Decubitus huius quoque supinus fuit, pulsus parvus ac creberrimus, mens nonnihil læsa, ad interrogata enim haud rectè respondit. Huic ingrauescente malo, vniuersum dextrum latus resolutum est: (cùm tamen in sinistra capitis parte vulnus esset) inde perniciosus sopor, à quo excitari non potuit, breui vitæ exitu subsequente. Cranio huius sublato, reperta est dura meninx sinistra parte liuens, ac similiter sub hac cerebri substantia, quæ

MEDICINAL. OBSERVAT. ;
quæ apparebat, sphacelo correpta: de-
xtra cerebri parte cum sua membrana
haud malè affecta: cranio etiam vnde-
quaque integro, nec rimam vllam aut
fissuram habente.

SCHOLION.

APPARET & huic concussum fuisse cerebrum. Nam dextræ partis resolutionis vulneris occasione non videtur accessisse, sed aliam ac maiorem causam habuisse, ipsam videlicet cerebri ab ictu per instrumentum grauioris ponderis concussionem. Reliqua symptomata vulnere successisse potuerunt. Capitis siquidem offensus vulneribus, etiam osse cranij haud læso, graua quandoq; symptomata accedunt: ac tandem ipsa mors. Aër frigidus hisce vulneribus inimicus, à quo si vulneratus se non contineat, sæpè in periculum seipsum adducit. Complures referri possent, qui ex leui vulnere capitis, pericranio tantum vulnerato, obierunt, qui sese aëri frigido exposuerant. Superuenit autem istis sensuum stupor, ac tandem profundus ac noxius sopor: nonnullis etiam febris: deinde mors. sed resolutionem alicuius partis non memini in quoquam capite vulnerato alio, quàm in hoc, me obseruare. Quamobrem non vulnus modò, sed
B ; cerebri

cerebri concussio morti occasionem præbuisse videtur. Cur autem alij ex leui vulnere capitis perierint, qui sui nullam aut exiguam rationem habentes aëri frigido sese exposuerunt, nulla alia apparet causa, quàm quòd frigidum per denudati ossis cranij poros, ad cerebrum perueniens, sphacelo inducto, ipsum vitiauerit: quo superaccedente, egri haud diu viuere potuerunt. Nam vt Apho. 51. lib. 7. Quibus cerebrum sphacelatum, id est, corruptum est, in tribus diebus pereunt: si verò hos euaserint, sani fiunt. Quę sententia & in Coacis prænotationibus paulò aliter sic habetur: Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septem moriuntur: hos verò si effugerint, seruantur. Cuius sententię postrema verba de sphacelo confirmato veritatem habere non possunt, vt Galenus satis manifestè in Commentarijs testatur: sed de incipiente tantummodò, & leui ad sphacelum dispositione præuia, accipi debent; à qua æger, diligenti adhibita curatione, restitui potest, vt & Hippocrates lib. 3. de morbis scriptum reliquit. Quòd si morbus leuiter, inquit, corripiat, vbi sanguis discessit, melius æger habet: si verò vehementer correptus fuerit, citò perit.

De

De Cerebropunctim læso.

CAPVT III.

SIMILIA symptomata superuenerunt & cuidā, cui durior cerebri membrana, anteriore parte punctim læsa fuit. Vulnus hic acceperat cum tridentis acuto radio, in superiore dextri oculi palpebra sub ipso supercilio, oculi bulbo haud læso: exigui momenti vulnus habitum: citò quoque in palpebra coaluit: interim vulneratus sopore tali correptus, quali is qui cum baculo percussus fuerat, ac eodem affectus modo. Adhibita fuerunt multa capiti remedia. non etenim ex tàm exiguo vulnere, sed alia ex causa, putabantur talia superuenisse accidentia.

Cum verò nullis remedijs affectus cederent, superueniens noxius sopor, vitæ finem fecit. De causa mortis cum dubitatio esset & concertatio, primum exemptus est oculus, atq; tunc compertum radium non tantum palpebram vulnerasse, sed vltèrius progressum os illud penetrasse, quod

B 4 cauitate

cavitate sua oculi bulbum continet. Exempto verò & frontis ossè, apparuit durior membrana & vulnerata & sanguine multo perfusa, iam corrupta cerebri proxima vulneri substantia ac vitiata. Quæ dubio procul exitij causa.

SCHOLION.

HIPPOCRATES lib. Prorrheticon statim initio, & similiter in Coacis prænotionibus, interrogare videtur, num sic affecti Phrenitici sint. Qui soporosi, inquit, inter initia fiunt, cum capitis, lumborum præcordij, collique dolore vigilantes num phrenitici sunt? Respondet Galenus in Commentarijs, Phrenitin non appellari (propriè videlicet) nisi febricitet æger, & continuo deliret, ac continuitate dementiæ, quodque simul cum febre fiat, phrenitin agnosci: phreniticos tamen & hos esse, qui soporosi existentes sapiunt, sed & delira quandoque loquuntur, atque à præsentibus expergefacti stupefactis similes videntur: & tales quidem fuisse, de quibus Hippo. Epidem. lib. 3. sectione 3. hunc in modum scribit: Neque Phreniticorum quisquam insanivit, ut in alijs, sed alia quadam veteriosa in somnum delatione, capite grauati moriebantur.


Ex

MEDICINAL. OBSERVAT. ,

Ex quibus apparet, cum eum cui os petrosum fissum, & alterum in capite vulneratum, tum & hunc, cui punctum læsum, phreniticos dici potuisse: cum & ipsi excitati, veluti stupentes, mox in soporem relapsi, subinde ad interrogata rectè responderint, quandoque verò aliena.

De Catocho.

CAPVT IIII.



DIFFERENS à superioribus affectibus Catochus est. Hic quandoque absq; febris inuadit: subinde eidem superuenit, & quidē intermittenti: vt nobis quandoque obseruare contigit. Inuadit autem paroxysmi tempore & cum ipso desinit, si præposterè nihil fiat. Si etenim tempore paroxysmi pleraque temerè tententur, non rarò in ipsa accessione æger deficit. Expectanda est febris remissio, & cōsque, dum vires non nihil fuerint reparatæ, prius tamē, quàm altera subsequatur accessio, malo occurrendum. Si etenim secundò superuenerit, perniciem adfert. Neminem
B 5 certè

certè liberatum nouimus, cui secundo Catochus superuenit. Non potis siquidē natura videtur, tam graue malū bis sustinere. Adhibent nonnulli mox Catocho cum febris correptis quēdam remedia, qualia apoplecticiis subinde etiam temerè infunduntur, & adhibentur: de quibus in cap. de Lauandula, ac de vino stillatio in nostris Historijs scripsimus: quæ & Catocho correptis nocent ac pernicioſa sunt. Magis ferendi videntur, qui in ipsa accessione vel sanguinem ducunt, vel enemata iniiciunt, tametsi & hoc modo pauci seruati. Tutissimum nobis visum, febris remissionem & ἀναστροφήν expectare: in ipsa verò accessione, præter diuersiones, veluti crurum frictiones, nihil adhibere. Ita certè referre possumus, nonnullos nostra opera sanitati restitutos.

Generosus quidam vir, posteaquā febris intermittente aliquot diebus laborasset, & iam ab ea liber videretur, subito in febrem iterum relapsus, atque vnā in veluti stuporem: membra nulla mouit: videbatur oculis apertis
omnes

MEDICINAL OBSERVAT. 11

omnes intueri præsentēs, interim vel digitis, vel re quavis alia propè admodum, ne niſtabant quidem palpebræ. Febris accessio ſatis vehemens fuit, horarum (plus minus) 12. interea ſolis diuertentibus frictionibus uſi, donec manifestam febris declinationem cōſequuti, ſub cuius finem, ſpontè ſomno ſuperueniente, quietem permiſimus. Cum autem à febris liber eſſet, & vires utcumque reparatæ, ſanguinem pro virium robore detraximus, idoneaq; victus ratione inſtituta, alteram acceſſionem expectauimus, quæ omnino exigua fuit. poſt hæc purgante medicamēto exhibito, generoſum hunc virū à febris & Catocho liberauimus.

Similis & mulieri cuidam affectus contigit, quæ & in ipſa acceſſione correpta, oculis apertis immota perſtitit: huic ſanguinem non detraximus, ſed in die intermiſſionis purgans exhibuimus medicamentum: quod certis de cauſis vtilius videbatur. Atq; hoc modo, hæc quoque ſeruata, ſanitati-que reſtituta, libera à tam graui malo euasit. Potuit hæc referre nonnulla
eorum,

corum, quæ contigissent circa illam, quo tempore Catocho detinebatur: sed generosus vir, de quo scripsimus, minimè. Mansit huic & à morbo isto nonnihil læsa aliquanto tempore memoria. Profuit nonnullis in ipsa accessione oxyrhodinon, ex aqua & acetosaceis fronti admotum: sed quando post febris paroxysmum nihil præterea adhiberetur, recurrens cum febre Catochus, eos sustulit.

S C H O L I O N.

ATQVE huiuscemodi affectum *κατοχον* à veteribus, ac subinde *κατοχήν* dici, ex Pauli Aeginetæ cap. 10 lib. 3. manifestum est Catochum siquidem, ait, esse, quando æger subito corripitur, & in illa permanet figura, qua correptus est, clausis oculis, vel respiciens, atque sic affectos *κατοχομένους* appellat: quales, de quibus iam scripsimus, qui in ea, qua correpti, figura permansere, donec accessionis finis esset. Dicitur verò & idem affectus *καταλείψις* siue Detentio: & *κῶμα ἄγρυπνον*, id est, vigilans sopor. Sunt tamen qui *κατοχον* à vigilante sopore differre velint, & cum profundo sopore convenire: sed his contradicit Galenus lib. 4. de Locis affectis: ubi per soporem claudi palpebras,
in

MEDICINAL. OBSERVAT. 13

in Catocho verò siue Catalepsi apertas manere scribit. Causa morbi pituitosus humor cum bilioso temperatus: vt ait Paulus Aegineta: Aëtius etiam ab humore melancholico. Atque hanc ob causam non ardentibus febribus, sed (qui comes febrium) tertianis haud exquisitis superuenit, quæ non ex solabile, sed pituitoso humore permixta originem accipiunt. Quòd & sanguis generosi viri ostendit, cui multa adeò pituita permixta, vt concreta per vniuersam aquam (ex manu siquidem sanguis missus) plurima ferretur, manibusque eximi potuerit, ac impositis virgulis copiosa, quando auferebantur, adhæresceret: vnde & ex pituita permixta hunc morbum natum colligi potuit.

De Catocho absque febre.

CAPVT V.

SUPERVENIT autem Catochus non solum febricitantibus, sed & nullo alio præcedente morbo hominem quandoque occupat, vt superiore capite scripsimus, & Aëtius quoque Tetrab. 2. lib. 2. cap. 4. testatur. Sic vtique contigit honestæ cuidam matronæ natæ annos (plus minus) 45. quæ posteaquam cum aliquot

aliquot amicis cœnasset ac hilaris fuisset, subito Catocho occupata est. Videbatur omnes intueri, interim neminem agnoscebat: neque interpellata cuiquam respondit: corporis nullam partem mouebat: sed quomodo correpta, ita permanebat, donec ab effectu libera fieret. Erat autem hæc obesa, multis repleta humoribus: pulsus magnus, fortis & æqualis. Detraximus huic sanguinis è dextri pedis vena, magno digito vicina, abundè multum. Verum cū nec sic morbus mitior fieret, enema satis acre injici curauimus, quo cum irritata aluus ad excretionē impelleretur, mox sensuum suorum compos facta est, & aluum exoneravit, nihil eorum, quæ ipsi facta essent, sciens. Admirabatur ad alui excretionem se bis teruè extimulari, sed multò amplius, cū cerneret pedem fasciola obuinctum. Nam sanguinis missionem nunquam antea admiserat: utpote quæ non modò ab omnibus medicamentis, sed & auxilijs ac Medicorū consilijs, abhorreret. Atque hinc, cum remedia nulla deinceps admitteret,

tribus

MEDICINAL. OBSERVAT. 15
tribus post mensibus, cum capitis gra-
uitate, & assidua in somnum delatio-
ne, tandem & accedente febris lenta, in
grauem soporē incidit, à quo cū nec
sanguinis missione etiam repetita, nec
enematis, nec etiam topicis remedijs
excitari potuerit, in viuis esse desijt.

SCHOLION.

CATOCHVM quoque hunc affe-
ctum initio fuisse, ex ijs quæ superiore
cap. scripsimus, satis manifestum. Sanguinem
verò ex pede duximus, sexus rationem ha-
bentes: Nam subinde sanguinis è brachio de-
tractio incommodè fit, præsertim ijs, quæ fa-
cilè ab utero afficiuntur. Iam uteri strangu-
latione correptæ, quandoque Catocho oc-
cupatæ videntur, vt Paulus Aegineta testa-
tur: & in definitionibus Medicis Galeno as-
scriptis reperitur: vbi tria Catochi genera
referuntur, quorū secundo, vigilanti dicto,
ex utero præfocatio affinis. Sanguis autē hu-
ius admodum crassus fuit, aque adhuc calen-
tis mox fundum petijt, atq; illic simul con-
crescens, in magnam molem coaluit. Cum
autem remedia nulla ægra admitteret, qui-
bus vel reliquum humorum expurgari, vel
cerebro, ac capiti consuli potuisset, morbus
in Lethargum commutatus.

De

De Catocho in sene.

CAPVT VI.



IMILEM superiori affectum in sene quadam virgine moniali me quoque obseruare quandoq; memini. Aetatis hęc numerabat annos (plus minus) Lxx. habitu corporis extenuato ac macro. rigere ac obstupescere tota videbatur: oculis in omnes intentis non mouebatur, non loquebatur, non respondebat. Huic nec sanguinis missionem, nec enemata adhibere ex re fuit. Exhibuimus autem aquam è vino stillatitiam, sæpius repetita destillatione purissimam. qua assumpta, mox ad se, vniuerso rigore soluto, redijt. Nec alio remedio deinceps opus habuit, quàm quo vires & calor naturalis refici poterant..

S C H O L I O N.

IN tam senili & extenuato corpore, leti-
am tenui victus rationi, ex professo monastico, assuefacto, multos humores collectos fuisse non fuit verisimile: proinde non
erat

erat quòd metueremus, extenuatis & fufis humoribus, affectum ex vfu huius vini intensum iri: Quòd, vbi humorum copia subest, contingit; vt in cap. de stillatitio vino in nostris de Historia stirpium Pemptadibus scripsimus. Refert & duorum eiusmodi exempla Iohannes Fernellius de morbis & symptomatis lib. 3. cap. 2.

De Lethargo.

CAPVT VII.

INTER soporiferos affectus Lethargus est. Catocho tantò difficilior ac periculosior, quàm causa eius frigidior, & viscidus pituitosus humor amplius præpollet. Non subito veluti Catochus apprehendit, sed sensim somniculosis obrepit. Mulier quædam honesto loco nata, cum aliquot diebus capitis gravitate laborasset, adeò fuit somniculosa ac in somnum propensa, vt, quæcunq; agens, dormire semper cuperet, ac assiduè in somnum dilaberetur: à quo initio excitari potuit, tandem verò accedente febris non potuit. Remediorum vsum hæc neglexerat, nec Medicum

C accersiri

accerfiri admittere voluerat : Itaque non prius vocatus, quàm omni sensu destituta, in grauiſſimum ſoporem delapſa eſſet. Detraçtus illi mox ſanguis fuit è vena iuxta digitũ magnum dextri pedis: enemata inieçta: cucurbitulæ natibus & humeris admotæ: topica multa alia adhibita: verum his non proficientibus, tandem mors ſuperuenit. Capitis huius cranij oſſe ſublato, abſceſſus in anteriore cerebri parte repertus, & pus interiori cranij oſſi parti adhæreſcens: quod & è naribus, paulò ante mortem irritatis, profluxerat.

S C H O L I O N.

AETIVS ex varijs cauſis Lethargum originem ducere refert: & quandoq; cerebrum per conſenſum, quandoque verò primariò laborare. Verum iſte Lethargus non per conſenſum, ſed proprius cerebri morbus fuit, & quidem partis anterioris, cuius partis affectum Lethargum eſſe veteres teſtantur. Galenus morbum eſſe refert Phrenitidi contrarium: Phrenitis ſiquidem fit ex bilioſo humore ſuperabundante: Lethargus verò cum pituitofus præpollet, quem in præſenti Lethargica copioſum fuiſſe pituitofus ſanguis

sanguis ostendit, atq; adeò quidem lentus ac viscosus, vt simul cum aqua permixta, instar iuris carnis musculosæ, concretus mox fuerit, tenuis glutinis, aut gelatinæ vulgò dictæ, speciem & consistentiam referens: quod non nisi admodum crudo pituitoso viscidoque contingit. Talis autem sanguis in quocunq; morbo apparuerit, crudorum pituitosorum humorum redundantiam ostendit, & morbum lethalem aut diuturnum ac difficilè curabilem. Nobis certè lethales obseruati sunt morbi, tali apparente sanguine. Sed ad Lethargū reuertamur. Huic respondere Paulus ait Caron: sed tamē hoc discrimine differre, *Caros.* quod Carus vel absq; febris accedat: vel ipsam subsequatur: è contrà verò Lethargus prior inuadat, febris deinde succedat. Caro similis est grauis & profundus somnus, qui ebrios occupat. Suidas hunc Caron etiam appellat *κάρος ἐστὶ ἢ ἐξ οἶνοποσίας ἐγγινόμενη μέθη, καὶ καταφορά;* hoc est: Carus est ex vini potatione ebrietas, & grauis sopor.

De Apoplexia fortissima.

CAPVT VIII.



ORTISSIMA Apoplexia correpta fuit honesti ciuis vxor, cum ad 48.ætatis annū peruenisset.

uenisset. Habitu erat corporis *ευσδαρκα*
ac carnosio: temperamento calido, &
mediocriter humido, sanguinis redū-
dantiā attestante. Concidit subitò: se-
niores Medici vocati nihil spei super-
esse iudicabant: tandem XIIII. aut
XVI. ab inuasiōe horis vocatus ac-
cessi, tūm temporis adhuc iuuenis:
obseruauī grauissimam cum difficili
admodum respiratione Apoplexin:
pulsum fortem & magnum, tentan-
dam esse curationem existimaui. Ita-
que sanguis illo die bis, & quidē satis
copiosus, detractus, semel è brachio
dextro, deinde ex pede: enemata quo-
que hoc ipso die satis acria duo inie-
cta. deinde continuis diebus singula:
adhibita & localia quædam: Ita tandē
octauo aut nono die suos domesticos
agnoscere cœpit, & nonnihil balbuti-
re. postea purgantibus medicamentis
per os exhibitis: deinde & *πτάρμικοις*,
apophlegmatismis, alijsque similibus
vsa, meliusculè habuit: verum eousq;
perduci non potuit, vt mentis ac sen-
suum integrè compos fieret, aut pedi-
bus consisteret. Mansit reliquo tem-
pore

pore impotens: sedebat ac gestabatur in sedili, ita tamen aliquot annis superuixit.

SCHOLION.

SOLVERE, inquit Hippocrates, apoplexiam fortem impossibile: debilem verò non facilè. Galenus hunc Aphorismū exponens, maximam apoplexiam nullam, ait, admittere curationem, atque ab hac hominem seruari non posse. Maximam verò interpretatur, in qua respiratio in totum prohibetur. Talis si superueniat, haud dubiò, homo nec seruari nec diu superesse potest: absq; respiratione siquidem viuere nequit. Sed tam vehemens apoplexis, vt mox in totum prohibeatur respiratio, non facilè alicui superuenit. Nam tametsi vniuersum corpus sensu motuque destituatur, respiratio tamen non in totum aufertur. Respiratio etenim composita actio est, partim ex arbitrio & voluntate: partim à natura, vt in lib. Galeni cui titulus **INTRODVCTIO** siue **MEDICVS**. Occupato cerebro cessant motus voluntarij: non idcirco tamen, qui à natura fiunt: vt sunt cordis & arteriarum. Proindè nec citò nec facilè respiratio in totum aufertur. Nam vtcumquè ab actione vacet voluntatis arbitrium, natura tamen ni-

C 3

hilomi-

hilominus officium præstare conatur; veluti in somno facit. Intercipitur quidem quandoque subitò respiratio, sed promptissimè copioso aliquo humore in pectus affatim decumbente, qui omnem spiritui viam intercludat. Sed hic affectus ab Apoplexia differens est: Nam qui ab huiusmodi catharro subitò obruuntur, sensu & mente integris suffocantur. Apoplectici & sensu & motu priuantur priusquàm è vita decedant. Defluente humore exoneratur cerebrum; in apoplexi occupatur & grauatur ab humoribus: Proinde sensus & voluntarij motus desinunt; affecto nempe principio. Naturales verò motus, tum & ipsa respiratio non facilè cessant; etiam in vehementissima ac fortissima apoplexia. Testatur Paulus Aegineta in maxima apoplexi respirationis aliquid superesse: Seruatur, inquit, in apoplexi modica quædam respiratio, quæ si permultum à naturali functione recesserit, maximam esse affectionem putandum: si paululum exiguam: deterrima verò est, respiratio cū intermittitur: vel etiã ubi magna cum violentia trahitur. Et quidè quàm difficillima huius apoplecticæ respiratio fuit, & magna cum violentia attracta: Quamobrem non sumus veriti affectū Apoplexiam vehementissimam ac fortissimam nuncupare, attestante hoc quoque diuturno sensuum

sensuum motusque impedimento. Non tamen ex hac mortua est, sed integrè haud liberata, ad sanitatem enim & mentis integritatem perducì non potuit.

Videtur aliquid tale voluisse Hipp. cum ait, λύειν ἀποπληξίν ἰσχυρὴν ἢ ἀδύνατον: id est, solvere apoplexiam fortem impossibile: Nec enim verba λύειν ἀδύνατον, mortis necessitatem, sed restitutionis ad integram sanitatem impossibilitatem ostendunt. Aliud est hominem non posse seruari: aliud est non posse ad sanitatem perducì: Nam malè valentibus etiam vita seruari, & prorogari quandoque potest: ut in hac apoplectica compertum. Confirmant hanc expositionem sequentia verba: ἀσθενέα δὲ οὐ ῥῆιδιον: hoc est: debilem non facile. Nam eos, qui debili aut exigua apoplexia occupantur, in vita seruare haud est difficile: sed ita curare ut nulla labe relinquantur, hoc opus, hoc labor. Multos certè enumerare possemus à leui apoplexia restitutos: & nonnullos ita restitutos, ut nulla in ipsis præcedentis morbi manifesta vestigia relicta sint; sed tamen alicuius partis stupor aliquis, vel linguæ aliquod impedimentum remansit; quod subinde tam exiguum, ut in solo cantu deprehendi potuerit. Nihil autem consultius in hoc morbo, quam confestim sanguinem mittere, etiamsi corpo-

ris temperies frigidior, & morbi causa pituitosa videatur, si modò vires ferant: Nequit enim citius à superfluis humoribus exonerari cerebrum, quam per sanguinis detracti-
onem: & humores cerebrum occupantes absque sanguine permixto non sunt, Nisi in valdè senibus, quibus & vires imbecillæ, & pituita copiosior quàm alijs.

*De Catarrho siue destillatione
suffocante.*

C A P V T IX.

DEFLVERE ex capite humores in pectus ac pulmones haud rarum est. inde siquidem tusses, rauedines, respirandi difficultates: & si humores salsi aut acres, pulmonis exulcerationes & phthises pro-
ueniunt: quod si verò & in pulmonibus vitium, latentes anginae succedunt. Sed adeò copiosum deferri, ut hominem mox suffocet, perquàm rarum. Generoso cuidam viro sic tamen contigit.

Annos vitæ ferè attigerat Lx. corpore non extenuato, sed bonæ habitudinis,

MEDICINAL. OBSERVAT. 25

tudinis, liberaliore potu subinde delectabatur; podagra, quandoque molesta: purgari aliquando assueuerat: aderat lassitudo & humorum plenitudo: de medicamento purgante sumendo deliberauerat, cum subitò nocte media catarrhus vehemens ipsum obruit: sentiebat defluxionis velocem impetum: auxilium implorabat, sed priusquam quisquam adesse potuerit, suffocatus est. A morte mox copiosa pituita lenta ac viscida ex ore profluebat: quæ haud dubiò, in pulmones affatim defluens repentinæ mortis ac suffocationis causa fuit.

SCHOLION.

ISTIVS casus superiore schol'io meminimus: Hippocrates verò in fine XII. Aphoris. sectione 3. destillationem quâdoque citò etiam interimere testatur. τοῖσι δὲ, ait, πρεσβυτέροισι κατάρροι συντόμως ἀπόλλυντες: id est: senioribus autem destillationes, quæ citò interimant. Similis sententia legitur & in lib. de aere, aqua, & locis, sed copiosior, his verbis: Valde senibus destillationes propter raritatem, & venarum ἐκτῆξιν, id est, tabefactionem, ita quod repentinè intereunt,

C

5

quosdā

quosdam autem contingit dextra aut sinistra parte stupentes reddi. Quibus verbis duo ex catarrho in senibus ostendit pericula, vel mortem subitanam; vel alicuius partis cum stupore resolutionem.

De Mania, siue Insania.

C A P V T X.

MANIA insania quædam absque febris est: eius causæ plures reperiuntur: quandoque verò feruens sanguis cerebrum petens. Magnificus quidam vir 40. annos (plus minus) natus, sanguinē cum circa præcordia commoueri sentiret, oculi caligabant: vertigo aderat: mox clamores, vociferationes, inquietudines accedebant; ita ut contineri debuerit. Detracto mox ex dextro brachio sanguine satis copioso, nondū tamē insania cessabat: carmina quædā recitabat, canebat, vociferabatur, saltabat, præcipitare sese conabatur; arctè contineri, ac vinculis stringi idcirco ipsum oportuit, donec ex codijs papaueris potione usus, in somnū incidisset: à quo cū meliusculè haberet, purgatus & adhibitis idoneis remedijs ad sanitatē peruenit.

uenit. Verū hæc nō diuturna fuit. post enim aliquot menses iterum, ac deinde tertiò in eundem affectum relapsus est, ac iisdem auxilijs restitutus. Tandē verò cum sanguis non amplius ad caput ferri videretur, insania quidem desijt recurrere: sed sanguinis, cum tussi, sputum successit, deinde puris excretio. Ita qui prius Mania laborauerat, phthisi demum mortuus est.

SCHOLION.

EX hemoptoē transitum fieri in phthisim satis cōstat; sed quomodo Mania in hemoptoēn permutetur, nō æquē manifestū. Videtur autem de huiusmodi permutatione in Coacis prænotationibus Hippocrates simile aliquid scriptū reliquisse. Qui ex Lethargicis, inquit, seruatur, plerunq; pectore suppurati fiunt. Nam si Lethargus in suppurationē conuerti potest, cur nō & eadē ratione Mania in pulmonis exulcerationē cōmutari? Per vtrumq; etenim affectū, cerebrū, & eadem quidē parte, laborat: sed causę differentes. Est autem Lethargi, vt Archigenes apud Aetiū ait, duplex origo: Quādoq; præcordia & viscera primario affectu læsa sunt, & ad cōsensum cerebrū pducūt: quādoq; verò in cerebro affectus inchoat. Simile & de Mania dici potest:

potest: per hanc videlicet cerebrum subinde proprio & primario affectu laborare: aliàs verò per *συμπάθειαν*, & per consensum alterius partis. Maniam verò & per consensum fieri ostendit. Apho. 40. sect. 5. Quibus mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat. Sanguine siquidem circa mammillas collecto, furor succedens, per consensum cerebrum affici testatur. Sic potuit & magnifico viro sanguis circa præcordia collectus, perturbata mente, furorem excitasse; per consensum cerebri functionibus deprauatis. Sed cur sanguis circa præcordia confluens, mentem cum furore perturbavit, succedente verò hemoptoë nihil tale accidit? An ne quia feruens loco conclusus, via nulla patente qua posset erumpere, in septo transverso membranisque vicinis cum tensione inflammationi similem affectum induxit? postea verò patefacta sibi per pulmonem via, liberumque exitum nactus, membranis aut diaphragmate non distentis, mentem non fuisse permotam? Nam septi transversi inflammationes, mentis alienationes consequi testatur Gal. 4. de locis affectis. Atque hoc quidem modo Maniam in Hemoptoën permutari posse apparet: Maniam videlicet ex consensu natam. Nec tamen à ratione quoque alienum, initio cerebrum primario fuisse

fuisse affectum, & sanguinem feruentem caput petijſſe: poſtea verò eiufdem feruore remiſſo (quòd diuturnitate fit mali) ad caput non amplius aſcendiſſe, ſed circa pulmones conſtituiſſe, cuius ſubſtantia vitiata, ſanguinis, deinde puris ſputatio ſucceſſerit. Cæterum Mania cum Melancholia affinitatem talem habet, vt non rarò Mania in Melancholiam tranſeat: & initia Melancholiæ frequenter Maniacum quid habeant. Mania autem quæ ex ſanguine bilioſo procedit, præcipuè ſanguine redundante, minus vehemens eſt, & ferè cum riſu coniuncta. Difficilior quæ à bile flaua aduſta: Sed omnium grauiffima ac difficillima, quæ à melancholico humore aduſto originem ducit: Omnibus autem Maniacis cum inſania mentis alienatio coniuncta eſt. Melancholici è contrà ſæpè non inſanire videntur, ſed concepta tantùm aliqua falſa opinione occupantur: nonnulli ſe mox morituros exiſtimant: quidam ſe comprehendere metuunt: alijs alia obuerſantur, quæ ex animo excutere & abijcere nequeunt, interim non rarò omnia ſua negotia adeò prudenter, & cum iudicio peragunt, vt nullo morbo detineri videantur.

De Nocturna inſania.

CAPVT XI.

VIR



IR quidam supra XXX annos natus, interdiu benè habebat, mente & sensibus integris: si quando autem quieti se dedisset & dormiret, mox insanire incepit, claudere subinde, brachia, manusque hùc illùc abijcere: surrexisset quandoque, saltasset, & per domum cucurrisset, si assidentes permisissent, qui in lecto cum continuerant. Vigil factus iterum sanæ mentis. Purgatus hic idoneis medicamentis fuit, sanguisq; deductus: verum non prius hæc profuerunt, quàm cauterio in ceruice posito, vlcus esset factum, quo aliquandiu aperto, profluente inde humore, melius se habuit, & sanitati restitutus.

SCHOLION.

Eφιαλτης, Incubus vel Incubo Latinis morbus dicitur, dormientibus molestus: hoc correpti ab aliquo sibi incumbente, aut re quapiam corpori imposita opprimi sese existimant, & suffocari imaginantur. exclamare aut vociferari volentes nequeunt; vocem si edant, nihil significantem vt plurimum proferunt: adest & difficilis motus. Cum hoc autem insaniam nocturnā (quam
descrip-

MEDICINAL. OBSERVAT. 31

descripſimas) haud quaquam conuenire ſatis manifeſtum; cum Lycanthropia ſimilior videtur, quam Paulus Aegineta deſcribit, & ſimiliter Auicenna ſub nomine Chatrab: *Chatrab.* Nec tamen cum hac omninò conuenit. Ait quidem Paulus, noctu domo egredi, & circa defunctorum monumenta verſari, donec illuſceſcat. addit Auicenna, interdium etiam latitare: hominum conſuetudinē fugere: vno loco haud diu conſiſtere: tristes & pallentes eſſe; At hic vir omnia ſua negotia dextrè interdium obibat, nulla parte mentis laborans, nec ſolitudinem amabat, ſed cum amicis & domeſticis per lubenter verſabatur. Quamobrem nec Lycanthropia affectus huius dici potuit; ſicuti nec verè Incubus fuit. Cauſam mali huius humorem fuiſſe craſſum crudumque ſatis apparuit, cui bilis portio admixta fuit.

De Hydrophobia.

CAPVT. XII.

MISERRIMUM morbi genus, vt Cornel. Celfus ait, Hydrophobia eſt, quaeger & ſiti & aquæ metu cruciatur. Non timet autem hydrophobus ſolam aquam ſed quicquid liquidum ac humidum inſtar

instar aquæ est. Subsequitur hoc malum rabiosi canis morsum, si non idoneis remedijs primo quoque tempore occursum fuerit. Nec statim tamen succedit aquæ metus, sed subinde post triginta aut plures dies. Vbi autem superuenerit, haud diuturnus est. Nam, vti Cælius Aurelianus rectè ait, ob nimium aquæ timorem, & humoris defectum, ægrotantes celeriter pereunt.

Iuuenis quidam annos natus (plus minus) XVII. commorsus fuerat à cane in digito sinistræ manus, qui minimo proximus: ignorabatur canem esse rabiosum: vulnus quoque perquam exiguum, & tantò quidem negligentius curatum. Post trigesimum sextum diem, vulnere iam multo tempore solidato, incœpit iuuenis hic aquã metuere: ceruissiam & vinum, quod sui erat officij, promere recusauit: altero die sinistrum humerum doluit, à parte videlicet commorsi digiti: potuit tamen brachium sursum, deorsum, antrorsum, retrorsumque citra dolorem moueri: tertio die manè insigniter febricitare videbatur: pulsus valdè

MEDICINAL. OBSERVAT. 33
valdè concitati: sudores copiosi: brachia assiduè conuellebantur; lingua interim nihil ostendit febrile; nec urinae, quæ sanorum similes: eodem die mente minus constans, manifestius deliravit: è lectulo surrexit: vestes induit: per vicos discurrit: in horto acetosæ herbæ folia decerpfit, & quædam manducauit. Deinde amplius insaniens contineri debuit. Nox subsequuta cum magno furore, in qua tandem cum clamore defecit.

SCHOLION.

NO N diuturnum esse affectum Hydrophobiam & non statim à morfu, sed aliquot post Hebdomadas superuenire, Hieronymus Fracastorius lib. 2. de morbis contagiosis testatur: Vidi ipse, inquit, puerum, qui post octo menses, ex quo demorsus fuerat, contagionem ostendit, ex qua mox periit.

Simile scribit Conradus Gesnerus Epist. medicinalium lib. 3. Lithotomus quidam, ait, apud nos, ante sex aut septem septimanas, à cane rabido morsus, cum aliquandiu nihil malè sensisset, subito timoris aquæ superuentu, intra biduum miserrimè periit.

D De

De Ranunculo.

CAPVT XIII.

RANUNCVLVS, quem Græci βάρραχον vocant, in inferiore oris parte, quæ sub lingua est, nascitur; cuique ipsa lingua veluti vinculo alligatur: attollitur instar tumoris hæc pars, colore haudquaquã mutato, mollis, laxis, ac indolens; & tantus apparet tumor, vt inferiores dentes superet: rima autem media, dextrâ à sinistra dirimente, ranæ posteriorem partem refert; vnde affectui nomen. Præcedit sæpenumerò maxillæ inferioris dentium dolor. continetur verò in hoc crassus, lentus, oui albido colore & substantia assimilis humor. De curatione huius extant apud nonnullos quædam ex Albucasi translata. Errorem horum facilè agnoscet, qui curationē quandoq; viderit, ipse fecerit, aut hæc nostra legerit. Legittima curatio est scalpello vtrimq; tumorē aperire: deinde vbi quantum potuerit humoris effluerit, posca (exiguo sale addito) os paucis diebus colluere, donec nihil

nihil amplius humoris in tumore reliquum sit. Potest tamē & alia ratione humor in hoc tumore contentus educi; vulnere enim sub mēto facto, mox effluit: sed rutissimum est intra os tumorem aperire. Si quid verò impedit, quò minus in ore cōmodè fieri queat, tunc, vt sub mento fiat, proximum est: veluti cui vnàcum Ranunculo vtriusque tonsillæ inflammatio superuenit. Hic vulnere, quo diximus loco, facto, adhibitis deinde tonsillarum remedijs, ab vtroque liber euasit.

SCHOLION.

PAUCI ex posterioris ætatis Medicis, qui de medendis morbis scripserunt, Ranunculi curationem attigerunt: qui verò eius meminerunt, magna ex parte ex Albucasi, aut Rhasi sua mutuati sunt. Michaël Sa-uonarolus ex Rhasi similiter curationem in suo opere ascripsit: sed tamen eam, quæ fit per scarificationē, magis commendat, quæ via est, inquit, expedita, & ad hanc ego quā citius possum peruenio, cum non videā periculum. Hæc ille. Hanc curationem ostendit quoque & Ioannes Fernellius de partium morbis lib. 5. vbi Ranunculum tumorem esse ait, œdematis mollis ac laxi speciem

D 2

exhi-

exhibentem, quo aperto mucus profilit
oui candido similis.

*De sanguinis è gingiuis
profluvio.*

CAPVT XIII.

FREQVENS est, dum natu-
ra cōtinuam expulsionem
molitur, vt eodem tempore,
vel paulò antè, sanguis è naribus, &
subinde copiosus profluat. Verùm
Latomo cuidam cōtinuatis laboranti,
non per nares, sed è gingiuis sanguis
erupit. quòd cum in primis molestum
esset, ore assiduè sanguine repleto, re-
medium adhibet, & sanguinem illac
manantem reprimit. Repressus autem
sanguis, aliam sibi viam quæsiuit: Nam
ad vrinarios meatus conuersus, vnà
cum vrina descendit. atque sic è gingi-
uis non amplius sanguine erumpente,
vrina cruenta subsequuta est. quæ
cùm & reprimentibus, sanguinisque
fluorem sistentibus medicamentis ex-
hibitis talis esse desisset, iterum natu-
ra sanguinem ad gingiuas pepulit. Ex
his

MEDICINAL. OBSERVAT. 37
his autem nec prius desijt prodire,
quàm ab ectimatis curatus æger esset.

SCHOLION.

CONSIDERANDA hic occurrit
naturæ singularis prudentia ac prouidentia : deinde & cognoscendum conatum eius non esse reprimendum, quandò criticè sanguinem, vel aliud aliquod expellit : vel aliàs grauata sese exonerat. Veluti cum ectimata erumpunt, quæ non alio tempore; quàm cùm sanguine reprobo grauata est, excludere velle natura videtur.

De Lachrymis sanguineis.

CAPVT XV.

PROVIDAE ac sese exonerantis naturæ exemplum, in virgine quadam & aliud me obieruare memini. Carnosa hæc erat calidoque temperamento prædita, sanguineque redundans. Cùm autem ætas adesset ad menstruas purgationes idonea, vtpotè XVI. annorum, neque menses succederent, natura per oculos superfluentem sanguinem expellere conata fuit : sanguineis guttis lachrymarū instar frequenter ex oculis

lis profluentibus: benè fecit huic sanguinis è vena talo proxima detractio, quam menstrua purgatio non ita dudum subsequuta est.

S C H O L I O N.

MENSI BVS non procedentibus corpora seminarum morbosa fiunt, inquit Hippocrates lib. de genitura: quod quidem intelligendum venit, nisi aliunde sanguis irrumpat. Nam vt idem Hippocrates Aphorif. 33. sect. 5. Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. Huic autem virgini non ex naribus, sed ex vicinis oculis profluxit.

De Abscessibus tonsillarum foras erumpentibus.

C A P V T X V I.

POSTEA QVAM de naturæ prouidentia scripsimus, & aliud exemplum addendum, omninò rarissimum.

Laborabat inflammatione vtriusque tonsillæ filiola quædam duorum annorum, qua idonea remedia propter ætatem non admittente, natura
viam

viam sibi ad salutem quærens, morbum ad exteriora conuertit. Nati sunt itaque vtrimq; in collo infra aures singuli tumores; quibꝰ scalpello apertis, pus effluxit: Itaque ab abscessu tonsillarum liberata, sanitati restituta est.

SCHOLION.

FACIT huc Aphorif. 37. sect. 6. Ab angina habito, si tumor fiat in collo, bonum. Tonsillarum siquidem inflammatio anginæ quædam etiam est species.

De inflammatione œsophagi ab impactu piscis osse.

CAPVT XVII.



ESOPHAGVM, hoc est, meatum illum, quâ cibus & potus in ventriculum descendunt, multis affici modis posse haud dubiũ est, sed hoc loco de eo tantummodo affectu sermonem instituimus, qui ab inhærente ossiculo subinde gignitur. Contingit enim quandoque acutũ piscis ossiculum cū cibo imprudenter assumptũ huic impingi, ipsumque deinde pungere ac vellicare, vnde

D 4


dolore

dolore excitato inflammatio succedit: qua superueniente, nec cibus, nec potus ad ventriculum descēdere queunt: potu etiam per nares resiliente. Sunt qui in eiusmodi casu assidue oleum oliuarum in ore detinendum præcipiant: quod ubi aspera aliqua œsophago inhærent, haud inutiliter adhibetur. Nec solum oleum, sed & quicquid lentore suo oblinire, & læuem lubricumque hunc meatum efficere potest, vtile ac cōmodum. Qualia sunt pingua ac lentorem habentia iura, lenti succi alimenta, vt animalium pedes & musculosæ partes: ceruifiæ crassæ: & quicquid muccaginem refert. Hæc etenim non modò aspero aliquo œsophago inhærente, sed & alio quouis assumpto, quod vel ventriculo vel intestinis ad exitum descendens molestum esse posset, summo cum fructu ac oportunissimè assumuntur. Oblinunt enim meatus: quibus læuibus ac lubricis factis, facilius ac minore negotio cū aspera, tū alia quæcunque descendunt & excernuntur. Vbi autem ossiculum
impa-

MEDICINAL. OBSERVAT. 41
impactum aut simile, iam inflammationem in oesophago excitavit præstantiora sunt, quæ quàm citissimè inflammationis suppurationem procurent. Hac siquidem ad suppurationem perducta abscessu deinde disrupto, à dolore ac angustia æger citò liberatur: vt non in vno, sed in pluribus cõpertum habemus. Citò verò inflammationem suppurari facit, radicum althææ, ficuum, seminis fœnogræci ac lini decoctum, frequenter in ore detentum: cui non rarò vnà quoque incoquuntur & althææ & scabiosæ folia, glycyrrhiza, & vuæ passæ. Quod si verò & nuclei aliquot pauci addantur radicum liliorum alborum, potentius erit decoctum: & abscessus citius rumpetur.

De Latente ac difficili angina.

CAPVT XVIII.

VLLA inter Anginæ species æquè periculosa est, ac ea, in qua nullus tumor in faucibus ac collo apparet: quam latentem hac de causa non ineptè dixerimus. Talis

D 5 autem

autem quandoque, hominem paucis diebus conficit, ac è vita tollit: mente & sensibus integris. Quod & Hippocrates prædictionum lib. 3. cap. 8. scriptum reliquit. Angina, inquit, grauißima est & celerrimè interimit, quæ neq; in ceruice (id est, collo, interprete Galeno) neque in faucibus, conspicuum quid efficit. Hæc etenim eodem die, & secundo; & tertio, & quarto strangulat. Plurimum verò hanc quoque dolorè inferre: & spirandi (addit) difficultatem. Adsunt verò non modò hæc, sed & vehemens copiosaque humorum è capite destillatio, dolor autem circa laryngem & asperam arteriam talis, vt nec contingi, quantūcunque leniter, citra grauißimum dolorem queant: sed nec moueri sursumque attolli. Quamobrem non spiritus tantum cum difficultate trahitur; sed & cibus ac potus ægerrimè, aut non demittuntur. Cùm etenim per œsophagum descendunt, cedit, & sursum ascendit larynx. Inflammari per huiusmodi anginam, interiores ac latentes laryngis muscoli existimantur. Verum

MEDICINAL. OBSERVAT. 43

rum nos nullam iuxta laryngem aut eius musculos, vel circa asperam arteriam, inflammationem aut abscessum cognouimus, sed pulmonem malè affectum obseruauimus. Lanio quidam meridie circa laryngem & fauces dolorem sensit, & quandam in deglutiendo cibo ac potu difficultatem. Adijt sub vesperam pharmacopæum. Datur ex aquis plantaginis, lactuæ, & diamoron, addito aceto, gargarismus. quo cum subinde vteretur, doloribus intensis, subitò nocte mente constans, strangulatus interijt.

Huius corpore aperto reperta est pulmonis substantia, siue *παρέγχυμα*, in pus conuersa, & ad vnum eius latus abscessus pure quoque impletus. Nulla tussis huic antea fuerat molesta: neque sanguinis vlla sputatio præcesserat; sano validoque corpore eoque visus, eoque non gracili, sed obeso.

Eadem & superioribus similia æstate anni 1565. diligenter annotauimus: quando multi angina, ac simul molesta

molesta ex capite destillatione correpti fuere: præsertim ex his, qui præcedente hyeme, vel tussi, vel raucedine laborassent, aut à peripneumonia euassent. Plurimis horum, posteaquam circa laryngem dolor remissior tandem desisset, peripneumonia successit cum lateris dolore, non tamen pungente, aderant respirandi difficultas, & pulsus mollis. Horum non pauci intra non multos dies mortui: seniores euaserunt, & natura frigidiores.

Pulmones horum vel purulenti fuere, vel abscessum habuere: iuxta verò laryngem, aut eius musculos nihil occurrit, quod vel adesse vel adfuisse inflammationem ostenderet. Satis quidē apparuit, pulmones malè quidem prius affectos, superueniente accedente è capite destillatione, reliqua symptomata successisse: laryngem verò non primariò, sed per συμπαθείαν, siue consensum laborasse. Verisimile verò & est, destillante humore asperam arteriam, eiusque ramos impleri atque distendi: deinde eodem ad alia vasa transmissio, à dolore liberari quidem

dem asperam arteriam, ac eius supremum finem ipsam laryngem: pulmonis autem malè affectas partes à dolore occupari: atque hoc modo ex angina in peripneumoniam permutationem fieri. Subuenit huic morbo mox, si vires ferant, venæ sectio, ita enim citissimè impetus defluentis humoris & auertitur & compescitur: deinde quæ lenire asperam arteriam & pulmonem queunt, ac sputi facilem exitum procurare: cuiusmodi sunt dulcia, vt glycyrrhiza, eiusq; decoctum vix passæ, vinum passum, aqua mulsa, vinum mulsum, dilutum, si febris adsit, & alia eius generis, quæ à Cælio Aureliano cōmendātur. Adstringentiū ac repercutientium in hoc morbo vsus, inutilis: aceti verò etiam perniciosus.

SCHOLION.

ANGINAM appellat Hippocrates, Galeno teste, affectum circa fauces, qui spirationem quoquo modo reddit deteriore. Huius genera quatuor lib. de locis affectis 4. cap. 5. enumerantur: alij deinde & affectus referuntur, per quos cibi potusque via impeditur, & cum difficultate cibum labo-

laborantes deglutiunt: potas verò etiam per nares resilit. His annumerari œsophagi, ab inhærente ossiculo, inflammatio potest; de qua præcedente capite scripsimus. Per hos autem affectus, spirandi quoque difficultas quædam oboritur, sed citra πνίγος, id est, suffocationis periculum. Est autem πνίξ siue suffocatio (nonnullis strangulatio) non aliud nisi interitus subitaneus propter defectū inspirationis, (vt Gal. in comment. Aph. 34. lib. 4.) qui fit ex angustia alicuius instrumenti, ex ijs, quæ obseruiunt respirationi: Angustia verò fit, vel repleta media regione, quæ inter thoracem est atq; pulmonem, aut pulmonum meatibus: vel aliqua inflammatione totū occupante viscus; vel asperā arteriā; vel etiam partē, quæ veluti caput eius est. Quæ etiā inflammatio aliquando fieri solet in præiacente spacio, quod fauces appellant.

Atque vna harum causarum, eius, de qua scripsimus, Anginæ occasio fuit, Pulmonis videlicet χόρων, siue meatuum, atque ipsius asperæ arteriæ ex affatim defluente humore repletio. Quæ quomodò, ac qua via in Peripneumoniam conuertatur, ostendimus. Est autem hæc inter Anginas, per quas nullus in faucibus tumor apparet, & quæ subitaneum periculum adferunt, frequentior. Quæ verò asperæ arteriæ, vel muscutorum, qui gulam
cum

MEDICINAL. OBSERVAT. 47

cum gutture iungunt, inflammationem consequitur, omninò rarissima. Contingere huiusmodi aliquando posse, negari nequit: extante præsertim exemplo apud Antonium Beniuenum cap. 34. Pus etenim loco circa collum altioribus plagis inciso erumpens, inflammationem præcessisse vicinorù musculorum manifestum fecit.

De Respirandi difficultate cum suffocationis periculo.

CAPVT XIX.



CRE erat gelu, Ianuarius mensis, noctis initiũ tempus, cum nobilis vir assidens foco, Bacchoque indulgens, vesicæ oncre premeretur. qui foras progressus, inspirato aëre frigido, moxque reuersus, adeò vehementi respirandi difficultate correptus, vt suffocatus prope modum fuerit, & nisi mox præstò fuissẽ, periisset. Hominẽ repperi pedibus suis vix insistentem: frontem tensam: sudores frigidos: alius præ angustia excrementa deposuerat: pulsus tam exiguus, vt penè nullus. Assumpto pulueris Croci scriptulo vno
cum

cum vini Cretici (vulgò Maluatici) duobus cochlearibus, subito restitutus, liberè respirauit, ab omni suffocatione liber. & potuisset in sanitate permanisse, nisi pulmo malè affectus fuisset: sed cum asperæ arteriæ ramuli subindè obstruerentur, quandoq; etiam respirandi difficultas recurrit; minus tamen quàm primo tempore vehemens, sed diuturnior, vt quandoq; duabus, tribus, vel etiam pluribus horis perseueraret. Crocus qui initio multum ac citò profuerat, postea exiguum, deinde nihil amplius contulit. Tentata sunt & alia plura remedia, sed frustra. Nam reuoluto mense defunctus est. In huius pulmonis inferiore sede ac basi, qua septo transuerso incumbit, reperti sunt abscessus duo; vnus in dextra, alter in sinistra parte. per meatus pulmonis purulentus ferebatur humor, qui inciso pulmone ex ipsis profluebat.

SCHOLION.

HVIUSCEMODI respirandi difficultatem, obstructio meatuum pulmonis & asperæ arteriæ, quoque peperit, quam

MEDICINAL OBSERVAT. 49

quam frigidissimus aeris inspiratus etiam auxit, meatus arctans atque constringens: ac idcirco prima inuasionē respirandi difficultas maior, quàm succedentibus diebus, cum aeris frigiditas non accederet. Faciliior autem huic inspiratio fuit quàm exspiratio: Dum enim spiritus attrahitur, pulmo explicatur, & bronchia liberiora fiunt: per exspirationem verò pulmo contrahitur, & meatus arctiores angustioresque redduntur.

De orthopnæa.

CAPVT XX.

QUORTHOPNOEA, de qua scribimus, exacerbationes siue accessiones quasdam habuit, quæ subinde singulis mensibus, quandoque rarius, & bis aut ter in anno inuadebant: & per humidam frequentius, quàm per siccam aeris constitutionem. Qui laborabat, XXXVI. (plus minus) ætatis annum agebat, cùm hac corripereetur.

In ipsis accessionibus admodum difficilis fuit respiratio: stabat toto tempore mensæ aut tabulæ alicui manibus innitens: efferebatur ac profluebat ex ore humor lentus viscidusque:

E cibum

cibum vix, potum ægrè admittere potuit: sæpè toto accessionis tempore stans abique cibo & potu complures horas transigebat. Posteaquam autem accessio conquieuiſſet, liberè quidem respirare potuit, & quocunque libuit abire: quatuor aut quinque miliaria quandoque vno die pedes perfecit, sed decumbere non valuit. Quotiescunque enim iacere conabatur, mox omnia circa respirationem moleſta. Noctu sedendum erat in sedili aliquo, nec aliter somnum capere aut conquiescere integrum erat. Agarico purgatus, visus est melius habere, sed ad exiguum tempus. Profuit etiam subinde Diacyminou & Diospoliticon: verum nec ab ijs, nisi pauco tempore, præsidium sensit. Vbi autem consenuiſſet, spontè & absque vllis remedijs à moleſta Orthopnœa liberatus hic est. Cessantibus multo tempore exacerbationibus, tandem periculum iacendi fecit: quod cum citra incommodum succederet, relicto sedili, in lecto per noctem decubuit.

Simili Orthopnœa & mercator
quidam

quidam correptus etiamnum iuuenis fuit. Nullum hic remediij genus intentatum reliquit: sanguinis detractioñe sæpè admisit: frequenter purgatus: aquam fontis in agro Leodiensi bibit, sed nullo succedente fructu. Tandem calculi in renibus doloribus, ac podagra correptus, ab orthopnœa liber factus, decumbere potuit, qui antea quoque aliquot non paucis annis in sedili somnum capere debuerat.

SCHOLION.

NEQVE alia huius Orthopnœæ causa subesse videtur, quàm tenax viscidusque pituitosus humor, asperæ arteriæ ramos obstruens, ac meatus intercludens: quo superabundante, morbi accessio contingit, quæ tantisper duravit, donec portio eius per os expurgata esset. Sed cur intermissionis tempore iacere, aut in lecto decumbere non fuit integrum? An quia non omnis humor excretus, & decumbendo minus liberi sunt pulmonis meatus, atque coarctari sic contingat, & idcirco quoque à lento humore facilius obstrui?

E

2

De

*De peripneumonia populari-
ter sauiente.*

CAPVT XXI.

PERIPNEVMONIAM no-
stra ætate bis populariter graf-
satam in memoria multorum
est semel anno 1557. Octobri: deinde
iterum anno 1565. Iannuario mense.

Præcesserat anno quinquagesimo
septimo supra millesimum quingen-
tesimum constitutio aëris ab initio
Iulij mensis sicca, & mediocriter pro
temporis ratione calida; præsertim Iu-
lio ac Augusto. Sub finem Septem-
bris, tertio ac quarto Calendas Octo-
bris, superuenit validissimus à Septen-
trione ventus, admodum frigidus.
mox destillationes plurimæ sunt na-
tæ: vnde citò validæ vehementesque
tusses, & lateris cum feбри, & respiran-
di difficultate dolores processerunt.
Lateris dolores non vehementes, non
punctorij erant, sed clementes admo-
dum: tertio die vel prius sputum pro-
diit cruentum: quinto, aut sexto, aut
septimo,

septimo, ad summum octauo mortui omnes sunt latere dolentes; quibus sectio venæ prætermiſſa, aut tempeſtiue non facta. At quibus ſanguis vel primo vel altero die detractus, euaserunt; quarto aut quinto die ſanitati reſtituti. Quarto verò aut quinto ſanguinem detraxiſſe nihil profuit, morbo iam confirmato. Humores deſtillantes tenues admodum, & non nihil acres fuerunt. Eclegmata idcirco vtiliſſima, quæ inſpiſſandi vim habent, acrimoniam retundunt, & aſpera leniunt: quale eſt ex Ziziphis (Iuiubas vulgò vocant) ſerapium: Quod tenues deſtillationes inſpiſſat, acrimoniam obtundit, aſpera obliniendo lenit. Altera Peripneumonia diſſimilem occaſionem habuit. Decembri menſe anno 1564. gelu admodum acre extitit, per quod non modò omnia reliqua flumina vbique, ſed & ipſe Scaldis in portu Antuerpiæ (quod admodum raro contingit) adſtrictus fuit. decidit per id temporis nix admodum crebra. Poſt Calend Ianuarij anni 1565. frigoris remiſſio ſex aut ſeptem die-

E 3 rum

rum successit; sed exigua admodum, sicut neque nix, neque glacies dissoluerentur. Per hos dies vapores multi eleuabantur, qui cum interdiu dissolui ac discuti non potuerunt, nec altius ascendere, nocturnis frigoribus densati, inferiorem, & quem haerimus aërem, inficientes, crassum humidumque eum admodum reddiderunt.

Ab huius autem tam crassi aëris, & vaporibus infecti inspiratione, morbi circa pulmones, atque in ipsis etiam pulmonibus, exitiales nati sunt: quibus infinita hominum multitudo mox correpta fuit. Nulli autem citius aut grauius affecti, quam qui hora vna aut altera post Solis occasum aëri sese exposuerunt. Nam interdiu, & praesertim ipsa meridie, aut paulò post, aër minus crassus extitit, nec ita citò aliquem offendit: multis profuit focus elegans ex quernis lignis, qui hos in sanitate continuit; aëre in cubilibus ac coenaculis resiccato ac puriore reddito. Morbi per hos dies erant tussés, rauedines, respiran-

spirandi difficultates, & plurimi vnà laterum clementes, non punctorij, cum febris dolores, hoc est, peripneumoniæ.

Fuit autem hæc peripneumonia non minus quam superior exitialis: necessum quoque erat in hac mox primo aut altero die sanguinem detrudere. quando cessatum est, nulla salutis ac vitæ spes reliqua erat. Sputum in hac processit crassum, sanguini permixtum: nonnullis biliosum, quorum nemo seruatus. Eclegmata desiderabantur, quæ pulmonis meatus expurgarent, & ab infarctu liberarent: non tamen valdè calida, vt serapium ex capillis Veneris, siue Ruta muraria, ac quod ex dulci radice paratur. Ex hyssopo quoque quandoque profuit. Vtroque autem tempore morbum hunc non Pleuritidem, sed Peripneumoniam fuisse, mortuorum corporum dissectiones coràm ostenderunt.

E 4 De

*De Lateris dolore, qui phthisi-
cis superuenit.*

CAPVT XXII.

PHTHISICOS diuturnitate mali etiam extenuatos, lateris dolore quandoque corripitur: qui subinde valdè molestus, & respirandi libertatem impedit; febrilem tamen non multum intendit calorem. His pulmo membranæ costas subcingenti ita firmiter agglutinatus adhæret, vt sæpenumero non absque violentia auelli queat. Concepto aliquo spiritu frigido, dolor superuenit. Tollitur ac curatur calorificis, vt fomento ex floribus chamæmeli & cumino; quod multis benè fecit: sacculo hæc insuere oportet, qui deinde vino candido rigatus, calens dolenti loco imponitur. Venam secare qui temerè audent, quantum sanguinis demunt, tantum vitæ detrahunt.

SCHOLION.

NON modo autem istis sanguis perperam detrahitur; verum & alijs, ex crassiss

sis viscidisq; humoribus, latere dolentibus: Ingerunt enim quandoque sese crassi viscidique pituitosi humores in thoracis spacium, tùm & in ipsos pulmones, qui multitudine sua subcingentem membranam distendentes, dolorem adferunt; & vias spirituum intercipientes, spirandi difficultatem inducunt. Nam & his sanguinem, præsertim copiosum, detrahère, est mortis causam ægris præbere: vt Aëtius scribit Tetrab. 2. lib. 4. cap. vltimo.

De Calculo pulmonis.

CAPVT XXIII.

GENEROSVS ac Illustris quidam Baro calculum sæpè cum sputo excreuit, qui in extremis asperæ arteriæ ramulis ac propaginibus natus, loci figuram referebat: forma oblongus, teres, tenuisque: subinde adnatis breuibus ramulis, colore candidus. Aderat tussis satis vehemens, absque qua excerni non potuit, & sputum crudum. Vñus multis annis feliciter serapio ex Adianto, quo & tussis minus molesta reddebatur, & calculus facilius ad exitum mouebatur.

E 5 tur.

tur. Tandem tussi vehementissima superueniente, vase magno pulmonis rupto, sanguineque copiosissimè profuso, extinctus est.

Serapium ex Adianto hunc in modum paratum fuit.

℞. Adianti legitimi,
Capill. Veneris vulg. hoc est,
Rutæ murariæ, vtriusque
sesquiunciam,
Glycyrrhizæ vncias duas,
Radicum Rusci
Asparagi, vtriusq; vnciam,
Seminis maluę drachmas duas,
Aquæ puræ libras quatuor.

Fiat omnium decoctio vsque dum
aquæ libræ duæ tantum supersint.


Colato addantur Sacchari vn-
ciæ duodecim,
mellis cādidissimi vnciæ tres,
aquæ ex hyssopo destillatæ,
vncias quatuor.

Iterum coquantur simul, dum ad
serapij consistentiam perueniant.

De

*De sanguine spumoso cum tussi
reiecto, & pulmonis
sphacelo.*

CAPVT XXIIII.

 V M tussi sanguinem excerni, modò pulchrè rubentem, aliàs pituitæ, sputo aut puri permixtum haud infrequens est: Nigrum verò atque adeò spumofum eijci, vt concretus & vndequaque porosus spongiam aut pumicem referre videatur, rarissimum.

Huiusmodi autem à nonnullis cum tussi reiectum, non ex vase aliquo rupto, aut ex pulmonis ulcere, sed ab ipsa pulmonis substantia, ac parenchymate profusum suspicati fuimus: nec fefellit nos coniectura. Nam pictoris cuiusdam, qui cum valida tussi huiusmodi sanguinem reiecerat, pulmonis pars quædam nigricans reperta, & sphacelo correpta, in qua magnus & profundus sinus: nulla interim sanie, nullo pure, vel hanc, vel reliquam partem occupante. Atque ex
hoc

hoc sinu sanguis corruptus, nigricans, atque cum eo siderata parenchymatis pars cum tussi reiecta.

Similem & Ichthyopola quidam sanguinem expuit, cuius & pulmo eodem affectus modo fuit.

Cerviisæ coctor huiuscemodi sanguinem cum valida tussi ter reddidit: in huius autem pulmone plurima parte nigro, tres patuerunt sinus. Semper autem talem affectum incurabilem iudicauimus. vitam tamen produci ad aliquod tempus posse, bona beneque instituta vitæ ratione, haud alienum est. Pictor plus quam mensem superuixit: Cerviisæ coctor bis euaserat, sed in tertia expuitione subito periit: veluti & Ichthyopola, qui & in sanguinis sputo defecit.

SCHOLION.

DE huiuscemodi sanguinis sputo sensisse videtur Hippocrates Aphorism. XIII. lib. V. Quicumque, ait, spumofum sanguinem expunt, ijs è pulmone eductio fit. Nam qui ex vase disrupto, aut vlcere profunditur, haudquaquam spumofus apparet. Fatetur ipse Galenus in commentarijs, sæpius

MEDICINAL. OBSERVAT. 61

pius se vidisse sanguinem plurimum bene coloratum expui, quem ratio, ait, dictat ex aliquo pulmonis vase prodire. Sed hunc spumofum fuisse non addit. Spumofus sanguis, vel, ut Hippocrates, ἀφρώδες αἷμα, naturam ac figuram eius retinet, unde abscessit. Pulmonis substantia laxa, rara, & porosa est: talis & sanguis, quem cum tussi profusum scripsimus; cui parenchymatis partem coniunctam & commixtam fuisse satis apparet.

De Ulcere ventriculi.

CAPVT XXV.

ULCERARI ventriculum non minus quam alias corporis partes, à ratione haud alienum est.

Honestà quædam matrona, annos (plus minus) LX. nata, ex ore spiritum foetentem multis emiserat annis: è naribus graecolens quoque muccus cōcretus subinde extrahebatur, virens aut omninò varij coloris: dolor circa ventriculi regionem assiduus, non tamen valdè molestus; ut, quem lenire poterat sacculus, in quo herbæ, semina, & aromata quædam, ventriculo commoda, vnà cum gossipio confutæ erant.

erant. Mens & sensus ad extremum constiterunt: longo morbo confecta è vita discessit.

Ventriculus huius exterius ab omni parte superficietenus exulceratus extitit, & quæ ipsum contingebant vniuersa, non tamen alia, quàm qua ventriculo contigua erant parte. Cerebri substantia integra, sed copioso, admodum humori veluti innatans: qui fomes esse potuit mucchi, qui sæpè in naribus concreuerat.

SCHOLION.

GR A V E O L E N T I A ex ore varijs de causis effertur: quandoque in ore, faucibus, aut iuxta nares, vel in ipsis vitium consistit: subinde in pulmone latet: quandoque verò ex ventriculo odor procedit. Tradunt recentiores scriptores vitio ventriculi graueolentiam fieri; maiorem esse corpore ieiuno, minorem verò ab assumpto cibo. Verùm huius matronæ ex ore fœtor semper similis fuit: Neque vnquam siue post cibum, siue ante cibum remissior. Vlcera tamen ventriculi causam fuisse graueolentiæ, satis apparuit.

De

De Vomitu sanguinis.

CAPVT XXVI.

GALENVS lib.5.cap.5.de locis affectis, sanguinem è iocinere aut liene quandoque per ventriculum vomitione reijci testatur. Contingit autem non modò iocinore, aut liene malè affectis, sed & mensibus suppressis sæpenuerò hoc modo expurgari. A quocunque autem viscere, siue à qua parte in ventriculum influat, semper cum molestia, violentia, magna virium prostratione, ac *λειποθυμία* euacuatur: sic vt nulla sanguinis detrahendi (quod nonnulli præcipiunt) occasio relinquatur. Diuersiones, veluti brachiorum ac crurum frictiones adhiberi possunt: sed vnicè laborandum, vt vires conseruentur, & lapsæ reparentur, nam frequenter in ipsa vomitione, & citissimè quidem, æger deficit, præsertim si ex iocinore efferatur: veluti cuidam accidit, qui postquam longo tempore ex iocinore malè habuisset, sanguinis violenta superueniente vomitio-

1.

mitione, mox sublatus est.

2.

Quibus verò ex liene sanguis funditur, rarò in prima vomitione deficiunt; sed vel recurrente, ac subinde sæpius, vomitione; vel ex ascite pereunt. quæ huiusmodi sanguinis vacuationem, præsertim frequentius superuenientem, subsequitur. Ab hac autem neminem seruatum nouimus. Mulier quidem quædam quæ post frequentes vomitiones, in asciten inciderat, sanitati restituta videbatur, & ab aquoso humore liberata; sed superueniente paulò post denuò sanguinis vomitione, extincta est. Viro quoque cuidam, qui à frequenti vomitu sanguinis, Asciticus factus fuerat, per prominentē vmbilicum lanceo filo siue licio transmissio, aquosus humor sensim effluerat, sed nihilominus non multò post mortuus est. Huius lien sanguini concreto similis, substantiæ soliditatem haud retinens, facilè in partes soluebatur. Quandoque siquidem cum venter amplius distendi nequit, vmbilicus foras erumpit, & in tumorem attollitur, aquoso distentus ac repletus humo-

MEDICINAL. OBSERVAT. 65

humore: quod Græci ὕδρῳμαλον appellant. Et tunc quidem per hunc laneo filo transmissio, vel etiam eodem scalpello aperto, humor effluit; nullo subsequente fructu alio, quàm quòd æger à distentione ventris pauco tempore liberetur. Prius enim quàm umbilicus erumpit, iam interna viscera corrupta ac putrida sunt: proinde sanitas nec expectari, nec sperari potest. Nam vt Hippo. Prorrhethicon lib. 2. Eum, qui ab hydrope, siue aqua intercutim correptus est, & superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet. Mulieres autem & virgines, quibus suppressi menses, minus à sanguinis vomitione periclitantur; neq; enim viscera harum corrupta sunt: & superueniens menstrua purgatio ab omni periculo eas vindicat.

3.

SCHOLION.

SANGVINEM vomitione ex tribus interioris corporis locis reiectum scripsimus: ex iocinore videlicet, liene, ac ex utero: Perquam rarò autem ex iocinore profundi contingit. Cui autem ex hoc profusus

1.

F

&

& inde offendebar. Crebrò, post largiorem vini potationem, calorem per vniuersum corpus sentiebat veluti febrilem: aderat sitis, linguæ ariditas, urinæ rubedo, & subinde in dextro hypochondrio quidam dolor. Supercalfactus, mox remedijs quibusdam sibi familiaribus utebatur, vt Zulapio ex aquis Cichorij, Intybi, Acetosæ, cum Serapio ex Cichorio, ex Intybo. quo cum sæpè restitutus sibi videretur, tandem post languorem quendam, corporisque deprauatum, & ad citrinum luteum inclinantem colorem, sanguinis vomitione copiosa correptus, defecit. Ex liene sanguinem vomitione reiicientes multos cognouimus: pallentes hi fuerunt, & sæpenumerò in sinistro horum Hypochondrio tumidus splen manifestè sentiebatur, sed ante vomitionem. Nam à vomitione, exonerato iam splene, subsederat tumor, nec deprehendi poterat. Plerique horum tertîa, aut quarta vomitione, vel etiam frequentiore (multis inter singulas menses vt plurimum intermedijs) perierunt: alij post crebras vomitiones in ascitem lapsi, tandem & mortui sunt. Vnum aut alterum nostro consilio post vnicam vomitionem seruatum meminimus: & quidem frequenti Absynthij quoquo modo vsu; vt in nostris stirpium historijs cap. de Absynthio scripsimus.


Ab

MEDICINAL OBSERVAT. 67

Ab utero autem suppressis mensibus raro
item sanguinis vomitio superuenit. Virgini
verò cuidam accidisse mihi observatum:
quæ in ipsa vomitione grauitè laborauit:
postea verò idoneis adhibitis remedijs, &
sanguine ex interiore vena prope talum de-
tracto; cùm menstrua purgatio successisset,
benè se habuit. quod & Aphorif. 34. sect. 5.
Hippocrates docet: Mulieri sanguinem euo-
menti, mensuris erumpentibus, solutio.

De omnium internorum vis- cerum citra doloris sen- sum corruptione.

CAPVT XXVII.

LCERE ventriculi visus fuit
quidam ceruisiæ coctor labo-
rare; non tamen exterioris, sed
interioris partis: huic non modò ven-
tricus malè affectus erat, sed omnia
interiora viscera corrupta ac foetidif-
sima. Multo tempore hic pallidus ad-
modum fuerat, & mali in facie colo-
ris: circa digitorum articulos tumo-
res habebat: delectabatur ceruisia for-
ti & medicata, quæ scilicet præter fru-
ges,

ges, & alia quædam admittebat, quæ ebrietatem faciunt: inter quæ & chamæleagni fructus sunt. Contigit autē huic anno quodam, Martio mense, ut ventriculo pure ac crudis quoque humoribus repleto, cibum potumque non solum auersaretur, sed conatus, ne transmittere quidē potuerit. Pro- fuit serapium acetosum, cuius vno aut altero cochleari assumpto, mox pituitam crudam, copioso pure per- mixtam, vomuit: quod cum aliquoti- ens deinde faceret, & vomitus tandem non amplius succederet, ad sanitatem se rediisse sibi persuadens, alia ac plu- ra remedia admittere recusauit. Su- peruenit paulò post digiti vnus fini- stri pedis sphacelus: qui cum arte ac diligentia experti chirurgi constitis- set, mox dextrum pedem gangræna occupauit, & velociter progrediens breui supra talos peruenit. Hoc tem- pore cū de vitæ periculo admonere- tur, respondit se nulla corporis parte dolere, neque vnquam antea doluis- se: Ita absque dolore, paucissimis post diebus, sub initium mensis Iunij, è vi-
ta

MEDICINAL OBSERVAT. 69

tamigrauit: tertio videlicet mense, ex quo pus vomuisset. Huius omnia viscera, quæ aperto corpore in conspectum venire, corruptissima fuere, multo pone consistente pure: quorū tantus foetor, adeoque grauis ac molestus, vt diutius hærere non fuerit possibile; multò minus singulas partes lustrare: & tam foetidum corpus necessum fuerit mox sepulturæ committere, alioqui vniuersæ familiæ grauem molestiam allaturum. Videtur hic interna viscera sensu destituta habuisse: contrà planè, quam nonnulli alij; quibus hæc sensu prædita sunt.

De ulcere in gibba Iocinoris parte.

CAPVT XXVIII.

MVLIER quædam ex plebe dolore graui in dextro hypochondrio torquebatur: color eius quasi ictero laborantis: corpus extenuabatur: tumor pedum aut ventris successit nullus: vrina rubicunda iocinoris inflammationem præ se ferebat:

F 3

rebat:

bat: nec deerat febris. Cùm autem nullis remedijs dolor cederet, tandem vitæ finem fecit. In iocinoris huius gibba siue conuexa parte magnum, amplum & profundum vlcus in conspectum venit, quod verisimiliter inflammationi successit. Fuere huic viscera, atque ipsum Iecur sensu prædita; contrà planè quàm superiori, cui citra dolorem viscera computruerant.

De Inflammatione musculorum abdominis.

C A P V T XXIX.



INFLAMMATIO musculorum abdominis ex ijs est, quæ rarissimè contingunt: Idcirco & Medicum iudicio falli facile contingit. Scriba' quidam, cum ruri haud procul Antuerpia esset, dextri lateris cum febris dolore correptus, sed iuxta, ac paulò infra nothas costas. Medicum accersuit, qui venæ sectione imperata, eclegmata, linimenta; præscripsit, qualia Pleuritide laborantibus adhiberi solent, (Pleuritim enim morbum

morbum esse existimabat) Ab his verò cum malè æger haberet, febrisque intenderetur, domum vehi postulavit. ad quem deinde vocatus, hominem offendi febricitantem quidem, sed debilem, & viribus parum valentem, dextrum hypochondrium non nihil dolentem; ventre verò vehementer distento, ac veluti hydropici alicuius tumente. Exhibui mox purgans medicamentum, sed in exigua quantitate. quod cum feliciter cessisset, postridie idem, sed in maiore quantitate propinaui. quo, expurgatis multis vitiosis humoribus, sinistra ventris pars tota subsedit: dextræ verò tumor permansit. Et cum non modò 'tumida hæc pars relicta esset, sed & durior, ac digitis renitens, cataplasma admoui, quo tumore intra paucos dies emolito, nusquam verò apparente loco, per quem pus erupturum sperari poterat, sectionem adhibuimus, adhibita diligentia ne peritonæos membrana vulneraretur: qua circa inferiorem ventris partem facta, mox copiosum effluxit pus; quo deinde expurgato,

vulnereque solidato, æger sanitati restitutus est: adhibita interim bona victus ratione & paucis remedijs.

SCHOLION.

MVSCVLORVM autem hanc abdominis, ac eius qui ex dextro hypochondrio oritur, fuisse inflammationem, ipsa curatio ostendit. Vnde etenim pus nisi ab huius inflammatione? Non est siquidem verisimile, iocinoris fuisse inflammationē, & ab hac pus intra peritonæum & abdominis musculos abscessisse. Cùm autem iste musculus ex sexta, septima, & octaua costis originem ducat, haud mirum, si lege consortij dolor ad costas initio peruenierit, & lateralis inflammationis speciem exhibuerit; præsertim in profundo latitans, & nullam sui notam foris ostendens.

De sphacelo Iocinoris.

C A P V T XXX.

DE pulmonis sphacelo capite XXIIII. egimus, de Iocinoris sphacelo modò agendum. Nobilis quidam ac generosus vir nonnullarum rerum suarum iacturam passus, graui mœrore & animi dolore correp-

correptus, in melancholiam incidit, assidue tristis, cogitabundus, ingemiscens: parsimonia iacturam suam reparare laborabat: metuebat lemures & spiritus quosdam. Cum autem malum intenderetur, nec spes aliqua superesse videretur, ut ad mentis sanitatem redire posset, commissus est monachis quibusdam, apud quos multis annis vixit, perpetuo sui similis, cogitabundus, suspiria ducens, solitudinis amans, à risu ac iocis omnino alienus. Postquam autem hoc modo annis (plus minus) XX. vixisset, tandem de virium suarum debilitate conqueri coepit, & cibum ac potum auersari: quæ tamen citra appetentiam admisit, & admonitus aliquanto tempore sumpsit. Nulla aderat febris: sitis nulla; uniuersum corpus frigere videbatur: pedes processu temporis œdematosi facti sunt. Urina autem rubicundæ erant, veluti si febris ardens, aut iocinoris inflammatio adfuisset: quæ, quales reddebantur, permanebant, nec ab aëre, aut frigore perturbabantur. Malo autem ingrauescente, ad alium ci-

F 5 bum

bum sumendum, præter exiguam for-
bitionem, adduci haud potuit. Ita tan-
dem deficiente naturali facultate, in-
edia quodammodò confectus, è vita
migravit. Huius hepar colore vnde-
quaque nigrius, quam secundum na-
turam, apparuit; sed tamen minus ni-
gricās, quàm pulmonis sphacelo cor-
repti substantia: impressorum digito-
rum, vel alterius cuiusque rei vestigia
facilè retinuit: nec minus facilè soluta
parenchymatis vnitae, rimas contra-
hebat. Manifestum hinc hepar huius
sphacelo quoque correptum, & vrine
ruborem, haud à calore iocinoris, sed
ex debilitate penè abolitæ facultatis
naturalis, natum fuisse: vrinam eadem
de causa talem permanfisse, qualis fuit
reddita; quod crudissimis proprium
est.

*De Vrina in morbis frigidis,
& ex cruditate natis,
rubente.*

CAPVT XXXI.

RVBET

RVBET autem vrina non modò sphacelo correpto iocinore, vel in morbis calidis, vt in febribus ardentibus ac tertianis, partiumque internarum inflammationibus: sed & non rarò iocinore ac ventriculo per diuturnos & longos morbos cum refrigeratione debilitatis. Tingitur quoque & non rarò vrgentibus coli doloribus, quando videlicet crudi humores intestina occupāt, & excrementorum exitum remorantur.

Honestus ciuis quinquagenarius liberatus à quartana, quæ menses quatuor aut quinque cum detinuerat, in lenteriam incidit. alui excrementa liquida erant & cruda admodum: nullus febrilis calor restabat: extremeque partes crebrò frigebant: vrinae autem admodum rubentes, vt in febribus ardentissimis, ac viscerum inflammationibus apparent. Verum nos harum nullam rationem habentes, sed ad alia & cruditatem respicientes, consulendum putauimus ventriculo: deinde & iocinori per præcedentem quartanam debili-

debilitatis: proinde victus rationem calfacientem & resiccantem institui-
mus, vinumque exhibuimus genero-
sissimum ac potens, quale Hispanum
est. Medicamenta fuere Diagalanges,
Diatrionpepereon, & eius generis si-
milia. Quibus tantum promouimus
ac profecimus, vt concocta appare-
rent excrementa, & vrinæ color re-
mitteretur, ac similis sanorum redde-
retur. Quibus sic se habentibus, cum
se sanitati restitutum æger existima-
ret, secretò ceruisiam bibit: mox au-
tem vrinæ color iterum in rubore
multum intensus, manifestè ostendit,
ex ventriculi cruditate ac refrigeratio-
ne vrinam quandoque tingi, ac valdè
rubicundam reddi. Deinceps itaque à
ceruisia abstinuit; vrinæ verò & mox
iterum sanorum similes. Nec prius
ceruisia vsus est, quàm integrè sanitati
restitutus foret.

Alteri, viro quidem generoso, vrina
quoque admodum rubens, absque fe-
bri tamen fuit, qui coli doloribus vnà
cum alui obstructione torquebatur.
Profuit enema anodynon, à quo, mox
leua-

leuato dolore, statim similiter vrinæ color valdè remissus, & sanorum similis redditus: cum verò ab enemate cessaretur, recurrente dolore, iterum vrina in rubore tangebatur, donec sæpius repetito enemate, coli dolor omninò conquieuisset, aluiusque sponte sua succederet, tunc enim vrinæ colores, quales sanorum, perstiterunt.

SCHOLION.

HÆC autem propterea referimus, quòd plerique persuasum habeant, non aliunde quàm à calore vrinas tingi posse, qui tali in colicis doloribus apparente, temerè ad febris curationem confugiunt, neglecto coli dolore, quem etiam augent. Quod si autem isti legissent, quæ Galenus scribit lib. i. ad Glauconem, non potuissent ignorare, vrinas etiam à cruditate, & in frigidis morbis rubicundas quandoque esse. Nam vbi de quotidiana febris agit, quæ crudorum humorum soboles est, sic scribit: In quotidianis aut albæ, aut tenues, vel crassæ, & turbulentæ, aut rubræ vrinæ apparent. Addit in commentarijs Martinus Akakia, rubras fieri, vbi per imbecillitatem iecoris aut venarum, serum aut rubra sanies vnà cum vrina emittitur.

De

*De Vrina rubente propter re-
num debilitatem.*

CAPVT XXXII.

NE C rarum quoque sanguine permixto vrinam reddi rubicundam: sed cum magna parte vel crassus vel grumofus sit, facilis eius dignotio. Sed adeò tenuem vrinæ permisceri, vt substantia eius nullo modo permutata colorē tantummodò intendat, admodum rarum est.

Sic autem Iuueni XXVIII. (plus minus) annorum contigit. Reddiderat hic vrinam aliquot mensibus perpetuò rubentem, consistentia satis tenuem; & ferè persimilem acutè febricitantium lotio. Consuluerat seniores Medicos, qui remedia veluti supercalfacto iocinori adhibuerant. Tandem ad me, tùm etiamnum iuuenem, venit: lotium inspexi rubicundum quidem: cum autem non appareret iuuenis, (qui præsens aderat) febricitare, percontatus num aliquando febricitaret, negabat, sed se continuò quasi frigere iam ab aliquot mensibus respondit.

spondit ; corpusque suum extenuari
sensimque macrius reddi, viresque in-
firmiores, & respirationem difficilio-
rem; & ea, quibus eousque usus esset,
nihil profuisse. Quibus intellectis, pla-
cuit in alterum diem lotium relinqui,
atque tunc sedimentum eius confide-
randum; quod quidem sanguinis in-
star (vt, quod non nisi sanguis esset)
rubebat, reliqua ac superiore vrinæ
parte exiguum colorata, & pallidè lu-
tea, nullam febris notam referente:
Proinde nullum in iocinore calorem
subesse collegi, sed renes debiliores fa-
ctos, venarumque ora rariora, sangui-
nem tenuem dimittere: Idcirco mu-
tata curandi ratione, ijs usus, quæ re-
nes roborare, venasque adstringere
potuerunt, adhibita victus proba ra-
tione, & simul lacte caprino: ac sic vri-
na rubere desijt, & corpus nutriri, vi-
resque reparari contigit: atque ita
Iuuenis sœnitati tandem restitutus
est.

SCHOLION.

HVIVSCEMODI sanguinis pro-
fusionem, quæ accidit propter oscula
venarum

- venarum rariora facta, vel ipsum sanguinem attenuatum, διαπύδισιν, quasi transcolationem vocant. Contingit verò & alijs modis sanguinem cum vrina excerni: Quandoque etenim calculo aliquo maiusculo per vretaras descendente, sanguis vnà comitatur, sed
1. qui nigricans & grumofus redditur. Calculus verò etiam in vesica existens profusi sanguinis quandoque causa est; quando laborans equitatione vel aliàs vehementius sese exercuerit.
 2. Menstrua quoque quandoque cum vrina permiscuntur.
 3. Iam repressus de gingiuis profluens sanguis ad vesicam descenderat; vt cap. X V.
 4. Vulneratis renibus vrinæ initidò sanguinem, deinde pus admixtum habent: veluti mulieri contigit, quæ pugione vulnus iu lumbis acceperat: mox enim sanguineam, deinde purulentam vrinam reddidit, donec & vulnus & ren curatus esset; quem vulneratum fuisse, particula eius è vulnere exempta ostendit.
 5. Exulceratos renes comitatur & sanguis cum vrina, pus deinde sequitur, nisi prius renes curentur.
 6. Iam & à magnæ ætatis senibus crassa & sanguine permixto in rubore nigricans quandoque vrina redditur, quæ penè abolitam
- renum

MEDICINAL. OBSERVAT. 81
renum facultatem ostendit, & parum vitæ
superesse præfagit.

De Scorbuto.

CAPVT XXXIII.

INTER raros casus, morbus
haud dubiò annumerandus
venit, quem nostra hæc ætas
Scorbutum appellat: Germani Scor-
buck. De quo tamen breuiter scripsi-
mus Hist. stirp. Pempt. quartæ lib. 5.
cap. de Cochlearia; tamen & hoc loco
paulò latius de eodem agendum haud
abs re fuit. Est autem morbus iste lon-
gus ac natura sua diuturnus, grauis
item & molestus. Germaniæ, quæ ad
mare Balthicum, *ἐπιχώριος* ac familia-
ris fertur: ac deinde oræ maritimæ Fri-
siæ ac Cimbricæ Cherronesi, quæ mo-
dò Dania. Vnde iam olim ad Braban-
tos peruenit: nunc verò & Bohemiæ
ac Silesiæ innotescere incepit. Tu-
ment ac exulcerantur gingivæ, & non
rarò supra ipsos dentes attolluntur,
oris foetor inde accedit. Crura & quā-
doque pedes liuores occupant, haud
dissimiles ijs, qui parte aliqua suggilla-

G

ta

ta apparent: Liuent quandoque & femora: in brachijs verò & huiuscemodii liuores videre, sed perquam rarò, contingit. Subinde verò in femoribus non quasi suggillationes, sed puncta liuentia reperiuntur, qualia à pulicum morfu relinquuntur. Si magnus & diuturnus est morbus, & remedium non adhibeatur, tandem & hypochondria liuent: postremò verò & ventris tormina accedunt, subsequente morte. Præter verò hos liuores, faciei & reliqui corporis magna ex parte pallor accedit: pedes verò & quandoque intumescunt. Morbi causa crassus frigidusque humor, qualis est melancholicus succus, sanguinis fex, non ex adustione natus: cuius fomes est praua victus ratio; præsertim secale corruptum, per quod anno 1556. apud Brabantos irrepsit. Nam cum propter validam famem, secalis vsus esset ex Borussia aduecti, non pauci à Scorbuto malè habere inceperunt: nonnulli tamè grauius, alij mitius laborarunt. plerisque nulli liuores apparuerunt, sed circa gingiuas mali labes sese tantummo-

MEDICINAL. OBSERVAT. 33
tummodò ostendit. Olaus Magnus in
Septentrionalium gentium Historia:
Castrensis, ait, est morbus, qui vexat
obsessos & inclusos: ac salforum vide-
tur ciborum esu nasci, frigida verò
murorum exhalatione foueri. Noui
ego quendam admodum angusto car-
ceri inclusum, loco non humili, sed
editiore, vbi nulla murorum exhala-
tio; & aëris liber per patentés fenestras
ac cancellos erat aditus, hoc morbo
satis grauiter affectum; cui non praua
victus ratio, sed angusti & diuturni
carceris tedium morbum peperit.
Curatio huius morbi per nonnul-
las herbas præcipuè perficitur, vt
sunt Nasturtium hortense, tum &
aquatile Nasturtium: quod à Diosco-
ride $\Sigma \iota \sigma \upsilon \mu \beta \rho \iota \omicron \nu \epsilon \tau \epsilon \rho \omicron \nu$: Item & Cochlea-
ria, à forma cochlearis dicta, quæ sa-
pore Nasturtium refert. Commenda-
tur verò & Anagallis aquatica: verum
hec viribus minus præstat. Decoquun-
tur in vino, aut in lacte à tenuioribus:
decoctum aliquot diebus bis aut ter
in die bibitur. Atque hoc solo non-
nulli contenti, haud alia remedia re-
G 2 quirunt:

quirunt: os etiam ac gingiuas eodem, quod bibitur, decocto abluētes: Nonnulli verò & contusarum herbarum succum propinant, qui efficacior decocto est. Vñus sum & quandoq; Conserua (vt vocant) ex Nasturtio, quæ cū vino propinata admodum efficax fuit. Sed ex ratione est, vt præter istas herbas, bona victus ratio instituat, & prauī humores vacuatione, si vires ferant, minuantur: ori verò ac gingiuis commodis remedijs prouideatur.

Laborandum autem ante omnia, vt panis ex optimo sit tritico paratus, & probè sit coctus ac fermentatus. Ab omnibus falsamentis & fumo duratis abstinendum: pisces quoque haud cōueniunt: fructus horei crudi perniciosi sunt. probatur cibus ex optimis carnibus. Vino vtendum est albo, aut, si ita conditio ægrotantis postulat, ceruisia tenui & probè defecata. Humores per aluum vacuandi sunt: Vtilia sunt folia senæ, epithymum, Veratrū nigrum, si vires ferant. & ex compositis, Confectio hamech: quibus ea addenda sunt, quæ & morbi conditio, ac
simpli.

simplicium facultas requirit. vt sunt radices polipodij, aut capparis, Asplenium, vulgò Ceterach, Hepatorium vulgare, Cassytha, fumus terræ, vuz passæ, anisi aut fœniculi semen: Admisceri verò & Agaricum quandoque expedit, vel etiam Hermodactilos. Sanguinis detractio nō, nisi vbi vires valide sunt, & plenitudo magna, conueniens esse potest: Morbi enim causa omninò frigida, & per sanguinis missionem corpus amplius refrigeratur. Ori quoque prouidendum est collutionibus ex herbis calidis, propter morbi causam, vt diximus, frigidam; vt ex thymo, rosmarino, saluia, hyssopo vulgari, quibus adstringentia quædam admiscenda. veluti galbuli Cypressi, radix bistortæ, aut nonnihil aluminis: quæ aquæ soli, aut cum vino mixtæ incoquenda sunt. Decocto os & gingiue crebrò ablucendæ, præsertim addito nonnihil mellis rosacei, quod ad abstersionem facit. Vni tantummodò me sanguinis missionem imperasse recordor, illi nempe quem scripsimus angusto carceri

G ; aliquan-

aliquandiu inclusum fuisse : qui vir erat fortis , boni habitus , temperamenti calidi , cuius pulsus secundum omnem dimensionem magnus , & valdè fortis , præter alia , plenitudinem ostendebat. Huic aliquot vnciæ ex sinistro brachio detractæ fuere : postea exhibitum medicamentum purgans ex ijs , quæ superius ostendimus , additis hermodactilis & confectione Hammech. Deinde vsus decocto Nasturtij ex aqua & vino , paucis diebus sanitatem consequutus fuit : semel atque iterum intermedijs diebus purgatione repetita : & ori ac gingivis remedio adhibito ; quod fuit collutio , ex decocto hyssopi , saluiæ , rosmarini , cui additi galbuli cypressi , aliquot grana vulgò dictarum cubearum , & aliquid nucis myristicæ : postremò verò & nonnihil mellis rosacei ; quo oris malum facilè quoque emendatum.

Alij citra sanguinis missi onem curati sunt : quibus purgatio , deinde vsus Nasturtij vnius aut Cochleariæ herbe , & oris collutio ad sanitatem contulit. Imbecillibus verò & viribus parùm valen-

MEDICINAL. OBSERVAT. 87

valentibus nec purgans exhibitum. Nonnullis verò & solum oris medicamentum satis fuit, quibus videlicet solæ gingivæ malè affectæ. Podagrigo cuidam, si quando decumberet, mox liuores circa pedes & crura exorti sunt, qui ab assumpta Nasturtij cum vino Conserua citò euanuerunt.

SCHOLION.

HIPPOCRATES lib. de morbis internis, morbum quendam describit, *εἰλεον αἱματῆτην*, id est, voluulum sanguineum dictum; qui cum Scorbuto, si non per omnia, in plurimis tamen conuenit: Ex ore (ait) malè olet à dentibus, & gingivæ discedunt, & à naribus sanguis fluit: Aliquando etiam ex cruribus vlcera pullulant, & alia fanescunt, alia emergunt, & color fit niger & cutis tenuis. Sanguinè autem è naribus profluxisse in hoc morbo non memini obseruatum. Vlcers verò subinde nasci nonnulli affirmant; verum hæc mihi comperta affirmare nequeo. Nec hæc perpetuò adesse, sed quandoque, Hippocrates scribit. nigricant autem suggillationibus persimiles maculæ, & cutis supertensa, quia transparens, tenuis apparet. Quod autem sequitur: Est autem ad deambulandum ac laborandum promptus,

G 4 videtur

videtur corruptum. Nam malè habentibus cruribus ad deambulationem & laborem promptitudinem adesse, vix credibile. Proinde pro *πρόθυμος*, hoc est, promptus; rectius legendum, *ὄκ πρόθυμος*, hoc est, non promptus. Cum autem huius affectus causa, frigidus, crassus ac feculentus humor existat, & talem promptissimè lien recipiat, & ad se pertrahat, tumore quoque vnà afficitur, & maior fit. Quod etiam Hippocrates scribit Prorrheticon lib. II. Gingiuæ, inquit, vitiatæ & oris graueolentia his sunt, quibus splenes magni. Quicunque verò habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neque oris graueolentia, horum tibiæ ulcera praua habent, & (malim legere: aut) cicatrices nigras. Succedere autem spleni magno vel sanguinis vomitionem, vel Scorbutum, vel Ascitem à nobis frequenter obseruatum.

De Vrina intra peritonæum collecta.

CAPVT XXXIIII.



SCITICIS aquosos humores in cauitate ea contineri, quæ inter peritonæum & intestina, in confesso est: colligi verò & illis

MEDICINAL. OBSERVAT. 8,
illic urinam posse præcisis vreteris,
Galenus lib. I. de naturalibus facult.
prolixè docet: accidit verò & idem ve-
sica læsa ac exulcerata.

Monialis quædam virgo quinquaginta quinque aut sex annorum, multo tempore circa inguina & pubem doluit; nullis interim ex vtero prodeuntibus excrementis: superuenit tandem ventris tumor, quo in dies maiore factò, neque vllis cedente remedijs, mors tandè subsequuta est. Toto autem quo laborauit tempore, facies perpetuò elegantis & viuidi, vt in fanitate, perstitit coloris: sinistri tantummodò cruris supra talos dolor molestus erat, cum tamen nihil illic mali appareret. Huius venter non aquoso humore alio, sed vrina plenus extitit, quæ ex læsa & pertusa vesica in hunc influxerat. Vterus siquidem omninò exulceratus fuit, ac ita quidem, vt ne figuram suam retinuerit: vesica quoque, qua parte ipsum contingebat, similiter & aliquot foraminibus hians; per quæ vrina in ventris cauitatem delata fuerat. Reliqua viscera, he-

G 5 par,

par, ac lien, omni labe ac vitio carebant: atque idcirco color faciei, ut diximus, haud fuit permutatus. Quod autem ex utero excrementa nulla descenderint, hymen obstitit, quod natura virginibus concessit. Nam hoc integro, nihil ex utero descendere, aut deferri posse, vel hinc apparere potest.

De alui excrementis intra peritonæum collectis.

C A P V T XXXV.



VIRINAM vesica perforata in ventris cauitatem profluere superiore capite ostensum est: Sed & alui excrementa vulneratis intestinis eò quoque deferri possunt. Vxor fuit Medici, formosa & viuido calore prædita, carnosâ quoque & satis pinguis. Hęc posteaquam nupsisset, concepit, ac deinde peperit, sed fœtum nec plenè gestatum, nec vitalem. Post partum venter non modò subsedit, sed & paulò post auctior factus est, ampliusque quàm prius intumuit. suspicio

spicio nata est, collectos esse in ventre aquosos humores, tametsi faciei color non mutatus, sanitatem viscerum præ se ferret: nec pedes (quod sæpè hydropicis accidit) tumerent: & urinae sanorum similes. Exhibita quandoque initio hydragoga medicamenta, verum ab his nulla aquosi humoris successit purgatio: sed torsiones admodum molestæ, ut non temerè ab usu omnium medicamentorum abhorruerit, & Medici abstinerint. Cessatum itaque est ab omnibus purgantibus medicamentis. In hac autem tanta miseria annos (plus minus) duos vixit: ventre interea in tantam molem & altitudinem distento, ut vix genitales suas partes manu propria contingere quiverit. Admirabantur Medici quotquot eam subinde visebant ventris tantum tumorem, facie optimè colorata, & nullis morbi notis in urina apparentibus. Accessit successu temporis respirandi difficultas, quæ indies increscens ac molestior facta, nec ullis cedens eclegmatis, tandem vitæ imposuit finem. Dissecto ventre non
aquo-

aquosus humor, sed sordes nigre, quales in cloacis, effluerunt crassæ, foetide, quibus frustillatim omentum permixtum, quod solùm à tantis sordibus computruerat. Sordium autem tanta fuit quantitas, ut quatuor urnas vel amplius implere potuissent, quarum singulæ quadraginta libras mensurales continent. Distensio autem ventris tam quoque magna, ut peritonæum, cum amplius distendi non potuerit, aliquot locis à superioribus partibus ad inferiores usque fissum fuerit, & iecur cum liene ac ventriculo, relicta propria sede, cedente septo transverso, intra pectoris spatium ascenderit: pulmone cum corde sursum collum versus in angustias coacto. Quæ viscera integra nec vlla parte vitata fuere. Non libuit in tantis sordibus intestina eximere, & diligentius perquirere: sed dubium non est, sordes istas non aliunde, quàm ex intestinis vulneratis ac læsis profluxisse. Nec etenim alia via aut modo in hunc locum peruenire potuerunt.

De

De Ilei dolore.

CAPVT XXXVI.

PHARMACOPAEVS maximo Ilei tertio quoquo die dolore torquebatur. quo sæuiente febris aderat satis vehemens, & vmbilicus vnà cum circumuicinis partibus in tumorem attollebatur. Iniecto autem in ipsis doloribus enemate satis acuto, expurgatisque vitiosis, admodum viscidis, crassis, foetidisque fecibus, dolor conquieuit, febrisque cessauit. Quod cum sæpius contingeret, & nec desinèrent huiuscemodi tertianæ exacerbationes, nec enemata, nisi cum adhiberentur, prodesse, de alijs remedijs deliberatum. Tentata quædam sunt, sed cum nec his dolores integrè sedarentur, pilulæ Iliacæ occurrerunt, quæ à Rhafi lib. IX. ad Almanforem describuntur. Harum scriptulus in die quietis exhibitus, admodum prauos & vehementer foetentes humores eduxit: quibus expurgatis, Ilei dolor multum sopitus. cum autem in vniuersum non cessaret, eadem

dem in paulò maiore dosi exhibitæ:
quibus reliquis humoribus eductis,
Ilei dolor omninò conquieuit. De
istis pilulis in capite de Colocynthide
scripsimus in nostris de stirpibus Hi-
storijs. Earundem verò singularem fa-
cultatem sæpius, in ructu autem mo-
lestissimo valdè mirificam comper-
tam habemus. Hispano cuidam mi-
liti adeò molestus ac difficilis erat as-
siduus ructus, vt in extremis versari vi-
deretur, cùm ad eum vocarer. Vsus
fuerat admodum multis remedijs, sed
frustrà omnibus: nec quicquam per
hæc profecerat, nisi quòd vires eius in-
signiter forent deiectæ. Huic initio ex-
hibuimus pilulam vnâ decem gra-
norum pondere, per quam vitiosis ac
foetidis humoribus nonnullis expur-
gatis, melius habere videbatur: postea
paucis diebus interpositis data grana
quindecim, tertio verò scriptulus
vnus: quo assumpto & expurgatione
prauorum humorum succedente,
qui antea lecto affixus veluti moritu-
rus iacuerat, surrexit, & quocunque
libuit, ambulauit, & cibum potum-
que

MEDICINAL OBSERVAT. 63
que cum appetentia assumpsit.

De Coloflatu distento.

CAPVT XXXVII.

TONSOR quidam ex dextro hypochondrio cfferri sibi quiddam cōquerebatur, quod in sinistro conquiesceret, quo super ventriculi fundo transeunte, cibi potusque portio regurgitans, subitò per os exiliebat, veluti lagena aliqua coriacea compressa, eius quod in ea cōtinetur, cum impetu pars quædam reijcitur. Multorum imperitorum Medicorum opera vsus, vehementia medicamenta, ac violentissimas purgationes sustinuerat; sed cum huiuscemodi remedijs malum non cederet, tandem defecit.

Huius intestinum colon à dextro in sinistrum, & qua parte ventriculi fundo incumbit, flatu omninò distentum erat, & ab omnibus excrementis vacuum: reliqua intestina fecibus plena; ex quorum superioribus cum feces descenderent, impetu quodam violento per distentum

tum colon ferebantur, ventriculi fundo compresso. Vnde factum est, vt cibi potusque portio ad os subito regurgitaret.

De Tympanite.

C A P V T X X X V I I I .

TYMPANITEN cum Ascite in plerisque conuenire, & in paucis differre, multi sentiunt. Nam in vtraque subesse aquosum humorem & flatum; differre autem maioris minorisque ratione. In Ascite plus esse aquæ, minus flatuū. In Tympanite è contrà plures esse flatus; aquæ verò quantitatem minorem. Sunt autem & qui Tympaniten in Asciten trāfire posse credant; flatu videlicet inspissato, ac veluti nubilo reddito. Sed si Tympanites fuit, quem aliquando obseruauimus, multum ab Ascite differens est: difficillimus quoque ac acutissimus morbus, citoque interimens.

Monachus quidam multo tempore, aliquot etiam annis, circa umbilicum torsiones cum sonitu ac strepitu admodum molestas senserat, quæ nullis

MEDICINAL. OBSERVAT. 97

lis remedijs superari vnquam potuerunt. Tandem subitò quodam tempore venter vniuersus in tumorem prægrandem attollitur: vrina & aluus supprimuntur. Enemata & potiones nihil proficiunt, omnia frustrà, nulla succedentealui expurgatione: sic magnis doloribus confectus, vitam cum morte commutauit.

Simile & quiddam accidit Coriario, cui quoque venter citò tympani in modum distentus, sonitum pulsatus dedit. Nec hic vllis remedijs restitui potuit: aluo quoque & vrina suppressis.

SCHOLION.

DE hoc morbo scripsit Hippocrates Aph. XI. lib. quarti: Quibus tormina & circa vmbilicum labores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque aliter soluitur, in aquam inter cutem siccam firmatur. Hydrops autem sicca à posterioribus Medicis, vt Galenus ait, Tympanias dicitur: quoniam summus venter percussus talem sonitum edit, qualem tympana. Non temerè autem est, quod Hippocrates scribat, ἰδρύεσθαι, hoc est, firmatur: volens indicare, morbum hunc nullis remedijs curari posse.

H

Quod

Quod nec mirum, si etenim quæ præcesserunt, à nullo solui potuerint medicamento: multò magis qui succedit Tympanias, incurabilis, ac nulli medicamento cedens, existet.

De Hydrocœle.

CAPVT XXXIX.

HYDROCOELE aliàs vniuersum scrotum, modò vnam eius partem, sinistram videlicet aut dextram occupat. Impletur totum scrotum hydrope vel etiam cachexia laborantibus. Quæ verò vnam tantum partem afficit, aliam occasionem habet, nec hydropicos comitatur, sed omninò aliter affectos. Non colligitur quoque humor in scroto, sed in membrana erythoide testem continente. superuenit quandoque ex causa aliqua externa & manifesta, vt à casu aut percussione: crebrò verò etiam ex latente & non manifesta. Quæ autem ab externa causa accessit, aut dextrum aut sinistrum testem indifferenter affligit, & in tumore sanguis sæpenuerò concretus ac corruptus
conti-

MEDICINAL. OBSERVAT. 99

continetur. A latente verò ac non manifesta causa originem ducens, nunquam alium quàm sinistrum testem occupasse diligenter nobis inquirentibus observatum. In hac humor influit tenuis, & urinae consistentia similis, erythroiden distendens membranam: qui subinde tam copiosus in hanc fertur, ut tumor quandoq; ad humani capitis magnitudinem perueniat. Testis autem substantia ab acrimonia humoris successu temporis, non tamen mox, corrumpitur. Veteres, inter quos apud Aëtium Leonidas, Hydrocoelen tumorem esse laxum, & citra dolorem, tradunt: & talem quidem sæpissimè contingit reperiri: secus tamen in Anglo quodam euenit. Inciderat hic in grauissimum sinistri testis cum tensione dolorem: qui nullis cataplasmatibus, fomētis, emplastris, multò minus inunctionibus, placari aut leniri potuit. Vnicum videbatur remedium sectio & testis ablatio. Antuerpiæ illo tempore multi erant celebres & magni nominis Medici: pleriq; horum curationem tentarunt. cum

H 2

autem

autem sese nihil proficere experirentur, in eandem nobiscum sententiam deuenere, in sola sectione vnicam & solam spem reponentes; interim tamen nemine de hydrocœle opinionē habente, sed omninò alium circa testem affectum consistere suspicante. Sectus igitur tandem est æger, & sinister testis ademptus. In ipsa autem sectione demum cognitum hydrocœlen fuisse affectum, copiosa in secantibus faciē aqua exiliente. Testis integer & haudquaquam corruptus extitit (nuper enim natus erat dolor) quem cum etiamnum calentem Chirurgus medium diuideret, ex ipsius centro semen erupit. quod annotatione dignū. Curatus ac sanatus à vulnere, paulò post de lumborum dolore ac grauitate conquerebatur: apparebant in lotio arenulæ quædam: de latente aliquo in renibus calculo suspicio erat. In pube deinde circa cicatricem dolor cum tumore successit: accedentibus verò & alijs symptomatis, mors tandem subsequuta est. Scarificato autem circa pubem ac cicatricem loco, aquosus effluxit

effluxit humor; & quidem copiosus. ren verò sinister durus admodū erat, ac iusta quantitate maior, & substantia interiore haud parenchymatis colorem teferens, sed candidior, concreto ac indurato puri (quod subindē in affectibus varias formas accipit) similis. Hinc apparet, & abundē manifestum fit, quamobrem hydrocoeles siue aquosus ramex, haud ab externa, sed à latente causa procedens, non nisi in sinistram membranam incidat, atque huius testem affligat. Nam huius partis seminalis vena, non ex caua, veluti dextra, oritur, sed ab emulgente sinistri renis procedit ac originem sumit. Rene verò hoc malè affecto, nec officio suo probè fungente, urinæ pars, quam emulgens hæc ad se pertraxit, cum ad vesicam per malè affectum renum non potest descendere, per seminalem in erythroiden delabitur, hydrocoelen eo modo ingenerans. Sublato autem teste vnà cum sua membrana, non amplius illic decumbere humor potest. Quod si aliquis eò postea descendat, hunc in pube hæerere

H s necessum

necessum est; veluti Anglo contigit, cui paulò ante mortem, humor qui defluerat, hoc loco substiterat, tumoremque cum dolore, vt diximus, excitauerat.

De Scroti in hydrocœle periculosa sectione.

C A P V T X X X X.

IN generoso quodam viro, quàm omnis periculi plena sit scroti & erythroidis membranæ in hydrocœle per scalpellum apertio, teste non sublato, compertum est. Ab aliquot annis sinistra parte hydrocœle huic molesta fuerat: frustra cataplasmatibus, ac alijs remedijs crebrò vsus. tandem temerarij Chirurgi consilio acquiescens, aperiri sibi scalpello tumorem permisit. Effluxit citò omnis humor: tumor quoque subsedit; sed cum testis ipse omninò esset corruptus, vicinas partes facilè infecit. Subsequuta mox scroti vniuersi, ac etiam penis cum tumore & ingenti dolore gangræna. Delirium cum vehementi

hementi feбри propter doloris magnitudinem superuenit; ac non ita multò post mors accessit. Ren huius sinister corruptus fuit, & seminalis in erythroiden descendens, valdè ampla & multum patens.

De Gonorrhœa venerea.

CAPVT XXXI.

MVLTVM interest inter veram Gonorrhœan, id est, seminis profluuium, & alteram improprie dictam Gonorrhœan, quæ ex concubitu cum lue venerea infectis contrahitur. Diuersæ sunt causæ: differentia symptomata: curandi ratio dissimilis. Sed de ea quæ propriè dicitur, nihil hic adferendum: de altera verò quædam scribenda: Quæ est purulenti, corrupti, ac foetidi humoris per penem defluxus, quæ interni meatus exulceratio concomitatur. Carunculæ etiam quædam circa vlcera labia quandoque suboriuntur, quæ liberum urinae transitum subinde remorantur. malum si diutius constiterit, vltius serpit, vesicam, vteras, & tandem ip-

H 4

fos

fos etiam renes inficit. Generosus vir ex familia Francisci & Henrici Franciæ Regum, cum decem & octo annis huiusmodi profluvio laborasset, incrementum indies malo, atque unâ symptomatum sæuitia: nec ullum ex medicamentorū præscriptorum usu fructum consequeretur, ad fontem proficiscitur, haud procul Leodio, qui creditur esse, quem Plinius natur. hist. lib. XXXI. cap. XI. in Tongris esse scribit. Hoc ubi aliquot diebus usus esset, dolores valdè remissi sunt, ita ut suavius illic, quàm alibi multis annis, vixerit. Fontis siquidem huius ea propria ac singularis est facultas, ut vesicæ renumque dolores sopiat ac leniat: morbos tamen harum partium rarò persanct: ventriculum debilem idem roborat: ciborum languentem appetentiam excitat: hydropicis, præsertim Leucophlegmatia laborantibus, subinde sanitatem reuocat. Possemus nonnullos adferre grauißimis ex vesicæ aut renum calculi doloribus miserè afflictos, qui interea dum hunc biberent à doloribus liberi visi fuerint; non

non tamen idcirco sanitati restituti. Prætermiffa fiquidem huius porione, recurrentibus etiam acerbius quandoque doloribus, peius habuerunt. Veluti huic generoso contigit viro, qui interea dum aquam fontis biberet, melius habere videbatur, sed illinc reuerfus, mox omnino peius. Ita vt Mechliniæ subsistere cum symptomatum vehementia coëgerit: vbi ingrauescentibus omnibus doloribus, viribusque deficientibus, vitam cum morte commutauit. Dissecto ac aperto huius corpore, repert⁹ est ren vterque maior, quam secundum naturā, durus, concreti ac indurati puris colorem ac similitudinem referens: vteræ ambæ interius exulceratæ: vesica planè rigida, nec extendi nec contrahi potuit. Huius vna membrana ab altera diuulsa, copioso intermedio pure. In exteriori tubercula quædam liuida apparebant: interior multis foraminib⁹ pertusa. Colis siue penis meatus in totum exulceratus, & sanguine concreto plenus. Candelis frequenter vsus fuerat ex candida cera, quæ sæpi-

H 5 us

us impositæ ac exemptę, irritatis vlceribus, profusi sanguinis causa fuere. Talis igitur generosi huius viri constitutio fuit, quem tot annis, tantis doloribus superesse potuisse, non citra admirationem fuit.

De Vrinae profluuiio.

C A P V T XXXII.

HONESTVS quidam ciuis vrinae detinebatur profluuiio: subinde vno die amplius quam urnam XL. librarum reddebat. Bibebat non minus: vt qui propter assiduam vrinae profusionem, assidua quoque siti premeretur. Cum autem huic nulla prodesse remedia, & vix vlla sibi adhiberi pateretur, paucis diebus deficiens, è vita commigravit.

Alius quidam mercator vrinã quoque admodum frequentem reddebat, sed minus nec adeò copiosam, diuq; hoc malo laborauerat. Albida autem vrina erat, non transparens, & paulò quàm serum lactis tenuior: in qua quidem grumi subinde permixti ferebantur. Superueniente vno tempore

re

re febris, urinae accessit incontinentia: sic ut & dormienti proflueret. Posteaquam autem sanguinis missione, & enematum usu, paucisque alijs remedijs febris cessasset, desijt ignoranti in somno effluere; sed tamen frequens, ut antea, & mediocriter multa: & qualis prius, talis & in febris & postea perstitit. Sitis verò & hunc premebat propter urinae copiam, sed multò quàm alium minus. Morbus autem pertinax nullis remedijs cedebat, interim ut non vehemens, ita neque negocijs magno erat impedimento. Usus fuerat aliquot annis æstatis tempore aqua fontis Leodiensis: sed nec ex hoc fructum retulit, citius ab eo malum auctum: nam aqua hæc diuretica, & urinas vehementer mouet.

SCHOLION.

MORBVM hunc Diabeten fuisse apparet; præsertim cuius vehementius fuit malum: Nec tamen mercatoris affectus aliò referendus videtur. Comparat hunc Galenus Leuitati intestinorum: quemadmodum enim per hanc cibus assumptus citò deijcitur: ita & in Diabete potus velocissimè

cissimè per vias vrinarias descendit. Proprius autem renum est affectus, qui ex retentivis facultatis debilitate oritur, accedente attractivis robore unde & sitis necessariò consequitur. Potus autem qui assumitur, non talis omninò redditur, qualis assumptus est. Nam in iocinore mutationem nonnullam accipit, licet exiguo hæreat tempore: in renibus verò non permutatur. Idcirco & crudæ apparent vrinæ.

De Calculo in vesica spontè rupto.

CAPVT XLIII.



IRO annos nato (plus minus) XXX. si quando recenter coctam, aut nondum plenè defecatam biberet ceruissiam: aut etiam paulò acidiorē: vel etiam vinū mustum, vrinæ stillicidium mox molestū erat. Calculi in vesica nulla alia signa aderant. Quodam tempore cum liberaliùs bibisset, & quidem Rhenanum vinum, magno cum dolore sanguinem mingere cœpit: atque simul exigua quædam calculi fragmenta excernere: quæ acutissimos angulos habentia,

tia, particulis illis minutis, à filicibus dum franguntur ac rumpuntur dissili-entibus, erant similia. Intumuit mox præ doloris magnitudine penis ac totum scrotum. Tertio autem die in dextro inguine prope penem, gangræna nata apparuit: qua scalpello aperta, copiosum foetidissimumq; pus effluxit. Sequuta deinde per vulnus vrina, & calculi intra vesicam disrupti ac fracti acuta fragmenta multa: quæ & aliquot post diebus per hunc locum excreta fuere: cathetere interim aliquando in penem immisso, ne quid in eo hæreret, postea molestias allaturū. Nullis fragmentis amplius prodeuntibus, aut cum vrina exeuntibus, procuratum est, ut quàm citissimè vulnus coalesceret. Hoc consolidato, humor quidem crassus, lentus, viscosus, inalbicans, matulis adhærescens, vrinæ permiscebatur: qualis sæpenumero calculo in vesica existente cum vrina excernitur. Cum autem nullis remedijs hic suppressi aut resiccari se pateretur, ad fontem in agro Leodiensi malè habens profectus est. Illic verò
vbi

vbi dies quadraginta vixisset; absque tamen vlllo fructu, à Medicis præsentibus admonitus, alijs quadraginta māsfit. Reuersus sanitatem suam homini concedidit indocto, qui ex vino Cretico, additis radicibus, herbis, ac seminibus omnibus fortibus diureticis, stillatitium ei liquorē præbebat, quo omnia symptomata plurimum exacerbata fuere. Andræas Vesalius id temporis Bruxellæ erat, huius hortatu ac consilio sectionem admisit. Calculi exempti sunt quinque, quorum duo vesicæ adhærentes, difficulter admodum & cum labore auulsi sunt. Tres reliqui vnus fuere in vesica fracti partes: vt his simul iunctis mox manifestum erat. Huius fragmenta fuerant, quæ primo tempore molestiam fecere, & difficilium symptomatū causæ extitere. Erant autem calculi isti quadrangulares, & superficiebus planis, contrà planè quàm vesicæ calculi esse solent; qui vel rotundam vel oualem figuram plurima parte referunt. Causa cur intra vesicam calculus ruptus ac fractus fuerit incognita: nisi fortassè

MEDICINAL. OBSERVAT. III

fortasse vnus cum altero collisio fuerit. Naturæ opera admirari possumus, causas cognoscere sæpè non contingit.

De duodecim in vesica calculis.

CAPVT XLIIII.

IVRISPERITVS quidam supra quinquaginta annos natus, diu molestissimo vrinæ stillicidio, accedentibus plurimis calculi in vesica latentis indicijs, laborauerat, cum ad se sectionis peritum vocat. Hic facto experimento nullum in vesica calculum esse iudicauit. Profectus igitur ad fontem, de quo supra scripsimus, est. Illinc reuersus, non melius, sed peius habuit: vrina albida, foetida, ac purulenta facta. In vesica huius duodecim reperti sunt calculi, quorū qui maior nucis myristicæ nucleum æquabat: ac ren sinister purulentus, ac ferè consumptus, exiguo admodum parenchymatis reliquo.

SCHOLION.

CONTINGIT non rarò, vt calculo in vesica consistente, renes inflammatione

matione corripiantur, ex magnitudine videlicet & diuturnitate doloris, per consensum affecti. Inflammationi succedit abscessus, hinc verò puris mictio. Subinde vnum tantum inflammari accidit: aliquando & alterius inflammatio succedit: vt nonnullis accidisse meminimus.

De Calculo è muliebri pudendo spontè propemodum excidente.

C A P V T XLV.



ESICAE calculus non viros tantum excruciat, sed & mulieribus quandoque grauissimas molestias adfert, continuosque cum vrinæ stillicidio dolores. Sed è virili corpore non, nisi sectione, eximitur: Mulieribus verò quandoque suam mole ac pondere, vesicæ ceruicæ extensa, in vteri meatum descendit; è tenui membrana dependens. Sic contigisse cuidam seni & supra LXXV. annos natæ matronæ, in nonnullorū adhuc memoria restat. Diutinè hæc ex calculo

MEDICINAL. OBSERVAT. 113
calculo vesicæ laborauerat, & maxi-
mos perpeſſa dolores, multas noctes
inſomnes tranſegerat. Cùm autem
nullum horum finem ſperaret, tandē
ancipitem curationem ſubire, & ſe-
ctionis periculo ſeſe exponere maluit,
quàm diutius tantis doloribus ſuper-
eſſe. Nec generi ſui Medici doctiſſimi,
neque aliorum Medicorum tantum
potuerunt in contrarium admonitio-
nes aut rationes, vt à ſententia dimo-
ueretur. Inuentus eſt itaque temerari-
us & audax λιθότομος, qui tantæ ætatis
mulieri, diutinis tam nocturnis quàm
diurnis doloribus exhaustæ ac ferè cō-
fectæ, ſectionem ſe aggreſſurum reci-
peret, & feliciter perfecturum pollice-
retur. Fauet temerario homini fortu-
na. Dum tentat aggreſſi curationem,
magnum ac inſignem calculum, iam
extra veſicam delapſum, offendit, in
tenui membrana pudendo inhæren-
tem. Secat membranam: calculus ex-
cidit. Atque ita citra omne periculum
à calculo matrona hæc liberatur. Et
qui aliàs ſpontè (vt videbatur) caſurus
erat calculus, ope atque auxilio ſecto-
ris

ris prius cadit. Superuixit hæc pluribus deinde annis: sed vrinam continere non potuit. Hoc vnicum ex prioribus doloribus reliquum tantummodo fuit.

De Ischuria propter calculum renibus impactum.

C A P V T XLVI.

ISCHVRIA, id est, vrinæ suppressio accidit, vijs, per quas descendit, obstructis aut impeditis: Rarius tamen vretes aut renes omnino obstrui contingit. Quod si aliquando accidat, lumbos grauitas tenet, partibus circa vesicam liberis. Mulier quædam diuturno lumborum dolore detinebatur: aderant manifesta calculi in renibus hærentis signa. Nullum hæc remedij genus prætermiserat, quod calculi comminutionem aut attritionem polliceretur. Vsa quoque consilio cuiusdam, qui ligni Guaiaci, cum omnis generis fortissimis diureticis, decoctum ei exhibuit. A quo in vrinæ suppressionem incidit,

MEDICINAL. OBSERVAT. 117
dit, absoluto ac firmato in renibus
calculo. In singulis huius renibus sin-
guli reperti sunt calculi, totidem ra-
dios habentes, quot in renum sub-
stantia meatus.

SCHOLION.

QUAM periculosus autem sit intem-
pestivus & nimis frequens diuretico-
rum usus, vel hoc vno exemplo satis manife-
stum. Galenus lib. 1. de simp. medic. facult.
hoc quoque satis innuit, ubi fortia diuretica
ijs comparat, quæ lac coagulant. Veluti
enim hæc serosam lactis partem separant
reliquum indurant: sic quod in sanguine te-
nue ac serosum per vrinas fortia diuretica
expellunt, crassius inspissant, ac, ut in lapi-
dem aut calculos conuertatur, efficiunt.

*De urinae retentione propter
feces in recto intestino
herentes.*

CAPVT XLVII.

RETINETVR quoque vrina
duris fecibus in intestino subsi-
stentibus, comprimitur enim
ab his vesicæ cervix; qua compressa
I 2 vrina

vrina retinetur. Atque idcirco dum exoneratur aluus, vrina tunc demum procedit, cum rectum intestinum liberum est.

Nobilis vir LX. annos compleveret, cum triduo vrinae illi via praecluderetur, nullo lotio succedente; huic balneum, mox enema profuit. Emolitis siquidem atque expurgatis alui excrementis, mox vrina successit. Atque ita paucis horis liberatus, cui vrinae suppressio totum triduum fuerat molestissima.

SCHOLION.

QUANDO vrina supprimitur, & reddi nequit, saepe non expedit diuretica medicamenta propinare. Nam quò plures humores ad vesicam perueniunt, hoc amplius distenditur, & minus exonerare se se potest. Laxiores & patentiores vesicae meatus reddi praestat; quod & fomentis, & insensibus siue balneis efficitur. Quod si verò & feces in intestino recto haereant, has vel maximè educi enemate refert: Quod non solum feces educit, sed & fomenti loco esse potest. Incumbit vesicae colli superior pars recto intestino: proinde & hoc fecibus grauat,

MEDICINAL. OBSERVAT. 117

to, urinae via praecluditur. Si verò feces adeò duræ fuerint, ut enema immitti nequeat, primum balneo utendum. deinde, nonnihil emollitis fecibus, enema adhibendum. veluti huic seni contigit, cuius feces adeò duræ in recto hærebant intestino, ut canaliculus clysteris immitti, priusquam balneo usus esset, nequiverit.

*Destillicidio urinae ex usu
vini Rhenani.*

CAPVT XLVIII.

VIR senex LXXXII. annorum, cum iuuenis esset, ac in vigente florenteque ætate, nec non post, vini potatione delectabatur; sed haud alterius quàm Rhenani: cuius subinde multas amphoras bibere poterat citra ebrietatem, aut cerebri ullam offensam. Hic post sexagesimum ætatis annum temperantius vixit: præteritis verò LXXX. vitæ annis etiam quàm antea parcius multò: & rarò admodum vino Rhenano usus: tandem verò nec bibere citra offensam potuit. Si quando etenim Rhenanum eum bibere contingebat, etiam

I 3 in

in exigua quantitate, nec copiosè, mox illi vrinæ stillicidium valdè molestum fuit. Ab alijs vinis, vt Gallico, Hispanico, aut rubro non offende-
batur. Repertum fuit remedium, sed quod non nisi præsentì malo succurreret. Quotiescunque enim ad Rhenani vini potum reuertebatur, mox iterum vrinæ stillicidium accedebat. Profuit tandem ex ouorum testis in cinerem reductis, & vino Rhenano permixtis lixiuium: quo vel semel assumpto, deinceps vino Rhenano, ad extremum vitæ vsquè diem, innoxie vti potuit. Superuixit autem, postquàm liberatus à stillicidio vrinæ esset, annos duos, aut tres.

S C H O L I O N.

ALBIDVM fuit Rhenanum, quo senex iste in iuuentute ac consistente ætate delectatus fuit & à quo in senectute extrema offende-
batur. Admodum autem tenuium partium istud vinum est, citissimè ad vesicam descendit, & facilè crudos viscidosque humores secum ducit: quales in vijs vrinarijs hærentes stillicidij vrinæ causæ esse potuerunt, quibus deinde per lixiuium inci-
si

MEDICINAL. OBSERVAT. 119
fis & expurgatis, liberior factus est urinae
descensus.

De Mola.

CAPVT XLIX.

MOLA, de qua scribimus, car-
nea quædam & informis mo-
les fuit. talem multo tempore,
& aliquot etiam annis (plus minus
X V.) in vtero olim gestavit honesta
quædam vidua. existimabat vterum
prolapsum, quòd in ostio vteri pro-
pendere aliquid sentiret. Profluebant
statis temporibus menses: & subinde
copiosiores quàm par erat. Tandem
quodam tempore, superuenientibus
nonnullis partus doloribus, rudem
excreuit & informem carneam mo-
lem, pedem ferè longam, latam semi-
pedem, tres quatuorue digitos altam.

Sunt verò & aliæ à recentioribus di-
ctæ Molæ, per quas venter distenditur
non minus quàm grauidis: vna colle-
ctis in vtero flatibus: altera aquosis
humoribus vterum implentibus.

De Mola ex flatu extat apud Valef-
cum exemplum cap. 6. lib. 15. Nobis

I 4

verò

verò & obseruatum huiusmodi inflationem efficaci remedio curatam, prodeuntibus per pudendum muliebri flatibus, veluti per anum excerni solent.

Aquæ in vtero collectionem vidimus in vidua quadam, quæ defuncto marito, cum se grauidam relictam existimaret, IX. mensibus adimpletis, superuenientibus partus doloribus, non nisi aquosos humores enixa est; à quibus liberata, lacte vbera repleta haud aliter, quàm si foetum peperisset.

SCHOLION.

MOLAM, quæ Græcis *μούλη*, induratum esse vteri tumorem, qui modò in ipsius ostiolo, modò in ipso toto consistat, Aëtij & Pauli est sententia. Sed Galenus 14. Method. Molam informem esse carnem, ait, & inutilem in vtero gestatum conceptum; qualis illa viduæ carnea moles, quam aliquot annis in vtero gestauerat. Et talis quidem propriè *μούλη* ac Mola dicitur. Nam quæ ventosæ & Aquosæ cognominantur, à Græcis & veteribus Medicis pro Molis non agnoscuntur. Flatuum in vtero collectionē, *ἰμπνευµατώσιν τῆς μήτρας*, Inflationem vteri; & posteriores Ventositatem matricis nominant. De

De æquosi humoris in vtero collectione meminit Hipp. in lib. de natura muliebri: tum & Aëtius, qui vteri hydropem appellat. Hippocrates aquæ in vteris collectionem gravidis superuenire affirmare videtur: Aëtius verò, tunc humoris copiam in vterum confluere, quando menses suppressi, & imprægnatio impedita. Vtrumque nobis obseruare contigit: memini enim nonnullis vnà cum foetu copiosum aquosum humorem ex vtero processisse, foetu debili ac non vitali: Sed vidua altera, de qua scripsimus, quæ existimabat gravidam se relictam, solum aquosum in vtero gestauit humorem.

De Hæmorrhoidibus.

CAPVT L.

HÆMORRHOIDES venæ quandoque exterius prominent: non rarò interius latent: fundunt sanguinem quædam, aliæ nō: sanguinis excretionem præcedit aliquando dolor: sæpè citra dolorem profluit: dolent verò etiam nullo sanguine succedente. Dolor autem tam magnus esse potest, vt per Sympatheian vesica laborante, vrinæ succedat stillicidium. Viro cuidam cœcæ ac in-

I 5 ternæ

ternæ hæmorrhoides molestæ erant: Medicus enemata adhibuerat, quibus salem & hieran picran admiscuerat: hinc dolor & inflammatio adeò intensa, vt non minus, quam hæmorrhoidum labor, vrinæ quoque molestum esset stillicidium, & cui prius remedium adhibendum foret, in deliberationem caderet. Huic autem mox olei violacei vncia in anum iniecta benè fecit, dolore primùm hæmorrhoidum, deinde & vesicæ leuato. Eodem verò postea aliquotiens imposito, omnis dolor citò conquieuit.

De Aneurismate.

CAPVT LI.



MULTAS corporis partes Aneurisma occupare potest, cum internas, tum externas. Originem habet duplicem: vel enim ex arteria dilatata: aut vulnerata. Aëtius frequenter in gutture fieri refert: sed nobis infra guttur, super os pectoris, pluries enatum apparuit. Tumor hoc loco initio paruus, tempore crescit ac maior

maior fit, mollis, & ad digitorum impressionem cedens: in quo pullus, qualis in arterijs, percipitur. Temerarius chirurgus huiusmodi in pectore tumorem scalpello aperire ausus fuit: hoc aperto, profluente copioso vnà cum spiritu vitali sanguine ager citò defecit. Alijs duobus eiusdem loci Aneurisma introrsum erupit, quos deficientes ac morientes sanguinem minxisse ex relatu cognouimus. Quomodo autem subitò sanguis in pectoris spatium effusus ad vesicam descendere potuerit, non caret magna admiratione.

Tonsori circa spinam in dorso enatum Aneurisma introrsum quoque ruptum est, verum huic exiguum sanguinis ad os peruenit, cum in terram decidens expiraret. In huius thoracis sinistram partem plurimus sanguis effusus fuerat.

In ostio ventriculi tumorem pulsantem quoque deprehendimus, quē cum imperitus quidam circumforaneus curandum suscepisset, multis vomitorijs ac helleborismis tantum effecit,

fecit, vt citò totus ventriculus in tumorem pulsantem conuerteretur. Intra huius ventriculi tunicas copiosissimus sanguis collectus erat: & exterior quidem tunica admodum tenuis interior verò supra modum crassa, plerisque locis rimosa, veluti in partes concisa, apparuit, pure circa rimas consistente.


In mesenterio natum Aneurisma tactu & admota ventri manu cognosci potuit. quod erumpens, subitanæ mortis causa extitit.

Cui imprudenter pro vena, secta arteria fuerat, in brachio Aneurisma superuenit: spontè quidem hoc apertum est, sed fortuna fauit. Nam cum copiosus admodum sanguis profluxisset, in vulneris ostiolum aliquid, siue carnis, siue pinguedinis casu incidens ipsum obstruxit, sanguinisque fluorem repressit. Sed quid postea illi acciderit, ad nos non peruenit. Hinc obseruari potest, minus periculosum Aneurisma esse, cui vulnerata arteria occasionem dedit, quàm quodà dilatata ortum habet.

De

*De pedis tumore, quem Arabes
Elephantiam appellant.*

CAPVT LII.



DOLESCENS quidā circa XX. annos natus in sinistri pedis tumorem cum dolore incidit: quo crassiore facto sura extenuabatur. Medici ac Chirurgi de affectus genere parum conuenerant. Ita XVIII. mensibus lecto affixus decubuerat, cum ad nos curationis causa adduceretur. Remedia huic adhibita talia, qualia Auicenna ac Rhasis Elephantiae ab ipsis dictae adhiberi suadent. atque ita intra paucos menses sanitate pedis restituta, quocunque libuit, ambulare ac ire potuit.

SCHOLION.

AFFECTVM hunc Arabes eorumque sectatores Elephantiam nominant. Differens verò à Græcorum Elephantias multum est. Nam Græcorum Elephantias cutis sceditas ac vitium est, nequaquam pedis tumor: Elephantia Arabum pedum est, cum nonnullo figuræ vitio nimia crassities. Causa non aliquis quatuor humorum, sed

sed ex optimo sanguine in idoneam ad corpus nutriendum substantiam humor iam conuersus, nondum tamen agglutinatus: quo ad pedem copiosius affluente, crassior ac veluti tumidus redditur, superioribus partibus magna ex parte extenuatis; alimento nempe destitutis. Guido de Cauliaco Chirurgus sua ætate celebris, cum & hunc affectum non ex aliquo 4. humorum gigni animaduertisset, additionem carnis esse existimauit: Elephantia, inquit, est additio carnis in pedibus vltra mensuram: addit verò: & in tibijs; quod quidem contingere posse quis negauerit, copioso admodum affluente alimento? Sed nobis partes superiores extenuari obseruatum. Atque hic quidem affectus, si ea ætate superueniat, quando auëtriciis facultatis potentia desinit, curationem recipere potest, si idonea adhibeatur: ad minus, vt non augeatur crassities & tumor intendatur, arte effici potest: veluti in adolescente, de quo scripsimus. In iuuenili corpore vigente adhuc facultate auëtrice, si copiosior huiusmodi alimentarius humor ad pedes deferatur, non crassiores aut tumidos reddit, sed subinde quantitatem iuxta omnem dimensionem, forma haudquaquam vitiata, auget. Puella nondum nata annos XV. pedes maiores habuit, quàm procera vlla mulier, interim

interim optimè formatos, cruribus admodum extenuatis, adeò vt mole pedum grauata, molestum ei fuerit progredi. In prouecta ætate huiusmodi humor ad nutritionem destinatus copiosior quàm par est accedens, articulares & podagricos excitat dolores. Si verò & diutius influat, ordinem ac situm ossium subinde perturbat, compagibus ac vnitate partium dissolutis: Veluti annosæ cuidam feminæ accidisse recordamur. Hæc aliquanto tempore dolore pedis laborauerat; cum verò humores probi assiduè affluerent non desinerent, nec in pedis alimentum conuerti possent, tandem cutis vnitate articulisque dissolutis, ossium tarli ordo ac positus ita perturbatus, vt forma figuraque pedis vix vlla reliqua fuerit. Effluxit autem humor non saniosus, non purulentus, non foetidus, sed glutini & albido oui serè similis, lentus ac viscidus, ad pedis videlicet alimentum destinatus. Crus verò huius supra pedem omninò extenuatum relictum est, veluti, de quo scripsimus, adolescentis. Atque vel ex hoc exemplo satis constat, non vnum ex quatuor humoribus esse Elephantix huius causam, sed humorem probum ad alimentum partis destinatum.

De

De puero sphacelo correpto.

CAPVT LIII.

PVER erat annos natus sex, cum articulos digitorum & manuum & pedum sphacelus occuparet: qui sensim serpens supra genua, & vtrumque cubitum peruenit. vbi autem hæc mortuæ partes decidissent, summam siue extremam narium partem, & aurium alulas, ac lobos, siue fibras inuasit: morte paulò post subsequente. Sic tandem miser puer mutilatis ac amissis membris periit.

FINIS.

ANTONII
BENIVENII FLOREN-
TINI, MEDICI AC PHILO-
SOPHI, DE ABDITIS NON-
nullis ac mirandis morbo-
rum & sanationum
causis liber.

*De morbo, quem vulgò Gal-
licum vocant.*

CAPVT I.



NOVVM morbi
genus, anno Salu-
tis nonagesimo se-
xto supra mille
quadringentos à
Christiana salute,
non solum Itali-
am, sed ferè totam Europam irrepsit.
Hoc ab Hispania incipiens, per Itali-
am ipsam primùm, tùm Galliam, cæ-
terasque Europæ prouincias latè dif-
fusum, mortales quamplurimos oc-
cupauit.

cupauit. Incipiebant enim pustulæ genere diuersæ in genitalibus membris, licet interdum, sed rarenter, in capite: & inde per totum corpus diffundebantur. Alijs quidem planæ minimeque extantes, sed scabræ tamen in superficie, & colore subalbidæ: à quibus squamæ resolvebantur, & caro sub his corrosa apparebat. Alijs varis similes, figura rotundæ: & ab his item squamis leuioribus resolutis prominebat caro rubicundior, ex qua virulentia foetens & grauioris odoris profluebat. Nonnulli verò latioribus corripiebantur pustulis, sed quæ supra cutē non intumescerent, crassiores squamas habentes: ex quibus etiam virulentia copiosior emanabat, & amotis squamis caro apparebat obscurior ac subliuens, quæ inulcerata roderetur. Quartum genus erat, quod subalbidis squamis amotis cicatrici simile remaneret, à quo profluens interdum sanguis, difficultatem sanationis ostenderet, & similitudine siccam scabiem repræsentaret, cæteris omninò deterius: & licet minus eroderet, serpendo
tamen

MEDICINAL. OBSERVAT. 131

tamen varijs & intentatis infidebat locis. Hoc autem morbi genus plebem plurimum seruosque afficiebat, ex nobilioribus verò paucos. Subsequebantur huiusmodi pustulas, licet etiam interdum præcederent, articulorum dolores, qui non minore cruciatu torquerent, ac senescentibus iā pustulis plurimū inualescerent. Quòd si medicamentis compingentibus intrinsecum quis conaretur extrudere humorem, continuò exortæ pustulæ in gula & ore ægrotos malè habebant. Ex quo etiam nonnulli ob incuriam medentis, mortem obibant: aut, quod proximum est, erosis faucibus difficilimè sanabantur. Has autem nos Impetiginis esse genera, quas Græci λεχῖνες vocant, iudicauimus. Quem etiam morbum Plinius, quòd ex accepto osculo mentum venaretur, Mentagram appellauit. Huius verò & Celsus quatuor species esse dixit, rubricam scilicet & nigram: tum & quæ serpendo procedit, & quæ item bullulas variis similes habet. Materiam autem harū pustularum diuersam quidem, sicuti

K 2

&

& diuersa sunt genera, iudicamus. Interdum enim acuta humiditas sanguini mixta & erodens dominatur. Interdum crassior, tenuiore parte absumpta, & ad atram bilem versa. Nonnunquam etiam atra ipsa insurgit bilis, quæ ab acutiore humiditate non absoluitur, & cutem perforans carnem erodit. Pari quoque modo exusti humores ad naturam atræ bilis inclinantes efficiunt: qui si densioribus occurrant membris, quæ perforare nequeant, figuntur ibidem, & dolores excitant vehementiores donec resoluantur, aut tandem erumpant in pustulas: quæ etsi alioquin foedæ, & ad sanandum difficiles, sine vlllo tamen dolore, vt atræ bilis natura est, infectos premunt. Ex quo fit, vt qui eiusmodi afficiuntur pustulis, imperitis sese Medicis nonnunquam curandos tradant. Quibus ægritudinis huius causas penitus ignorantibus, dum inter mali initia compingentibus vnctionibus illis mederi festinant, sæpe eos aut in mortem, aut saltem in deteriorem, vel etiam penitus in insanabilem compellant

lant morbum. Nam cum huic malo causæ infint difficiliore, & quæ vix remoueri queant, vt non sine magno labore, ita nec sine diuturnioris temporis spatio sanescere potest. Quare qui ex his festinam sanitatem quærunt, mortem plurimum, vt iam dictum est, aut saltem diuturniorem morbum nanciscuntur. Si quis igitur huiusmodi malo vexatus, sibi ipsi citra omne discrimen consulere, ac certam salutem acquirere cupit, his vtatur medicamentis atque consilijs, quæ à nobis infrà ponentur. Afferunt peritissimi Medici, si huiusmodi morbus toto diffundatur corpore, iisdem medicamentis curationem suscipere, quibus & Lepra curatur. Quare cum iudicaueris sanguinem his misceri humoribus, deducique eos cum sanguine posse, optimum præsidium erit, sanguinem ilico de vena media, quam Nigram Medici vocant, mittere. Contrà verò si ineptos, & qui cum sanguine minimè fluere possint existimaueris, æquare eos ac deducere medicamento debes. Non inutile tamen fue-

rit hirudinem, quam sanguisugam vocant, aut cucurbitulas ea parte affigere, qua æger magis vrgetur. Præsidij indigentiam indicant, habitus corporis, rubor in loco, tumor venarum, & si pustulæ sanguinolentæ sunt. Postea verò ad ea medicamenta confugiendum, quæ materiæ partem deponant: quod certè felicius fiet, si aluum duxeris eo medicamento, quod habet Myrobalanorum omnium partes duas, Radicis barbari partem vnam: Agarici, Polypodij, singulorum partem mediam: succi fumi terræ, senæ, & vuæ passæ, singulorum partem quartam. Quæ tudicula attrita bulliant in aquæ libris sex, donec quarta defecerit pars. Tum decolata comprimantur, & additis mellis libra, scammonæ uncio la, & filiquæ Aegyptiacæ uncijis duabus, paruo igne in vnam redigantur compositionem. De qua deuoret æger uncio lam mediam. Demum aggre di debemus potiones materiam æquantes, vt ex fumo terræ, endiuia, aceto, saccaro, limonum citrique acido succo. Aut eam, quæ habet Myrobalanos

balanos omnes, fimum terræ, endiui-
 am, buglossam, melissam, borraginē,
 violas, absinthium, thamerindum,
 epithymum, & rosam. Quibus additis
 succo fumi terræ atque saccaro, bulli-
 ant, & ad potionis formam redigan-
 tur. Materia tandem æquata deduca-
 tur aliis medicamento potentiore,
 quod deponat humorem quem ex-
 cernere volueris: sicuti sena, polypo-
 dio, albo veratro, lapide stellato, scam-
 moneo, compositione filij Amech,
 Inda, & alijs multis quæ doctores ex-
 tollunt: dummodò non obliuiscaris
 nutrire ea in lactis aqua: quæ siue in
 potione, siue buccella accipies, opti-
 mum & excellens auxilium inuenies.
 Verùm quia humor non vna tantum
 vacuatione secernitur, iteranda hæc
 sæpius erunt. Vltimo loco ea sunt ag-
 gredienda præsidia, quæ extrinsecus
 adiuncta etiam conferre possint: vt in
 crassiore & glutinosa materia, quæ in-
 cidant: in tenuiore, quæ resoluant: in
 media, quæ vtramque operationem
 concilient. Mollire interdum & dolo-
 res remittere opportunis præsidijs

conuenit. Hoc autem malum tollit acida pars citri, gummi arabicum, gummi nucis plurimę, storax liquens, & sinapis, si aceto liniantur. Salua quoque hominis ieiuni, præsertim quæ dentibus inhærescit, præsentaneum remedium est. Aqua sulphurea, aqua salita, & maris spuma, succus psyllij, oleum ex frumento & ex violis, storax, & pix, armoniacus, helleborum, gummi rutæ, litargyrium, tutia, resina pini, argenti spuma, & cerussa. Serapion autem nitri partes duodecim, sulphuris partes XIII. excipiebat resina copiosa, eaque utebatur. Alij minio sinopico ceram & oleum ex rosa addunt, & eo inungunt. Nonnulli verò resinam terebinthinam, argentum viuum, masticem, litargyrium, cerussam, thymiamaque excipiunt myrtino oleo atque larido: & eo inungentes sudare ægros cogunt. Nec postremò defunt, qui fateantur se ex solo potu medicamenti, quod habet laccam lotam, aloën, ac myrti coctionem, ex eiusmodi ægritudine sanos euasisse.

ANNO-

L VEM veneream hunc morbum nunc
rectius recentiores appellant, citra
alicuius gentis invidiam. Tametsi autem
ab eo bello quod Carolus Gallorum Rex
cum Alfonso Rege ad Neapolim gessit,
anno 1493. & 1494. plurimum saevierit,
& tunc primum natus videatur: nonnulla ta-
men, quæ huius symptomata habentur, mul-
tò antè Medicis cognita extitere. Nam & ab
immundis ac sordidis mulieribus iam olim
nonnullos vitia quædam contraxisse testan-
tur Guilhelmus Salicetus, Bernardus Gor-
donius, & Valescus Tharantanus. quorum
hic vixit anno 1418. Salicetus verò claruit
circa annum 1270. Bernardus Gordonius
medio tempore: omnes autem ante morbi
Gallici aut Luis venereæ nomen orbi co-
gnitum.

Vermis vomitu proiectus.

CAPVT II.

I OANNES quidam faber li-
gnarius, annum agens qua-
dragesimum, cum à cordis
dolore ferè perpetuò duobus iam an-
nis grauter vrgeretur, ac propterea
quòd eo sæpius in mortis discrimen

K 5

addu-

adductus fuerat, peritissimos quosque
nostri seculi Medicos, sed frustra, con-
suluisset: tandem ad nos venit oratum,
ut si quo modo possem, tanto malo
succurrerem. Mouit me, fateor, cum res
ipsa, quæ satis per se miranda videbatur:
tum vel maximè viri lachrymæ, ac ni-
mium miserabilis obsecratio. Cœpi
itaque mecum cogitare, an id fortè ex
malo habitu vètriculi, seu cordis, siue
ille calidus frigidusue esset, an ficcus,
simplex aut mixtus. Sed horum nullus
certis indicijs ostendebatur. Cordis e-
nim natura nobilis præstansque tanto
tempore huiuscemodi iniuriã nõ to-
lerasset: Cum nullum ægritudinis ge-
nus imprimi in corde possit, quin ho-
minem ad festinam mortem deducat.
Opinanti igitur mihi malignã aliquã
& noxiam materiam in ventriculo de-
tineri: quæ, quòd vicinus sit locus cor-
di, ad eius ceruicem ascendens homi-
nem affligeret, visum est eam quoquo
modo propellere. Quare medicamen-
to vomitionem fieri iubeo. Eo etsi
corrupta ac putrens materia expelli-
tur, non tamen dolor remittitur.

Consu-

Consulo igitur vt iterum vomitum
 experiatur:quem nihilosecius vna in-
 termissa diecula validiorem exhibeo.
 Expulsaque eo est crassior pituita, &
 cum ea vermis longitudinis digitorū
 quatuor satis plenior, capite rubro,
 læui, rotundoque, quod pisi magnitu-
 dinem non excederet: cætero corpore
 lanugine quadam contecto, cauda
 furcata ad similitudinem nouæ Lune:
 pedibus nixus quatuor, duobus in de-
 xteriorem, totidem in sinisteriorem
 partem coaptatis. Admiratus vermis
 formam medicis eruditioribus osten-
 do. Nullum inuenio qui monstrum
 simile se vidisse vnquam fateretur. Ad-
 erat tamen senior quidam, sed medicæ
 artis imperitus: qui testatus est similē
 se vidisse vermem vomitu quoque
 propulsum ab Alexandro quodam
 cœnobita: qui statim, vt ille aiebat,
 proiecto eo, mortuus est. Vocitabat
 autem hoc monstrum cordis vermē.
 At contrà æger ille noster vt primū
 vermem ipsum euomit, ad pristinā
 reuersus est sanitatem.

ANNO-

VERMES vomitione reijci haud insolens est, nobisque non rarò visum. Testatur & idem Amatus Lusitanus Curatione quinta, sexta, ac decima Centuriæ primæ. Generari autem posse in ventriculo, vt Amatus existimat, difficile fuerit affirmare: verisimilius est ex Intestinis ad ventriculum peruenire.

*Lapides in tunica hepatis
repti.*

CAPVT III.

MVLIER quædam nobilis, dolore exorto circa iecinoris partes, cum diu multumque angeretur, ac propterea quamplurimos Medicos consulisset, effugere tamen id malum nullo præsidio poterat. Quare opem nostram vnà cum alijs experiri placuit. Conuenimus igitur plures Medici, & quænam essent huius morbi abditæ causæ hinc inde plurimo sermone discussimus. Verū vt contingere in rebus dubijs plerumque solet, sententia non conuenimus. Cum pars iecinoris abscessum,
pars

pars malum habitum indicasset: nos verò vitium in membrana contegente inesse credebamus. At illa cùm inualefcente morbo paucis pòst diebus, vt nos etiam ex certis indicijs pari cōsensu prædixeramus, è vita migrasset, mortuæ corpus incidendum curaui-
mus. Et inuentæ sunt in iecinoris mēbranulæ parte decliuore congesti lapilli, figura & colore diuersi. Alij enim rotundi, alij angulares, quadrati alij, prout positura & casus effecerat, maculis etiam rubeis, cæruleis, albisque distincti. Hi sua grauitate ex tunica sacculum longitudine palmi, latitudine verò duorum digitorum effecerāt. Hanc autem nos mortis causam arbitrati, disputare de obscuris vanum & inutile iudicauimus.

ANNOTATIO.

IN vesica fellis subinde lapides reperiri contingit, vt infrà cap. XCIIII. dictum: verum laxiorem reddi membranam Iocinoris, atque in ea calculos dependere ex rarissimis est. Iecur autem vel vnā aliquā eius partem indurari frequentius accidit. Memini ego nonnullorum, qui ab Ictero in
Asciten

Afciten delapfierant, Iccinora vidiffe, adeò dura & lapillis vndequaque plena, vt nouacula perfcindi non potuerint. Simile narrat & Andreas Vefalius in Epiftola de China ad Ioachimum Roelants de quodam Belloarmato Senenfi, cuius Iecur prorfus candicans fuperficie conftabat non leui, fed admodum inæquali, & læuibus tuberculis exasperata: anterior verò eius pars, & vniuerfa finiftra ad modum lapidis indurata.

Fluxus sanguinis ex poro.

C A P V T I I I I.

NO VI hominem robustum admodum, qui XXXVI. agens annum, sæpè mecum conquettus eit de certo fanguinis fluxu, quo fingulo quoque mense grauiter afflittaretur. Interroganti mihi qua parte corporis flueret, id fe nescire refpondit. Admiratus hominis verbum: detege, inquam, locum vnde fluat. Depofito pallio ilea dextra oflentat, vbi fubiacet iecoris pars ima. Diligenter locum oculis lufro, fi foramen aut cicatrix in parte fit: omnia æquabiliter pofita, lenem & mollem carnem, nullam

lam asperitudinem cicatricisvè notā
 inspicio. Ab homine decipi suspicor.
 Quod ille aduertens, paucis, inquit,
 diebus hunc tibi scrupulum demam.
 Instat enim tempus quo sanguis fue-
 re consuevit. Reuersus perendie vno
 superposito digito locum fluxus con-
 tegebat: quo amoto, non secus ema-
 nauit sanguis, ac si ex incisa vena pro-
 flueret. Nec prius fluor ille cessabat,
 quàm sanguinis libra emitteretur.
 Quo euacuato, nullus discernere po-
 terat, vnde euacuatio facta esset. Existi-
 mabam venulam foraminibus cutis
 sua ceruice inhærescere, indeque stato
 tempore sanguinem euacuari. Curaui
 itaque hominem sola sanguinis mis-
 sione ex vena iecoris singulo quoque
 mense. Curiosoque victu iniuncto,
 protracta cura est ad sextum vsq; men-
 sem, & tandem conualuit.

ANNOTATIO.

SIMILE exemplum & inter rara Ia-
 cobi Hollerij habetur: Nouimus, inquit,
 quendam, cui è regione hepatis vena per in-
 terualla dehiscerebat, quæ sanguinem funde-
 ret. Restitante sanguine vestigium non ap-
 parebat.

De

*De vena umbilici, & ex vulua
prolapsa intestina.*

C A P V T V.

MULIEREM vidimus sexagenariam, cuius intestina ex vena umbilici subito prolapsa sunt, nullo præsidio conferente tertia die vitam finisse. Vidimus & aliam, de cuius vulua pariter disrupta intestina omnia profluxerant, paucis item diebus occubuisse. Insuper & tertiam novimus, cuius intestina, perfracta eorum tunica, à summa umbilici cute tanquam in sacculo dependebant in vuluam. Hæc autem miseram quidem, sed tamen longiorem vitam ducens, vnà cum hoc malo consenuit.

ANNOTATIO.

PROLAPSIS extra locum suum intestinis, subinde grauissima ac molestissima subsequuntur symptomata, nec rarò ipsa mors. Hoc casu procurandum & laborandum est, vt quàm citissimè intestina à fecibus liberentur: alioqui in locum suum nõ aut difficillimè reducenda. Optima ac tutissima

fima sunt enemata, & quidem non vehemen-
tissima, sed benigna ac mitia. Ita sæpenume-
rò fecibus eductis, & ab excrementis intesti-
nis liberatis, facilius in suum locum reponi
possunt. Per os medicamenta purgantia as-
sumere non adeò tutum: excrementa etenim
deorsum propellunt, & in intestina, quæ ex-
cidere, impellunt. Si quid per aluum descen-
dit, id sanè tenue ac liquidum, quod inter
duras feces sibi alicubi viam inuenit: durio-
ra crassioraque hærent. Intestinis autem am-
plius repletis, tumor maior fit, dolores au-
gentur, & reponendorum horum minor spes
affulget: accedunt graues molestiæ, & non
modò bilis aut pituitæ, sed & non rarò fecū
& alui excrementorum vomitus. Cùm enim
nec descendere queant, nec ab intestinis reti-
neri, ad ventriculum regurgitant, & vomi-
tione reiiciuntur. O dura sic morientium
conditio. Exempla, vel eorum qui enema-
tum usu melius habuere: vel his neglectis
contemptisque, aut ab epotis purgantibus
medicamentis miserè perierunt, possent ad-
ferri plurima: Sed quia ijs, qui in quotidiano
artis usu versantur, hæc haud sunt incognita,
omninò duximus prætermittenda.

L *Vmbili-*

Vmbilicus prominens.

CAPVT VI.



OMMVNE omnibus, vmbilicum ad decorem promine-
re. Monstruosum, si promineat
vltrà quàm decens sit. Ioannes Binus
filium habuit octimestrem, cuius vmbilicus digitis quatuor excreuerat ad
penis similitudinem. Coles enim testiculorum tunica iunctus videbatur: à
quo etiam spiritus erumpebat interdum. Hunc cum plures Medici inuississent, & ex his alij intestinum eò erupisse iudicarent, alij omentum, alij humorem, nos carnem in loco increuisse dicebamus. Cui sententiæ cum pater inhæsisset, puerum curare cœpi. Sed quòd autoritate eorum mouebar, qui propter spiritum, quem inde erumpere interdum diximus, intestinum illud esse dicebant, ressecandane mihi esset caro illa, & id ipsum ferrone an igne potius faciendum, plurimum addubitabam. Verùm certa tandem ratione subnixus, vincere carnem decerno: singulisque diebus arctius deligans,

gans, non prius desisto, quàm ea ipsa præmorta penitus exciderit, ac puer subinde integram valetudinem recuperaverit.

Ex ano euacuata urina.

C A P V T VII.




QUIS miretur si audierit quod & nos vidimus, puerum scilicet duodecimum agentem annum, cum urinam septimo iam die non redderet, propterea quòd concretum quid ex pituita & sanguine, urinæ ipsius canaliculos obstruxerat. eam tandem ex ano euacuasse. Præsertim si nouerit & vesicam ipsam ceruicemque eius minimè foraminulentam aut fungosam existere, & intestinum quod penetrari debuit, solidæ ac concretæ esse naturæ, vt decet tunicas omnes quæ nervosæ sunt. Oportuit enim aut incisam vesicam intestinumque, quod citra mortem fieri nequit, aut naturam, cui impossibile nihil est, huiusce modi aperuisse vias: vt inde urinam redderet, puerumque seruaret. Nouimus

mus enim miranda eius opera: nam & purulentum quid etiam ossi subsidens extrinsecus trudit, & hominem certis indicijs moriturum sæpius liberat. Vnde & militem vidimus, cui illatum vulnus in coxam, vesicæ ceruicem inciderit: ac subinde incuria Medici adeò conglutinatum obcalluit, vt penitus iter vrinæ obstruxerit: sed ea nihilosecius carne paulatim crofa, coxa altera extrinsecus erupit. Indeque quoad vir ille vixit, ritè profluens reddita est. Sed Pauli Bonini filium nouimus, qui glande colis clausa natus, paulò infra eam itinere patefacto vrinam reddebat.

Mulier à spiritu malo oppressa.

CAPVT VIII.



CCIDIT his temporibus nouum & admirandum morbi genus: quod etsi viderim curauerimque, scribere tamen vix auserim. Mulier XVI agens annum ab ima ventris parte dolore exorto, conuellerè manibus nitebatur. Cumque in horrendum clamorem erumperet, intumesc-

tumescebat ilicò totus venter, adeò vt
 vterum gestare crederes octimensē:
 & voce exhausta vbi toto cubili hinc
 inde reiectans sese, & plantas pedum
 interdum ceruici connectens resilie-
 bat in pedes, iterum procidens ac resi-
 liens: isthuc ipsum identidem factita-
 bat quoad paulatim ad se reuerſa quo-
 quo modo recrearetur. Interrogata
 quid egisset, penitus ignorabat. Nos
 verò eiusmodi morbi causas disqui-
 rentes, arbitrati sumus hoc malum ex
 vuluæ ascensu & vaporibus malis sur-
 sum elatis, & subinde cor ac cerebrū
 impetentibus prouenire. Quare ido-
 neis medicamentis adhibitis, cum ni-
 hil omninò profecissent, non parum
 mirati sumus. A recta tamen via mini-
 mē desistendum putauimus, donec fe-
 rocior facta ac toruis oculis circum-
 spiciens tandem prorupit in vomitū,
 quo longiores & recuruos clauos,
 æneasque acus vnā cum cera & capil-
 lis in globum mixtis euomit: & no-
 uissimē ientaculi frustum tantæ ma-
 gnitudinis, vt deuorare integrum nul-
 lus potuisset. Cumque id ipsum sæpius

L 3

etiam

etiam vidente me factitasset, teneri cā arbitratus sum spiritu malo, qui dum hæc ageret, spectantium oculos perstringeret. Quare spiritualibus Medicis commendata, manifestioribus de in signis & argumentis rem comprobauit. Nam & nos sæpè eam vaticinantem audiuius: & ea præterea agentem vidimus, quæ omnem vim morbi supergressa, humanum etiam captū excederent.

*Sanatum genu miraculo
evidenti.*

C A P V T IX.

ROBERTVS Saluiatus Bernardi filius, & Diui Dominici fratrum consortio iunctus, dū in monasterio Sancti Marci Florentinæ ciuitatis vitam degeret, geniculi dexterioris abscessu grauiter affligebatur. Quare me familiari Medico accersito, malum ostendit. Intumuerat enim genu, tantumque eleuabatur, vt humani capitis magnitudinem æquaret. Notæ pituitosum & vapore plenum

num ostendebant. Hic chirurgica manu curatus, bis iam sanitatem fuerat consequutus. Reuertebatur tamen id malum priore peius. Quare iudicauimus huiusmodi ægritudinem, vbi iam inueterasset, nullo modo citra vstionem finiri posse. Territus ille iudicio nostro, ac propterea medicæ artis spe deposita, ad diuinum confugit auxilium. Erat eo tempore in eodem monasterio vir simplex & bonus, fide & charitate pollens, Dominicus Piscie oppido ortus, & eiusdem religionis professor: per quem Deus plurima iā signa fecerat. Hunc igitur Robertus ipse conueniens, miserabilibus primum lachrymis & precibus orat, vt sese suis apud Deum orationibus liberet: quod cum ille pro sola humilitate abnueret, instat iterum Robertus: nec prius à lachrymis & importunitate desistit, quàm Dei hominem flectit atque exorat. Celebratis itaque ex more ac peractis missarum solennibus, cum ad Robertum ipsum, qui solus celebranti illi ministrauerat, conuersus fuisset, geniculum detegit:

L 4

&

& signo Crucis super manum impresso: fiat, inquit, tibi secundum fidem tuam. Quibus verbis omnis prorsus intra pauculos dies delituit ægritudo. Quod & nos non solum vidimus, sed & proprijs (vt aiunt) manibus attrectantes, geniculum ipsum detumefactum ac penitus sanescens inuenimus. Et ne quis non omnino virtute diuina factum putet, hic iam septimus est annus ex quo ille sanitatem adeptus, eam seruauit & seruat ope & auxilio illius, qui solus omnia potens, viuit & regnat in secula.

ANNOTATIO.

ALEXANDER Benedictus Historiæ humani corporis libro primo cap. XIII. ex vulnerato genu cornu enatum refert, quod & admiratione haud caret.

Miraculo liberatus.

C A P V T X.



VVENIS quidam Florentinus nomine Gaspar, dum circa præcordia sagitta vulneratus ipiculum educere nititur, relicto mucrone arundinem tantum euellit.

Quem

Quem cum chirurgici, omni licet ingenio, omnique præsidio nixi, auellere minimè potuerint (in intima enim costa adeò infederat, vt reuelli nullo auxilio posset, nisi costa ipsa perfracta, & vulnere ampliore facto) mortem potius quamlibet miserabilem, quàm tale genus curationis subire malebat. Quare tandem in desperationem versus, laqueo suspendere se, aut profluenti Arno, vel alto puteo præcipitem dare cogitabat: quod & fecisset, nisi assistentes amici illum diligentissimè custodissent. Inter quos erat vir quidam Marioctus nomine, fide & probitate pollens: hic hominem iugiter deprecabatur, vt desperatione reiecta, in manus potius Dei, à quo est omnis salus, tam grande malum tradere conaretur. Huius tandem precibus flexus Gaspar totus ad Deum conuertitur, non die, non nocte ab oratione cessans: donec in vaticinium prorumpens, nonnullos interim, qui ad eum visendi gratia accederent, dum adhuc procul essent, paulò post adfuturos prædiceret. Quinetiam & ignotum

L 5

quem-

quemlibet proprio quoque nomine citans, admonebat astantes omnes ut Deum timerent, & de salute sua confiderent. Se enim non modò de ea, deque die & hora qua illam consequi deberet, certiorum factum esse, sed multa præter ea eodem lumine prævidisse aiebat: ut profectiorem suam Romam & mortem, exilium Petri Medicis & fugam, ciuitatis nostræ Florentinæ angustias & calamitates, Italiæ subuersionem, & alia quamplurima, quæ breuitatis causa silentio præterimus: quæque ferè omnia magna ex parte impleta iam videmus. Nam & qua prædixerat die atque hora mucro ipse ex vulnere sponte sua profiliit: quo eieceto etiam vaticinari destitit, & Romam tandem peregrè proficiscens mortuus est.

ANNOTATIO.

REFERT & Alexander Benedictus exempla duo superiore non minus rara aut admirabilia. Vnum de Rustico, qui in dorso vulnus cum telo acceperat, cuius ferrum, quod intus hæserat, biennio post per aluum descendit. Hist. hum. corp. lib. III. cap. IX. al-

MEDICINAL. OBSERVAT. 155
IX. alterum de Græco, qui teli partem ster-
nutatione eiecit, quæ in vulnere à tēpore
accepto XXV. annis latuerat. eiusdem Hist.
lib. llll. cap. XXXIIII.

*Mulier vulua carens vixit
annis decem.*

CAPVT XI.

INGENIOSVS nostri secu-
li Medicus Vgolinus Pisanus
me licet iuniorem aduocan-
dum censuit: vt vnà cum illo mulierē
quandam curaremus, quæ vuluæ per-
nicioso vlcere vexabatur. Huius nos
malitiam omni studio & diligentia
tollere, sed frustrà, conati sumus: nam
corrupta interim vulua, & frustulis
comminuta descendens, non prius
fluere destitit, quàm tota putrescens
decideret: ac sic mulierem ingenti ma-
lo liberauit, quæ licet vulua carens, sa-
na tamen superuixit annos decem.

ANNOTATIO.

VVLVAM siue vterum, in quo foetus
concipitur ac gestatur, corrumpi ac ex-
ulcerari quandoque contingit, ac deinde vi-
cinas partes infici: vesicam quidem vt cap.
XXXIIII.

XXXIIII. exemplorum nostrorum narratum est: nonnunquam verò & rectum intestinum. Atque tunc quidem excrementa alui per pudendum tandem excerni contigit. Quemadmodum mulieri cuidam accidit, quæ posteaquam diutino tempore purulenta foetidaque, manifestissima exulcerati vteri signa, per pudenda excreuisset, postremò & alui excrementa per eundem locum demisit. Ita autem corrumpi vterum, vt nulla vicina parte infecta aut læsa, tota exciderit, non immeritò inter rarissima naturæ miracula refertur. Memini verò & mulieri cuidam vterum prolapsum, totum foras ad humani capitis magnitudinem pependisse, ac sic hanc aliquot annis miserè vixisse.

Aqua inter cutem.

C A P V T XII.



QVA inter cutem cum vehementius vrgeretur puer: tantaque intus contracta esset, vt alium nullam in partem mouere posset, omni auxilio Medicorum destitutus, temerariam sibi libertatem vendicauit. Quare aqua quantum poterat epota, in vltimum sese mortis discri-

discrimen malè sanus præcipitavit. Verum siue id aquæ contractæ impulsu, siue ope naturæ factum sit, soluta est vmbilici vnitas: indeque tanto impetu aqua profluere cœpit, vt supra ventrē cubitos tres ascenderet. Quo sanè vitam finisset, nisi circum assistentes opposita manu aquam fluere non permisissent. Hinc Medico accersito, & aqua paulatim educta, ac curioso victu, & cæteris quæ ad rem facerent iniunctis, breui tempore in pristinam redactus est sanitatem.

Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua inter cutem liberatur.

CAPVT XIII.

RVSTICO, quem aqua inter cutem malè habebat, opẽ nostram expostulanti, sanari iulum, cum iam morbus inueterasset, minimè posse respondi. Instanti tamẽ vt aliquod saltem consilium ei præberemus, subridens inquam, amice si curari desideras, opus est vt non vltra bibas,

bibas, quàm vt vitam sustineas. Discessit: & anno peracto iterum interrogat an ipsum nouerim. Nego me hominem nosse. At ille, tua ope curatus, inquit, ad te reuertor, scire cupiens an adhuc mihi liceat aliquid bibere: cum hætenus per illum nihil biberim. Admiratus interrogo quare, & cuius consilio. Cui ille, inquit, tuo: & rem omnem ab initio narrat. Iussi igitur paulatim vino assuescere: sed meo potius quàm lymphato, & eo ipso austero ac tenuissimo. Discessit, & curiosa potione vsus, ad pristinumque reuersus statum, quam mecum familiaritatem primum contraxit, eam adhuc in hanc vsque diem officiosissimè seruat & colit.

ANNOTATIO.

HIDROPIS, hoc est, aquosi humoris collectionis, duæ sunt species: Hyposarca & Ascites; In Tympanite siquidem flatus colliguntur. In Hyposarca per naturalis caloris debilitatem & impotentiam pituitosior, hoc est, crudior ac frigidior sanguis gignitur, qui per venas in corpus distributus, ipsum tumidum reddit, & albedo pituitæ.

tuitaque emortuo colore pallens apparere efficit. In Ascite verò intra peritonæum præcipuè humor colligitur, venterque distenditur. Hyposarca rusticum laborasse verisimile est, & crudis frigidisque humoribus, per potus abstinentioniam à natura concoctis, & in sanguinem conuersis, tùm & vitam eû sustinuisse, tùm & sanitatem recepisse. Puer autem potuit Ascite laborasse, non tamen ex refrigeratione, sed ex calida nimium & sicca Iocinoris intemperie, qua tàm grauitè quâdoque Iecur afficitur, vt probum sanguinè non conficiat: velut in hydrope quæ acutos morbos subsequitur, teste Galeno lib. VI. de Locis affectis capite primo. Aduersus huiusmodi Hydropem, aquæ potio remedio esse potuit, iocinore videlicet refrigerato & humectato, si modò recens nata fuerit: Nam diuturnæ Hydropes incurabiles habentur, diuturnitate mali iocinore corrupto ac vitiato. Succedit autem non rarò acutis morbis Ascites; & frequenter etiam Ictero. Contingit autem non rarò in hac Ascite, diffusis per vniuersum biliosis humoribus, calorem subinde tantum excitari, vt quacunque corporis parte scalpita leuiterque cute vulnerata, mox calidus, niger, & quasi adustus sanguis effluat. Cæterum Hydropis per aquæ potionem curatæ extat & exemplum lib. 2.

Epist.

Epist. Iohannis Langij, Epist. XII. Vxor, inquit, barbitonforis in Nouoforo, Palatinorum in Noricis oppido, plus sibi ipsi quam marito aut Medicis morigera, cuius venter hydropē in immensum turgebat: hæc aquā de fonte scaturiente magnopere sitiebat. Progressa itaque marito in scio extra urbem ad fontem, in quo cum aquæ scaturigine simul arena ebulliebat, de qua quantum manu caua appræhendere potuerat, ter aut quater deuorauit. Domum læta reuersa, rem omnem nobis recensuit: & intra biduum, per fluxum ventris plurimum pituitæ excreuit: apertis quoque sua sponte in ano mariscis, vnde confertim sanguis niger effluebat, ab Hydrope conualuit.

Struma ingentis magnitudinis & ponderis.

C A P V T XIII.

MVLIEREM Oliuam nomine, struma coxæ innata multos annos miserabiliter vexabat. Ad eam enim iam magnitudinem excreuerat, vt occupante ea coxam ipsam ac crus, ambulare non posset. Quo factum vt iam quinquennio misera

fera in lecto iaceret. Nec ex Medicis
vllus inueniebatur, qui aut ferro aut
alio quouis medicamento tollere tā
ingens malum auderet. Quare omni
spe destituta, me cum iunior adhuc
essem, ad se vocans, operam nostram
deposcit. Lachrymis vrget & preci-
bus, vt quamlibet miserabile, aliquot
tamen ei præsidium afferam: mori se
malle quā in tanta miseria & cala-
mitate vitam ducere. Mouerunt me,
fateor, infelicis mulieris lachrymæ: ac
propterea rem sanè arduam, & quam
nullus qui saperet attentasset, aggres-
sus, strumam ipsam ea potissimum
parte, qua coxa pendebat, vinculo de-
ligo. Et quoniam ressecanda crassitu-
do palmo plenior erat, singulis qui-
busque diebus vinculum ipsum arcti-
us necto, donec pars media ressecare-
tur. Tum candenti ferro quod super-
est scindo: sanguinem supprimo, &
mulierem ferè mortuam resumens
molli cubiculo recreo: ac curiosa dein
observatione, idoneisque medica-
mentis ritè procedens, diuino tandem
auxilio eam in pristinam sanitatem
M redu-

reduco. Tanta autem fuit præcisæ carnis moles, vt pondus sexaginta librarum excederet.

Ex frigidissimo emplastro stomacho admoto mors subsequuta.

CAPVT XV.




NOVI Medicum, qui vel incuria, vel magis, vt arbitror, inscitia, emplastrum frigidissimū stomacho cuiusdam viri, dum illum ventriculi dolor satis mordax vrgeret, superposuit. Putabat enim hoc auxilio dolorem ipsum tolli posse. Verū ille dolore ferè amoto, grauē tamen noxam percipiens, redeunti Medico exponit dolorem quidem remissum, se tamen inspirandi difficultate vexari. Quod inscius Medicus paruifaciens iterum emplastrum admouit: & ne tollatur etiam iubet. At æger, dum assistentes imperata faciunt, paucis interim horis singultu premitur: quo grauius grauiusque hominem afflictaute, inhorrescunt illi membra

MEDICINAL. OBSERVAT. 163
membra: ex quo etiam paucis inter-
ceptis diebus mors subsequuta est.
quam Medici omnes ex incusso sto-
macho frigore prouenisse iudicauc-
runt. Ignorabat enim bonus ille Me-
dicus, nullum princeps aut principi
subseruiens membrum solis frigidis
esse curandum.

*Ex frigidissimo aqua potu
vir interimitur.*

CAPVT XVI.


NTONIVS Parmensis iu-
uenis admodum robustus, cū
sub feruentissimo sole, & ma-
gni æstus tempestate pluribus diebus
in itinere fuisset, ardentissima tandem
febri correptus est: quare cum vehe-
mens cum sitis vrgeret, frigidissima
aqua epota intra paucas horas mor-
tuus est.

*Defectio ex frigidissimi vi-
ni haustu.*

CAPVT XVII.

M 2

BLASL



BLASIUS Senensis familiaris noster & condiscipulus, dum longiusculo tempore sub ardentissimo sole pilæ lusu incaluisse, nec sudore adhuc aut fatigatione remissis, in subterraneum locum, ubi vinaria erat cellula, descendisset, frigidissimi vini calicem haurit: quo epoto statim deficit: indeque ut erat ferè præmortuus ad cubile delatus, ac calidis utcunque fomentis, sed non sine graui noxa tandem, licet ægrè, refocillatus, conualuit. Frigidissima enim potio altius cordi infederat.

ANNOTATIO.

NON modò ex frigidissimæ aquæ potu, aut frigidissimi vini haustu, periculum ijs imminet, qui vehementer supercalfacti sunt: sed & ex frigidi lactis, cui ademptum est butyrum. Nam hoc ipsum in ventriculo malè affecto, etiam facilè concrescit, ac deinde molestias excitat. Vir quidam posteaquam à febre, qua aliquot diebus laborauerat, sibi liber videretur, ac carnes vespericum allijs coctas edisset, postridie magnum haustum, circiter libram videlicet, lactis huiusmodi frigidi ieiunus bibit, sperans aluū
(ut

MEDICINAL. OBSERVAT. 165
(vt aliàs affolet) inde laxiorem futuram. Id
cum non succederet, & molestis torsionibus
ac doloribus circa ventriculum torquere-
tur, digito gutturi imposito vomitionem
excitauit: cum qua duæ lactis concreti ma-
gnæ partes excretæ sunt, pro numero hau-
stuum quos sumpserat. Nam bis se bibisse af-
firmabat: At sic à doloribus circa ventriculū
liber factus, à frigidi huiusmodi lactis po-
tione deinceps abstinuit.


Religiosa quoque quædam cum febrici-
taret, & huiusmodi lac quoque non coctū
bibisset, aliquot diebus circa ventriculum
pondus ac molestum dolorem sensit, qui nō
prius cessauit, quàm difficili vomitione su-
perueniente, & multis lactis concreti durio-
ribus particulis vnà redditis, quibus reiectis
melius habuit. Tantum malorum lac etiam
cui ademptum est butyrum adferre potest,
si in ventriculum incidat calidiorem, vel
aliena qualitate imbutum, vel prauorum
alimentorum reliquijs infectum. Corrum-
pitur verò & in huiusmodi ventriculo
lac purum, ac in grumos coiens, molesta
symptomata non rarò adfert.

Erosum capitis os.

CAPVT XVIII.

M 3

QVI.



VIDAM Monachus ordinis Beati Augustini, ex his quos Canonicos regulares vocant, dum in monasterio Diui Donati, quod vrbi nostræ prominens Scopetum dicunt, vitam ageret, semel mecum conquestus est, affirmans capitis eius os paulatim indies erosum iri: quod miratus, caput detego, manu diligentius contrecto, frontem ferè totam ossis denudatam inuenio: & quod maius est, nullam in cute summa, nullam in carne noxam aduerto: rei causam quæritans, iudico acutissimo humore hoc fieri, qui foraminulenta carne demissus nullam in ea vim faceret. Os verò, quod densius, ac propterea magis obfistens, eroderet, non secus ac fulgur, quod aurum, illæsis interim oculis, nonnunquam liquare solet. At Monachus ille, cum maior iam ossis ipsius pars esset erosa, & nullo proficeret auxilio, paucis annis vitam finiuit.

ANNO.

OSSA capitis erodi frequenter con-
 tingit subijstumoribus, qui Luis ve-
 nereæ symptomata habentur: quorum ple-
 rique ad Atheromatum, alij ad Meliceridū
 naturam accedunt. Qui si diu incurati per-
 manserint, os quod subest corrumpitur, ac
 cariosum redditur. Alexander Benedictus
 non modò corrumpi, sed & exemplum re-
 fert in osse abscessus nati. Hist. huma. corp.
 lib. primo, cap. VI. Ossa corrumpi nouum,
 inquit, non est: sed abscessus innasce mirum
 est, vt nuper vidimus, dum mulierem quan-
 dam Gallico morbo interemptam resecare-
 mus, causam morbi perquirendo, ossa sub
 membranis suis integris tumentia, & ad me-
 dullam vsque suppurata inuenimus, ea dun-
 taxat ratione, quoniam & ipsa nutriuntur,
 abscessibus ob id afficiuntur.

Lapis ex intestinis eiectus.

CAPVT XIX.

MARIOTTVS Palla Phar-
 macopola cum intestinorum
 dolore vexaretur, eiusque
 venter nihil ferè, & id quidem ægrè at-
 que liquatum redderet, pluribusque
 hominem medicamentis aluum du-

M 4 centi-

centibus & clysteribus curassent Medici, & morbus nihilominus inualefceret, ad aliud auxilij genus conuersi, totam ipsius aluum humidis fomentis emolliunt: nec prius ab incepto desistunt, quàm ille sic fatus lapidem instar columbini oui aluo proijcit. Qui quidem lapis intestino subsistens, & iter magna ex parte obstruens, licet ideò deduci non posset, quòd intestino tunicisque eius deligatus esset, vel quod ipsius crassioris intestini aliqua fortè inhæresceret cellula, medicamentorum tamen præsidij, & expultrice adiuuante virtute tandem propulsus est.

ANNOTATIO.

LAPIDIS ex intestinis reiecti meminit Galenus lib. VI. de Locis affectis: Scribunt nonnulli, (inquit) quod à forti excernendi conatu, præcedente dolore vehementi, aliqui lapides callosos deiecerunt, ijs qui in vesica nascuntur haud absimiles. Id quod ego neque vidi, neque alium qui viderit vnquam audiui.

Aerea

Aerea acus perforato stomacho extrinsecus truditur.

CAPVT XX.

DE VOR A V E R A T mulier quædam æneam acum, & nulla inde noxa percepta, integrū annum ita vt erat, sana permansit. Quo peracto cœpit dolor satis acutus mulierem ipsam circa ventriculum vrgere: qui dum eam magis magisque indies affligeret, plures consuluit Medicos: nihil tamen de deuorata acu, quam penitus obliuioni tradiderat, referens. Variæ fuerunt hinc inde sententiæ. Alij enim ab acutiore humore, alijs à vento inter tunicas stomachi recluso, cæteri verò ex malo habitu excitari hoc malum putabant. Cumque omni quo poterat studio & diligentia curata, sanitatem nullo modo consequi posset, medicæ artis spe deposita, tolerare id malum satius duxit, quàm perpetuis medicamentis inaniter vexari. Sicq; annis iam decem, tali vrgente dolore, miseram vitam

M 5 trahe-

trahebat, cū ecce acus illa terebrato
ventriculo, è paruo demissa forami-
ne, profiliit. Nos autem & acum vidi-
mus, & mulierem curauimus: quæ
paucis pōst diebus, vnitae vulneris
facta, in pristinam sanitatem restituta
est.

ANNO TATIO.

H V I C ferè simile est, quod apud Ale-
xandum Benedictum exemplum le-
gitur de acu crinali cum vrina reddita, Hist.
huma. corp. cap. X I I I. lib. V.

Accedit & huic quod Ioannes Langius
Epist. quadragesima lib. 2. refert. In ginæcio,
ait, Ducis Iuliacensis virgo dum sese ador-
naret, perterrita, ingemiscens, acus quinque,
quas in ore mordicus tenebat, deglutiuit, &
per vrinam illæsa easdem reddidit.

Ob incuriam à lepra liberatus.

C A P V T X X I.

M E M I N I Onofrium Te-
daldum pro mortuo à
Medicis derelictum inci-
disse in manus nostras, nō
quidem vt curaretur (id
enim factu impossibile videbatur) sed
vt satis amicorum opinioni & ægro
ipsi

ipſi fieret. Lepra hominem malè habebat: & febricula inſuper vrgebat. Quam, quòd ſolitas animalis partes occupans quaſi habitum inducat, Græci ἐθὶχν vocant. Tantumque in hæſerat ſolidis membris hæc febricula, vt macie & tabe conſumpta carne, nihil niſi pellis & oſſa ſuperſſent. Quin & in nervis crurium tanta item contractio facta erat, vt calces natibus in hæſcences extendi nullo modo poſſent. Indulgens itaq; hominis voluntati, permitto vt omnibus omiſſis legibus ſuo arbitrio viuat. Aduentante igitur vere, cùm iam nux plurima tenuiore cortice veſtiretur, his veſci cœpit. Et cum omne aliud cibi genus faſtidiret, non vna alterauè contentus, etiam ſupra centum ſingulis diebus comedebat, pane licet modico adiecto. Quo factum vt & venter fluere cœperit, & ſtomachus nihil continere: ſicque fruſtula integra deiſci, vt cōcoctio in eis nulla appareret. Hoc itaque incurioſo & licentioſiore victu uſus, ad æſtatem uſque proceſſit. Quo tempore Citrullos, Angurias, Peponesque come-

comedens, nullum præterea cibi genus deuorabat: sed & ea cruda & incocta omnia deiiciebat. Peracta autem iam ferè æstate refici cœpit, & corpus quoquo modo resumptum ad habitum suum reuertitur, quoad sicco & calido morbo humidis & frigidis præfidijs superato, quem ratio & diligentia curare non poterat, incuria & temeritas ad pristinam redigeret sanitatem. Qua biennio feliciter vsus, incurioso postmodum victu, & inutili libertate in eundem recidit morbum. Quo demum absumptus, paucos post annos è vita discessit.

ANNOTATIO.

FVIT quoque & admirabili fortuna ab Elephantiasi miser ille liberatus, cui messorum vinum exhibuerunt, in quo vipera mortua erat. Rati etenim expedire huic mori potius, quàm in illa miseria viuere, remedium contulerunt, à quo sanitatem recepit. de quo Galenus lib. XI. de simp. med. facultatibus.

Vlcus

*Vlcus menti sanatum dentis
euulsione.*

CAPVT XXII.

IVVENIS quidam Angeni-
us nomine, annis iam tribus
menti vlcere vexabatur: qui li-
cet opera complurium Medicorum
vfus fuisset, tantum abfuit, vt non de-
prehendentibus illis morbi causam
sanitatem consequi potuerit, vt penè
omnem recuperandæ valetudinis spè
amiserit: dum scilicet ex his nonnulli,
quòd altum & callosum vlcus vide-
rent, citra vftionem nequaquam tolli
posse affirmarent: Atq; item alij, quia
callosa haberet ora, Chironium vlcus
crederent, & ob id curatu difficillimū
arbitrarentur. Nos verò vt primum
hominem vidimus, & vlcus conspica-
ti sumus, nullis id malum medicamē-
tis vinci posse prædiximus: nisi eo pri-
us eruto dente, ad cuius radicem vl-
cus ipsum ascenderet. Id quod res pla-
nè indicauit: nam dente ipso euulso,
erosam eius radicem cernimus, vnde
scilicet malum illud fomentum ac
pabu-

pabulum capiebat. Quo sublato, non multis post diebus, etiam domesticis medicamentis, sanatum est vlcus.

Attoniti fulmine.

CAPVT XXIII.

ATTONITOS fulmine patrem & filium vidimus, quorum corpus & mens stupore quodam tenebatur, adeo vt dissolutione neruorum, quam Græci ἀποπληξίαν vocant, affici eos crederem. Cumque ad septimum vsque diem ferè absque cibo & potu, quin etiam muti & sine sensu vitam miseram traherent, ex vena demum, quam Medici Nigram vocant, sanguis emittitur, aluus ducitur, corpus plurimis frictionibus distringitur, ac tenuissimis interim cibis vtunque alitur, donec paulatim refectioni, ad pristinam sanitatem reuersi sunt.

Lapis tussicula expulsus.

CAPVT XXIIII.

HENRI.



ENRICVS quidam Alemannus cum laterum doloribus triennio iam vexaretur, & ob id opera & consilio multorum interim Medicorum, sed frustra, usus fuisset, ad nos tandem venit oratum, ut si quo modo possem, laboranti illi opem ferrem. Interrogo igitur hominem, an initium morbi causamvè teneret, vtrum scilicet ex frigore, vel ex ictu aliquo, aut nimio cursu, vel distillatione à capite, siue etiam ex præcedente aliqua alia ægritudine hoc illi contigerit. Respondit se nullam procatarcticam scire causam, sed tantum ex occulto initio paulatim increuisse morbum illum, adeoque auctum, ut eum ad mortem duceret. Anxius igitur & tanti doloris causam minimè deprehendens: nesciebam quò me verterem. Neque enim vlla vel materie, vel mali habitus erant indicia, cū tussicula quædam sicca hominem vrgeret, neque item excrementa aliqua videbantur. Et medicamenta etiam, quibus curatus fuerat, intentiones ferè omnes euacuauerant. Quare auctorum

etorum tandem sententijs nixus, quibus docetur Medicus, cum causæ morbi abditæ sunt, his præfidijs uti, quæ conferre quidem possint, nocere non possint: cœpi primum lenire pectus, mollire guttur & asperam arteriam, donec calculo ad auellanæ magnitudinem de pectore propulso, & sicca illa tussicula, & omnis præterea dolor amarus est.

ANNO TATIO.

CALCVLI in pulmone nati historiam quoque narrauimus, verum non vnius, aut vna vice reiecti, sed multo tempore molesti, ac in asperæ arteriæ ramulis concreti: de quo cap. XXIII. in nostris observationum Medicinalium exemplis.

Magna suræ ossis parte resecta, puella conualuit.

C A P V T XXV.

HIERONYMI Corbinelli filia octauum agens annum elephantico morbo affecta est, ita ut & suræ os vitari cœperit. Summa enim cutis maculas crebrosque tumores habebat, & rubor paulatim in

in atrum eleuari ac cōuerti cōperat, adeò vt facilè iudicares vitium in offe confurgere: præsertim quòd & ingenti dolore afficeretur, & nullum in carne puris signum appareret. Quare soluto ventre, & sanguine cucurbitulis misso, detegere os decernimus: quo detecto, quicquid putrens ac cariosum inerat abscindimus. Sicque magna ossis parte resecata, puella (quod multis impossibile videbatur) tandem ritè curata conualuit.

Sagittacarminibus euulsa.

CAPVT XXVI.

N IHI L tàm facile in corpore quàm sagitta conditur, & eadem sæpius altissimè: quod & in milite vidimus, cui telum dextra parte pectoris illatum, sinistræ scapulæ ossi vsque adeò inhæsit, vt & multi mucronem euellere frustrà conati sint. Nam redire tam longo spatio minimè poterat absque carnis & venarū neruorumque laniatione, propterea quod vtrimque spicula ipsum cingerent: nec etiam contrà carne incisa

N euelli

euelli telum poterat, cum os scapulæ, cui insederat, magnum amplumque obstaret. Quare medicæ artis præsidio destitutus, cum id citra mortis periculum fieri non posset, aduocat ariolum: qui duobus digitis plagæ superpositis, & carminibus nescio quibus insufurratis, telum ex ossæ redire iubet: quo etsi absque ægri corporis noxa, non tamen sine vtriusque animæ dispendio obtemperante, miles ille paucis post diebus ritæ curatus conualuit.

ANNOTATIO.

DE sagittæ dorso impactæ ferro, quod per inferna descendit: & parte teli, quæ post XXV. annos sternutatione reiecta est, vide inter exempla Alexandri Benedicti, de quibus & suprâ Exemplo decimo.

Vlcerate nares.

CAPVT XXVII.

VLCERARI nares intus consueuerunt, eique malo vix succurri potest, cum inueterascit. Mihi nubilis puella nobilisque ostenditur, quæ eiusmodi morbo diu tenebatur:

batur: nec inuentus est Medicus, licet plurimi puellam curandam suscepissent, qui id malum tollere potuisset. Erant enim vlcera circa nares pluribus crustis fœda: è quibus etiam malus consurgebat odor, quod genus Græci ὀζῶναυ appellant. Curam itaq; orante patre, qui vnicè filiam diligebat, aggredior, his auxilijs fretus, quæ ad hunc morbum conducibilia visa sunt. Primò igitur aluum duco, humores æquo, & cucurbitulis scapulis affixis, carneque ferro incisa sanguinem mitto. Tum & frictionibus diuertentibus vsus, nares calida aqua spongia expressa confoueo: deinde cerussam & argenti spumam oleo myrtino & omphacino excipiens, ad crassitudinem mellis reduco, eoque illiniri nares sæpius iubeo: quo auxilio crustis omnibus excisis, cerussa demum, olibano, cadmia, syllicque interiore parte diligenter attritis, & melle addito medicamentum conficio, quo specillum lana obuolutum intingens vlcerebus admouebam: & his repletis linimentum, eo quoque medicamento.

N 2 illitum,

illitum, demittebam in nares. Idque bis die vel ter faciendum curabam: quoad his præfidijs & auxilijs, quod plurimos Medicos diu multumque frustra fatigauerat, paucis etiam mensibus sublato, puellam pristinae reddidimus sanitati.

*Naturalia clausa incisione
curantur.*

C A P V T XXVIII.

NATURALIA feminarum interdum claudi certum est. Id autem aut protinus in vtero matris fit, aut vlceratione illarum partium: dum scilicet ex incuria Medici sanescendo oris inter sese conglutinati iunguntur.

Incidit in manus nostras puella quædam iam matura viro, iam plenis nubilis annis, cui naturalia ipsa clauderentur. Quæ cum ego huiusmodi malum curaturus inspicio, video membrulam quandam, quæ ipsius vulvæ ori opponeretur. Quare duabus lineis inter sese transuersis eam incido: statimq;

timque tanta ac tam ingenti impetu
nigrior materia profluxit, vt grande
lumen, quod tunc minister admoue-
rat, extinxerit. Menses enim præteriti
intus tenebantur: qui & dolores sin-
gulis mensibus excitarent. Incisa ita-
que membranula ipsa, quicquid ex ea
intus superfuit, hamo apprehendo
amputoque. Tum reliquum curæ ex
aliorum vlcerum more prosequutus,
haud multis post diebus puellam ip-
sam sanam, ac coniugio aptam relin-
quo.

ANNOTATIO.

A MATVS Lusitanus curatione xxij.
Centuriæ primæ exemplum refert
cuiusdam, cui glans penis non erat à natiuita-
te perforata: circa verò testes foramen, per
quod vrinam reddebat. Iam & ano clauso
natos quosdam Beniuenius refert. Ita quan-
doque vitia quædam hominibus conascun-
tur, quæ arte subinde corrigi queunt: quan-
doque nequeunt.

*Emortuus fœtus unco ex-
trahitur.*

CAPVT XXIX.

N 3 MATV.

MATVRO partu intus emortuo periclitabatur vxor pistoris mei, quare euocatum me rogat, vt deficienti illi quoquo modo opem ferā. Ego verò reputans huiusmodi curationem inter difficillimas annumerari, & summam prudentiam ac moderationem desiderare (præsertim & quòd foetus transuersus iaceret, vt ne manu quidem intra vuluam iniecta, dirigi in caput aut pedes posset, & quòd imus venter iam frigesceret) de salute eius dubitare coëpi. Verùm hortante me coniuge ac cæteris assistentibus, vt nullum intentatum relinquerem auxilium, vncum vertebri dorsi infantis iniiciens, paulatim extrahere nitor. Sed obstabat oris vuluæ compressio, & ceruix toto corpore replicata augebat extractionis difficultatem. Quare calido oleo naturalia foueo, quo paulatim hiant vulua foetum educo. Mulieremque ferè mortuam molli cubili recreo, & opportunis demum præsidijs curatam pristinae sanitati restituo.

ANNO

ANNOTATIO.

MORTVI in vtero fœtus, ac aliquot annis gestati, deinde per incisionem exempti, historia extat Mathiæ Cornacis quæ, cum duabus alijs haud dissimilibus, sub finem ascripta est.

Natus ano clauso.

CAPVT XXX.

VIDIMVS duos pueros ab vtero matris natos naturalibus clausis: horum alteri caro quædam in ano altius increuerat, aded vt intestini exitus percipi nullo modo posset: quo factum vt paucis diebus vitam finierit. Alteri verò membrana quædam ipsius tantum ani ori opponebatur: sed ea acutiore scalpro præcisa, statim sanatus est puer.

Naturalia erosa & clausa.

CAPVT XXXI.

MVLIEREM etiam vidimus, cui morbus, quem vulgò Gallicum appellant, totam vuluam croserat, & incuria Medici quicquid erosum fuerat, oris inuicem iun-

N 4

ctis

ctis obcalluit. Indeque sola vrina, & ea ex paruo quidem foramine reddebatur. Huic nos (propterea quod callus ipse altior esset, quàm vt citra mortis discrimen incidi posse existimaremus) consulimus, vt incurata potius viuere, quàm tanto se periculo exponere vellet.

Intestino tenuiore clauso vita finitur.

C A P V T XXXII.

STOMACHO longa & pluravitia cum ex alijs membris, tum humoribus sibi innatis accidere consueuerunt. Vnde & nos virum nouimus quinquagenarium, qui ex præterita ægritudine, quam χόληραν Græci vocant, in qua simul & deiectione & vomitus accidunt, intestinaque torquentur, & bilis atra supra infraque erumpit, in perpetuum, & vt experientia docuit, penitus insanabilem inciderat vomitum: vnde & stomachus paucis admodum horis cibum continebat, & alius præterea nihil omnino reddebat, siue leuibus, siue acribus

MEDICINAL. OBSERVAT. 185
acribus medicamentis vrgeretur. Assumebat enim cibos leuiore, & ad concoquendum faciles: quos ubi aliquot horas continuerat, quicquid ex his supererat euomebat. Alebatur autem parte tenuiore, quam venæ a ventriculo attrahebant: sicque miseram quidem, sed tamen longiusculam vitam duxit. Huius verò nos morbi causam indagantes, putauimus eam intestino tenuiore figi: eoque adeò obcalluisse, ut cum incoctus cibus ad iecur totus penetrare non posset, retrocederet, & vomitu tandem expelleretur: id quod mortuo eo, experimento comprobare volentes, corpus incidere tentauimus. Sed nescio qua superstitione negantibus cognatis, voti compotes fieri nequiuimus.

*Ex abscessu Mesenterij
mortuus.*

CAPVT XXXIII.



VLIANVS quidam iuuenis
alioquin optimus, alui tormi-
nibus vexabatur: inque dies

N 5

magis

magis magisque dolor vim capiebat: tantumq; aberat vt huiusmodi doloris abditæ causæ comprehendi possent, vt nunquam vllis præsijs tolli, aut saltem leuari hoc malum potuerit. Omnia enim viscera sana videbantur, iecur, lien, & intestina omnia nullam doloris notam ostendebant. Sed ille, nihilominus magis magisque indies, quàm vt tolerari posset, urgente dolore ipso, tandem è vita discessit. Quare mortui corpore inciso, vt scilicet tanti mali causas dignosceremus, & sanis omnibus, vt putabamus, inuentis visceribus, iubeo intestina amoueri. Quæ dum gladio discindit minister, in abscessum magnum incurrit. Quo præciso, materia multa nigrior foetensque profluxit, encausto sutorio similis. Ex quo manifestam eius mortis causam deprehendimus. Atra enim bilis eò confluens huiusmodi abscessum paulatim effecerat.

ANNOTATIO.

IN mesenterio quandoque inflammatio, ac deinde abscessus gignitur, de quo Ioannes Fernellius doctè ac eleganter scribit, Lib. de

de partium morbis VI. cap VII. & quidem
his verbis: Vera quoque inflammatio in me-
senterium incidit, quum ab exesibus aut ruptis
illius venis sanguis excidit, & in aliqua sede
præter naturam collectus putrescit, tandem-
que suppurans abscessum facit. Ea inflamma-
tio sine manifesto dolore est, solumque gra-
uitatis sensum habet, nisi fortè vehementius
prematur. Febris admodum levis & lenta,
sine siti, sine grauibz symptomatis, nec om-
ninò ægrum prosterbens, nec quotidianas
functiones interpellans. Principiò sanies
quædam rubra, factò deinde abscessu, pus al-
bum defluit ab aluo, & vtrunque modò per-
mistum alui fœcibus, modò seorsum & syn-
cerum, vt quum inflammatio in postrema
intestina deurgit. Tum quippe pus per ve-
nam proximam in recti aut coli intestini ca-
pacitatem influit, syncerumque magna in-
terdum copia redditur nullo sensu doloris:
quod aliquando celebres Medicos magna
admiratione & controuersia torsit. Sed non
aliunde id quam ab affecto mesenterio di-
manare facilè nosci poterat. Neque enim ab
inflammatis intestinis, neque à ventriculo
potest sine vehemēti dolore prodire. Ex ie-
coris verò aut ex lienis inflammatione, fe-
bris vehementior affligit, omniaque symp-
tomata fiunt grauissima: neque tam syncera
fani-

sanies seorsum ob longiorem viæ tractum exit. Renes etiam affecti non illac, sed per vrinas repurgantur. Itaque vnum mesenterium reliquum est in abdominis capacitate, quod sub illis notis inflammatione tentetur. Haftenus Fernellius.

Novimus & nos quandam, cui inflammatio in Mesenterio nata fuit, & initio malè habuit, sed posteaquam inflammatio suppurata, & in abscessum conversa, melius habes, sana sibi visa est. Interim singulis diebus per anum bis terque purulenta admodum foetida, syncera, nullisque excrementis permixta redduntur. Et quidem nunc quartus agitur annus à quo sic sese habet.

Monialis intestinorum dolore mortua.

CAPVT XXXIIII.

IN cœnobio Diui Donati quod in agro Pulverosæ est, religiosa mulier & eius cœnobij professa fuit: quæ intestinorum doloribus multis iam mensibus vrgebatur: & alvus nil nisi ægrè & durum, idque tantum decimo quoque die reddebat. Cumque nullis conferentibus auxilijs diu multumque hoc malo vexata, tandem

tandem naturæ concesserit, mortuæ corpus incidendum curauimus, & inuenta sunt intestina altiore collo cōstricta: adeoque iter angustum relinquebatur, vt deiectiones ægrè transmitti possent. Hoc tamē nos malum, propterea quod aluum prementi nescio quid durum renitebatur, etiam ea viuente præsenferamus.

*Tuberculum supra cordis
arteriam.*

CAP.VT XXXV.

MVLIER Clara nomine & genere, cordis dolore interdum vexabatur, quem Medici à malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabantur. Sed cum pluribus iam annis conubio iuncta non conciperet, & sterilitatis causam quæreret, ac tollere conaretur multis præsidijis, ita demum dolor ille cordis increbescere cepit, vt perpetuus fieret. Ex quo sæpius etiam mulier ipsa deficiens, recreari vix poterat, donec eo iam magis magisque

gisque inualeſcente è medio ſublata eſt. Cæterum mortuæ corpore incifo, & fruſtulum nigrioris carnis in ſiniſtro cordis ventriculo ſupra arteriam, quod meſpilij formam haberet, & vulua à medio infrà verſus imam eius partē iunctis oris obcalluiſſe reperta eſt. Quare vt tuberculum illud mortis, ita hoc ſterilitatis cauſam fuiſſe cognouimus.

ANNO TATIO.

CALLVM quoque cuidam in arteria magna, loco cordi proximo, natum obſeruauimus: multis hic annis cordis palpitationi obnoxius crebrò fuerat: ſex verò ante mortem menſibus in ſiniſtro carpo pulſum tam exiguum habuit, vt nullus frequenter apparuerit, ac ſæpè ſentiri non potuerit. Fuit quoque, palpitante corde, difficile admodum huic potum admittere, ſic vt vix vnciam ſimul bibere potuerit: in pectoris huius ſpatio ſublutei coloris humor collectus quoque fuerat.

Stomachum obcalluiſſe.

CAPVT XXXVI.

ANTO.

ANTONIVS Brunus affinis meus, cum emanducatum cibum breuiore, quàm par erat, temporis spatio contineret, & ita ut erat incoctum reijceret, omnibus medicamentis, quæ stomachi vitijs adhiberi possunt, diligentissimè fatus est. Verùm cum ea nihil omninò proficerent, & corpori ob inopiam alimentii iam absumpto vix pellis & ossa superessent, gradatim tandem ad mortem deductus est. Quare defuncti cadavere publicæ utilitatis gratia inciso, inuentum est hominis ventriculum ita iunctis oris ad imam eius partem obcalluisse, ut cum nihil inde ad inferiora transmittere potuerit, necessariò mors subsecuta est.

Callus in venis mesaraicis.

CAPVT XXXVII.

PETRVS Aldimarius filium habuit, qui cum octauum iam ageret annum, in corruptum incidit appetitum, quo calculos ruderæque comedens in lentam tandem febriculam deuenit. Indeque procedente

dente tempore & ventriculus non cōtinere & venter fluere cœpit. Adeoq; duobus his malis vexatus est puer, vt paucis etiam diebus è vita decesserit. Huius nos cū annuente patre emortuum corpus incidissemus, repertus callus inter venas, quas Mesaraicas appellant, à quo cū venę ipsę adeò obstruerentur omnes, vt ferri inde sanguis vltra non posset, necesse fuit puerum è vita migrare.

Angina incisa.

CAPVT XXXVIII.



ANGINA laborabat Nicolaus Rota, sed nullus tamen rubor, aut tumor, vel intus in gula, vel extrà videbatur. Et ipse nihilominus vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per os statim & nares reijciebat. Quare cū arescente corpore, pallente iam facie, ac vertentibus oculis, spes omnis sublata esset, & Medici, quibus cura demandata fuerat, ægrum amplius non audirent: me licet iuniorem conuocant,

cant, ægrum ostendunt, & quæcunq;
acta fuerant exponunt. At ego cum &
ægrum ipsum ad mortem tendere, &
Medicos quæcunque opportuna fue-
rant præsidia adhibuisse intelligerem,
cœpi ipse mecum cogitare, satiùsne
esset ægrum ipsum Deo & naturæ, vt
cæteri Medici, incuratum dimittere,
an aliquod licet insolitum, vtile tamẽ
auxilium experiri. Verùm adhortan-
tibus his qui ægro assistebant, consiliũ
capiò, & locum altioribus plagis sub
ipsis maxillis, ac etiam supra collum
incido, ex quo cum sanies multa pro-
rumperet, adeò morbus leuatus est, vt
faucibus ipsis spiritum simul & cibum
cipientibus, facilis dein ad bonam va-
letudinem ægro ipsi daretur regressio.

ANNOTATIO.

DE latente Angina in nostrarum ob-
seruationum cap. XVIII. latius scrip-
simus, quæ huc referri possunt.

Soluta umbilici unitas.

CAPVT XXIX.



IRVM nouimus, quem do-
lor in pleniore intestino exor-
tus adeò cruciaret, vt nullo in-
terim

terim spiritu erumpente medium hominem disiectum iri putares: cumq; frustra multa auxilia adhiberentur, & non solum clysteria vt in aluum demittebantur, eadem prorsus eijcerentur, sed & medicamenta quoque tam nihil ex ipsa aluo deponerent, vt iter hinc inde clausum crederes. Tandem cucurbitula vmbilico affixa (solet enim huiusmodi malum tali præsidio nonnunquam minui ac leuari) soluta est vmbilici ipsius vnitas: indeque spiritus crassior erumpēs, & cucurbitulā ipsam disiecit, & hominē omni amoto dolore pristinae sanitati restituit.

ANNOTATIO.

SOLVITVR & vmbilici vnitas Asciticis, quando ventre nequeunt amplius distendi, humor per vmbilicum sibi viam quærit, ac eò erumpere conatur. quod malū Hydromphalon vocari cap. XXVI. nostrorum exemplorum scripsimus. Grauidis in partu laborantibus vmbilici vnitas quandoque etiam soluitur. Erumpens tunc frequenter omentum tumorem in vmbilico magnū excitat, qui nisi fascijs cōstringatur, subinde adeò crescit, vt molestias multas secū ferat.

Eleva-

Elevatio stomachi.

C A P V T XL.



ANNVM XVI. agenti Pe-
tri Guicciardini filio, ita
cervix ventriculi sine ullo
doloris sensu eleuabatur,
vt magnitudinem pomi
cydonei æquaret: nec manifesta causa
ostendebatur, cum omni nocumento
careret. Quare rem admodum diligē-
ter vestigare cœpi, admiratus quēnam
abditæ huius mali causæ esse possent.
Sed cum nullam prorsus præter ven-
tum inuenirem, à quo, ventriculi ca-
pite paulatim eleuato, ita eiusmodi
fieret tumor, vt & ossa etiam talem fi-
tum adepta, nec vltra ad pristinum sta-
tum reuerfa, figuram iam illis impres-
sam tanquam naturalem custodirent:
ferrea demum lamina, quæ ex cingulo
quoque surgebat ferreo, stomachum
comprimi iubeo, quo paulatim ad se-
dem suā retrocedere cogeretur: quod
factum est. Nam haud multò post hoc
vno tantum præsidio ita repressus est
tumor ille, vt ad pristinam ac natura-
lem

Iam formam ipsius ventriculi ceruix
penitus reuerſa ſit.

ANNOTATIO.

IN Iliaco dolore cùm excrementa per os
redduntur, ventriculus quoque in tumorẽ
quandoque attollitur, partim quidem ex
flatibus, ſed magna ex parte ab excrementis
eò perlatis. Quandocunque autem tale ali-
quid contingit, non modò ſpes vitæ ſuper-
eſt, ſed mors ferè imminet.

Menſes vomitione proiecti.

CAPVT XLI.



VRGEBATVR mulier
acerbiſſimo capitis dolo-
re propterea quòd men-
ſtrua non prouenirent: ve-
rùm his demum vomitio-
ne propulſis, ilicò ſublatus eſt dolor.
Sed cùm id iterum iterumque ac ſæpi-
us factitaſſet, abhorrens tandem mu-
lier ab huiuscemodi vitio, auxilium
noſtrum expoſcit: qui ſola ſanguinis
miſſione ex venula quæ ſub talo eſt, &
menſtrua ipſa ex naturali loco ritè
profluere coëgimus, & quod ſequens
eſt, mulierem ipſam priſtinæ ſanitati
reſtituimus.


ANNO;

ANNOTATIO.

TAMETSI plerique existiment naturam non moliri mensium purgationem per vomitum, istud tamen exemplum, tūm & nostrum cap. XXVI. suppressis mensibus superfluentem sanguinem vomitione quandoque euacuari ostendit. Affirmat idē Ioannes Langius epist. XL. primi libri. Videtur & hoc testari Hippocrates Aph. XXXIII. lib. V. vt in scholijs capitis XXVI. quoque scripsimus.

Cordis pars patefacta.

CAPVT XLII.

 NCISO abscessu, qui supra septimam vertebram innatū longo temporis interuallo finum fecerat, intimamque membranam sua sanie prorsus eraserat, minima ipsius cordis pars oculis cernentium patefacta est. Verūm cum hominem summa & diligentia & solitudine curaremus, in pristinam redactus est sanitatem.

O

3

Pure

Pure per urinam deducto sanatus est pleuriticus.

CAPVT XLIII.

QUITVR sæpè in lateribus morbus, qui πλευρητικὸς à Græcis nominatur: huic tussis & febris accedit, & excreatur cum pituita sanguis, graue profectò ac intollerabile malum. Hoc cùm affligeretur Antonius quidam, & morbus iam ad maturitatem peruenisset, euacuato per urinam pure, quòd rarò contingere solet, penitus sanatus est æger.

ANNOTATIO.

PVS in thoracis spatio aut in pulmone contentum, per vesicam quandoque expurgari non modò à recentioribus obseruatum, sed & à Galeno quoque visum: vt lib. VI. de affectorum locorum notitia testatur; ubi viam ostendit per quas pus ad renes deferri queat. Recipi siquidem pus à læui arteria pulmonis, ait: deinde per sinistrum cordis sinum delatum, in magnam incidere arteriam, per quam ad renes, & illinc ad vesicam descendere. Nam vt à concaua vena, ita quoque à magna arteria ramos ad renes demitti.

Noui-

Nouimus verò & nos rusticum tantum in pectore puris habentem, vt capite cum pectore deorsum reclinato ex ore illi efflueret, qui purulenta reddita vrina sanitatem mox consequutus fuit.

Ex tabe sanata sola sanguinis missione.

CAPVT XLIIII.



ANNO integro remorantibus menstruis mulier ad summam deducta est maciem: & venæ eius ob nimiam plenitudinem nigrioris factæ, admodum extendebantur. Cumque nullum cibi genus desideraret, consequens fuit, vt totum tabesceret corpus. Quare præsentaneum auxilium iudicauimus sanguinem mittere: qui cum primo die nigrior effluxisset, iubeo & altero idipsum fieri. Quo longè clariore emanante, factum est, vt profluentibus dein mensibus, mulier quæ per annum macie & tabe afficiebatur, idoneis tandem medicamentis resumpta ad pristinam faciliè redierit valetudinem.


O

ANNO.

NON rarò accidit virginibus viro-
maturis, vt suppressis aliquanto tem-
pore mensium purgationibus, respiratio
reddatur difficilior: cor ex leui occasione
palpitet: ventriculus cibum auerfetur: & fa-
cies corpusque albido colore palleat. Nam
quod Galenus lib. contra Erasistratios Ro-
mæ agentes de muliercula scribit, cui purga-
tio mēstrua quatuor fuerit mensibus sup-
pressa, quæ faciem habebat rubicundam, in-
ter rarissimè contingentia numerari potest:
frequentissimè etenim pallentes sunt. Hoc
autem modo sese habentibus virginibus cor-
pora earum non nutriri, ac contabescere, vt
à ratione haud alienum, sic ex hac occasio-
ne extenuatas sanguinis missione restitui ra-
tioni consentaneum. Sanguinis enim detra-
ctionem mēstrua succedit purgatio: hanc
verò sanitas sequitur.

Fluxus sola oratione solutus.

CAPVT XLV.



ACCIDIT interdum ventrem
fluere: & si diu negligas, diffici-
lior plerunque fit eius curatio,
quin & nonnunquam impossibilis.
Quod & nos nuper experti sumus. Io-
hanni-

hannina Bencia affinis mea, mulier quidem & animo & genere nobilis, cum diu ventrem fluere permisisset, eò tandem deuenit, vt nullis medicamentis, nullis auxilijs, nullis etiam balneis eiusmodi fluxus sisti potuerit: augente igitur hoc malum iugi & inuincibili humore, qui ex eius infirmo alioquin & imbecillo capite in ventriculum destillabat. Et licet interdum conualescere videretur, haud multò tamen post reuertebatur id malum, & quidem priore deterius. Quare omni spe medicæ artis deposita, fratrem Dominicum Piscientem ordinis Prædicatorum, de quo etiam superius mentionem fecimus, adit: morbum quo tenetur exponit: se omni humano auxilio destitutam affirmat: lachrymis & precibus orat, vt laboranti sibi sua & fide & oratione opem ferat. Quod cum ille se facturum pro viribus annuisset, admota manu mulieris caput comprimit. Tum fusa oratione, ac signo Crucis ibidem impresso, abire iubet. Reuersa domum, cum eo ipso atque etiam altero die venter nihil

ex consuetudine præterquam sanum redderet, me conuenit, rem ordine narrat, seq; penitus liberam affirmat. Quod etsi Deo, cui possibilia sunt omnia, factu facillimum scirem: verebar tamen ne quod habebat in uotis mulier, id iam se adeptam persuaderet: cū nihilominus morbus ipse paulò post vel etiā deterior reuersurus esset. Sed cum ita tertius peragatur annus, ex quo fluxus ipse suppressus est, nec vlla interim apparuerit, vel etiam appareat regressionis nota, ingenuè & fate-mur & prædicamus, hoc solo nutu Dei per fidem & orationem sanctissimi illius viri factum fuisse, ad laudem & gloriam nominis sui, quod est benedictum in secula.

*Gelatus in comitiam inci-
dit morbum.*

CAPVT XLVI.

HIERONYMVS Bencius, cū ē Diui Laurentij æde, vbi declamātis ad populum concionem audierat, domum sese recepisset:

pisset: & reſerato oſtio ad cubiculum
uſque, in quo vxor ex partu languens
iacebat, aſcendiſſet: immotus ibidem
& inconniuis oculis ſterit. Quem cum
vxor diutius intuita rogafſet tandem
quid ageret: & ille nihil ſecius exper-
giſceretur, accerſitis famulis in eodem
quo illa iacebat cubili, coniugem lo-
cari iubet. Qui ubi tandem ſenſum re-
cepit, nihil eorum quæ ipſe interim
egerat, recordabatur. Quare conuo-
catis Medicis, quibus & ipſe interfui,
plurimo ſermone quæſitum eſt, an ille
toto eo tempore obdormierit, vt ac-
cidit multis: qui ea perſapè dormien-
tes faciunt, quæ munia ſolum viden-
tur eſſe vigilantium: an alio quopiam
morbo laborauerit. Ac tandem con-
uenimus illum eo tempore non dor-
miſſe, ſed rigidum potius, vel attoni-
tum, vel gelatum fuiſſe. Quam qui-
dem ſententiam etiam ſubſequens
malum maniſeſtiſſimè comprobauit,
cùm paulò poſt in comitiales inci-
derit morbum: quo nullis prorſus cō-
ferentibus auxilijs multos iam annos
miſerabiliter cadit.

ANNO-

CATOCHVS affectus erat, quo Hieronymus Bencius initio detentus fuit. Cum autem huius frigidus ac crassus pituitosus humor causa fuerit, facile in comitialem morbum transitum fecit. Catocho laboravit & matrona illa, de qua nostrorum exemplorum Cap. V. ex quo in Lethargum incidit. Non rarum autem, morbum vnum in alium permutari.

Amissa atque iterum recuperata memoria.

CAPVT XLVII.

EX præterito morbo conualescens Antonius quidam Senensis, quæcunque memoria fixus tenuerat, ita prorsus oblitus est, ut ne rerum quidem nomina reminisceretur. Dumque Florentiæ esset, Senis se esse putabat: sed ne amicos quidem ab inimicis discernebat: quos etiam immutatis nominibus vocitabat. Quare eo velut prorsus amenti, atque deliro naturæ dimisso, cum vigesimo iam die hoc malo angeretur, coepit venter fluere, variaque & diuersa strigmenta,

menta, sanguinem, bilem viridem, muccosasque deiectiones deponere. Quo factum, ut mens simul & memoria redirent, licet nihil eorum, quæ ipse interim gesserat, recordaretur.

*Ex distentione nervorum
mors subsequuta.*

CAPVT XLVIII.

MITTERE sanguinem ut expeditissimum perito est, sic ignaro periculosissimū. Iuuenem vidimus, cui cum ex brachio sanguis mitteretur, & nervum scalpellum attigisset, statim sequuta est nervorum distensio: quæ hominem ita crudeliter afflictauit, ut paucis etiam diebus laboranti illi vitam eripuerit.

ANNOTATIO.

NERVORVM puncturam grauissimi dolores ac molestæ non raro succedunt euulsiones, quas si superflua aliqua euacuatio comitetur, admodum periculosum. Nam, ut Hipp. Aph. III. lib. V. Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens malum: item & præcedente

dente Aphorismo: Conuulsio ex vulnere lethalis est.

Ex incisa arteria ferè mortuus.

CAPVT XLIX.


OR TA, vt assolet, inter commentales lite, cùm quidam è conuiuis arreptum calicem in Alfonso Hispani familiaris nostri faciem proiecisset, & incisa arteria ac cute dilacerata sanguis copiosior erumperet, multa quidem, ac frustra, adhibita sunt medicamenta: cùm ea sit arteriæ ipsius conditio, vt incisa coire aut sanescere citra vstionem non possit. Quare cum sanguis ipse eò semper vehementius flueret, quò plura experirentur auxilia, & homo iam venis exhaustis prorsus deficeret, ad me tandè mittunt, rogantes, vt si fieri possit, amicum à morte præripiam. Venio igitur ad eum, vulnus inspicio, virtutem probo, nullum superesse præsidium iudico, præter vstionem solam. Quare ea qua potui diligentia incisam arteriam candenti ferro inuro, & statim suppressus est sanguis: quo inhibito

hibito, reliquum curæ facilem satis & expeditum habuit ad sanitatem regressum.

ANNOTATIO,

ARTERIA vulnerata magnam diligentiam adhibendam esse ut sanguis fistatur, & vulnus coalescat, ostendit Galenus Medendi methodi lib. V. cap. III. Consequitur autem non raro arteriæ vulnus, quod Græci *Ανευρίσμα* appellant, ut cap. LI. nostrorum exemplorum videre est.

Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua.



QUIDAM nostri seculi Medicus, Philosophiæ magis quàm medicæ artis peritus, cum uxorem Iacobi Pactij equitis Florentini curaret, quæ duabus tertianis vexabatur, mittere sanguinem utilissimum iudicavit: quod & ego, cui simul cum illo cura demandata erat, penitus non improbabam: cum bilis sanguini mixta videretur. Sed & multa tamen pituita exuberabat. Igitur venam incidendam quidem censui: sed tentandi gratia,

gratia, vt scilicet colorem sanguinis habitumque discernereamus. Qui si crassus & niger esset, tanquam vitiosus largius effunderetur: sin contrà ruber & pellucens, tanquam integer seruaretur. Incisa igitur vena sanguis effluxit rubicundior. Quare dimisso iā caliculo, supprimendum censui: ille contrà deducendum. Verùm cùm esset ipse ætate prouectior, eius magis sententiæ inhærentibus coniuge & propinquis, ad duas sanè libras sanguinis miserunt æquè lucidi ac rubri. Quare cura omni seniori illi relicta, protinus discedo, palàm affirmans atque contestans iugulatam esse mulierem: quod & paulò pòst rei euentus facile comprobauit, cùm paucis admodum diebus mulier ipsa, defectis iam viribus, ac voce penitus exhausta, in somnum inciderit grauiorem, ex quo tandem mors subsequuta est, ob nimiam scilicet humorum cruditatē, quæ ex ingenti sanguinis profusione contingere solet. Quare debet semper Medicus, si diligens sit, in omni sanguinis missione considerare, vtrum crassus

crassus & niger, an contrà ruber & pellucidus sit. Quòd si niger & crassus, vt vitiosum effundi: sin contrà ruber & pellucidus, vt integrum supprimi iubere. Tantum enim abest, vt eiusmodi sanguinis, rubri scilicet atque pellucidi, missio profit, vt etiam plurimum semper obsit. Sed excidit homini documentum filij Seni: quo in missione sanguinis cùm bilis accensionem, tùm & pituitæ cruditatem plurimum cauendam censuit.

Epoto veratro iugulatus.

CAPVT LI.

ABORANTI cuidam Zenobio nomine quartana, imperitus quidam Medicus veratrum, quod inter cætera medicamenta periculosissimum est, temerè propinauit. Ex quo statim subsequuta est cùm crebra ac vehemens alui deiectio, tùm spiritus tam grauis ac difficilis attractio, vt cùm me filij ad hominem iam in mortis articulo positum aduocassent, & nullis potuisset præsidij tanto malo succurri, intra sex tantum

P

tum

tum horarum spatium mors eum violenta è medio subtraxerit. Cauendum igitur est, ne huiusce modi medicamenta, quæ veneni naturam habent, & stomachum cæteraque membra plurimum ledunt, absque eo exhibeamus, quod nocumentum auferre possit: cum & aluum per se sapius ducant, & hominem non solum infirmant, sed plerunque etiam morti tradant.

*Vomitum ex albo veratro
mors subsequuta.*

CAPVT LII.

VOMITVS vt interdum sanis utilis, sic aduersa valetudine laborantibus nonnunquam necessarius. Verum multum interest quo modo & quare fiat. Hoc autem officium diligentis Medici esse debet. Nam cum quidam medicæ artis imperitus albo veratro vomitum ciere solitus, omne genus morbi tali præsidio se curaturum polliceretur, accidit fortè vt in manus eius inciderit quidam, qui duobus iam annis ventriculi vitio labo-

laboraret, nec ullis vnquam medicamentis sanari potuerit: vtpote quod cum suapte natura difficile sit, difficilimum etiam redditur in corpore infirmo atque imbecillo, præsertim vbi licentiore quadam libertate vtatur æger. Album igitur & huic veratrum ex more exhibente illo, plurimum bilis ac pituitæ, tum nigram bilem, postremò sanguinem eiecit: quibus ita deductis, imbecillitas primò & quidè magna, tum sudor frigidus toto capite ac thorace emanans, nouissimè & mors subsequuta est. Non igitur ignorare diligens Medicus debet huiusmodi medicamentum non semper ægris prodesse, sanis verò semper obesse. Nam vbi robustum corpus nactus fueris, & ventriculus sit potens, morbusque longior ac difficilis, vt Comitialis & Insania, aut pares his, tunc album veratrū ritè ac citra Medici culpam exhibi potest.


ANNOTATIO.

QVAM periculosus sit temerarius veratri vsus, ostendit Hippocrates Aphor. 1. lib. 5. Connulsio, inquit, ex helleboro
 P 1 lethalis

lethalis est: & Aph. XVI. lib. III. Carnes sanas habentibus helleborus periculosus: facit enim euulsionem.

Represso sudore sanatus.

CAPVT LIII.




VM haud postremæ notæ Medicus nobilem quendam ciuem curaret, & febribus male hominem habentibus, vniuersum corpus in sudorem resolueretur, viresque omnes ita deficerent, vt cognati plurimum de salute eius addubitarēt, me aduocant, ægrum ostendunt, curā enarrant. Inspiciens itaque hominem, oculos admodum graues ac pallorem faciei intueor: quin & intima eius præcordia calore vehementi affici aduerto. Quare sudorem inæqualem, qui finiri non poterat, statim amotis vestibus, quibus ille de præcepto Medici tegebatur, vt incongruum & inutile suppressere nitimur: præsertim quòd eo vires ægri penitus conuelli videbātur: tūc corpus euentari, ægrumque etiam frigidioribus potionibus vt iubeo: donec sudor, quem Medicus ille
omni

MEDICINAL. OBSERVAT. 213
omni studio ciebat, prorsus suppri-
meretur. Quod vbi factum est, immu-
tari statim videas ægri faciem, vires re-
dire, calorem reprimi, febrem remitti,
ac non multò pòst hominem ad pri-
stinam sanitatem reuerti.

Pestilenti febre arreptus.

CAPVT LIIII.

HILIPPVS Stroza & nobi-
litate generis, & opum affluē-
tia insignis, lenta quadam fe-
bricula laborabat: & ex Medicis, qui
ægrum viderant, alij quotidianam, sed
leuem, alij ob algorem contractam
febrem putabant: nec defuit qui cre-
deret à capite distillasse materiam, quę
putrescentem febriculam gigneret.
At nos cum eam ipsam diligentiori
examine perpenderemus, pestilentem
iudicauimus. Quam sententiam deri-
dentes Medici, cum leuatam iam fe-
brem existimarent (latebat enim ang-
uis in herba) familiari tantum Medico
curam dimittunt. At æger, qui iam
conualuisse videbatur, aduentante
die septimo, in neruorum subitò re-
P 3 solutio-

solutionem & febrem incidit ardescen-
centem:qua exhausta voce, & corpo-
ris viribus conuulsis, paucis etiam
diebus mors subsequuta est. Magna
igitur esse debet Medicorum circum-
spectio in cognoscendis curandisque
morbis:ne inscitia (vt sæpè fit) atque
indiligentia eorum ægri ipsi, qui sese
illis penitus tradunt atque commit-
tunt, periclitentur.

*Claudus ex loco eminentiori
cadens liberum recipit
gressum.*

CAPVT LV.

NICOLAUS architectus cùm
de eminenti turri præceps rui-
set, tantum abfuit, vt ex tam
ingenti casu incommodum aliquod
reportarit, vt cùm antea altero clau-
dicaret pede, rectè deinceps ambula-
uerit. Quin & puerum vidimus, qui
pestilenti morbo correptus curatus-
que idem malum effugerit. Nam vbi
prius vtroque pede claudicaret, vt nisi
duobus fulcitus baculis omninò in-
cedere

cedere non posset, curatus liberè, id est, sine aliquo adminiculo incedebat.

A Scorpione ictus glacie se opprimi querebatur.

CAPVT LVI.

FAMVLVM habui, qui à scorpione ictus tanto subitò ac tã frigido sudore toto corpore perfulus est, vt argentissima niue atq; glacie sese opprimi quereretur. Verùm cùm argenti illi solam theriacam ex vino potentiore exhibuissem, ilicò curatus est.

ANNOTATIO.

ISTVD exemplum Scorpij venenum frigidum esse ostendit: proinde, & quæ huius veneno Theriaca resistunt, optima, quæ facultate calida.

Fames valida.

CAPVT LVII.

CVM vniuersam penè Italiam anno salutis nonagesimo sexto supra millesimum quadringentesimum tam ingens ac valida famēs affligeret, vt passim multi publi-

P 4 cis

cis in vijs atque plateis deficerēt: multi etiam ex malis & noxijs nutrimentis in varias inciderent ægritudines: vidimus ex his quàm plurimos qui ex diutina fame escam abundantio- rem nacti fuerant, dum pleniore vtuntur victu, paucis diebus vitā finisse: adeò noxia atque perniciofa nimia facie- ras, quam multa præcessit inedia. Mu- lieres quoque vidimus, quæ pueris quos lactarent infectis, & se & illos ad mortem deducerent. Plurimi tamen ex his qui ad valetudinarium deduce- bantur, Medicorum cura & diligentia ad pristinam reuertebantur sanita- tem.

*Mulier ferè mortua ex san-
guinis missione.*

C A P V T LVIII.

MULIEREM vidimus, quæ cum pleniori & obeso esset corpore, & in ardescens in- cidisset febrem, vsa cuiusdam imperi- ti Medici consilio, sanguinem ex vena copiosum emisit. Quo statim graui- ter afflictata in multò deterio- rem prolap-

MEDICINAL. OBSERVAT. 217
prolapsa est valetudinem. Nam vt in
tenuioribus magis sanguis, ita & in
plenioribus magis caro abundat. Nos
igitur cum ad mulierem vocati, eam
summo in discrimine positam inue-
niremus, alias omninò obseruationes
adhibendas censuimus, eas videlicet,
ad quas dirigi curantis consilium de-
bet. Quare defectam dudum virtutū
omni genere auxiliij resumo, donec
corporis viribus redeuntibus materi-
am quam exuberare cognoueram,
medicamento deponendam censeo;
quod cū ex frigidioribus rebus ægro-
tanti exhibuissem, ilicò extincta est fe-
bris, & mulier, de cuius iam funere
cogitabatur, per Dei gratiam ritè cu-
rata conualuit.

ANNOTATIO.

VITAE thesaurus sanguis est: atque
immodica idcirco eius profusio, per
quamcunque tandem partem fiat, periculo-
sa. Multi ex immodica profusione mortui
sunt: qui verò in vita seruati, sæpenumerò in
hydropen inciderunt; refrigerato scilicet
locinore, & naturalibus facultatibus labefa-
ctatis.

P

5

Ex

*Ex quartana malè curata, san-
nitas, tùm & mors sub-
sequuta.*

CAPVT LIX.

VILLICVS meus annuam quartanam patiebatur, & consilio nescio cuius empirici fascelum ex omphacino, & alia vsque ad satietatem deuorans, ad viginti insuper vini meri calices ebibit: quo adedò inflatus est, vt è foco prope quem cœnauerat, amoueri penitus non posset. Quare strato humi pallio quo induebatur, ibidem pernoctauit. Matutino autem aduentante tempore, diffusus per omnia membra sudor est: quo finito, vomitu quicquid comederat reiecit, & cum eo pituitosa excrementa quamplurima. Quo factū vt ex quartana quoque, qua integrum iam annum laborauerat, extrusa, valetudinē sit consequutus: quam quidem rem validioris naturæ vi acceptam referendam arbitrati sumus. Nam amota iam cruditate, & humorum conco-
ctione

ctione longiori spatio perfecta, natura quæ sua pigritia torpebat, ab ignavia & torpore propulsa, contra morbum & causas vires excitat, quibus tandem sudore ipso atque vomitu & morbum & errorem disiecit. Quod profectò eadem febris comprobavit. Nam cum quatuor post annos hominem iterum inuasisset, & ille putaret eodem se posse auxilio febrem tollere, quo olim fecerat, statim, hoc est, inter morbi ipsius initia, dum scilicet cruda esset adhuc ipsa materia atque incocta, pleniore ut cum victu & portione abundantiore ex iisdem quibus suprà rebus abusus, ante solis ortum eodē quo decubuerat loco mortuus inuentus est.

ANNOTATIO.

LONGVS morbus Quartana est, diligenti curatione & exquisita victus ratione opus habet, in quibus si peccetur facile deterior redditur. vel ex hac in morbum alium transitus fit: quod & citra errorem non rarò contingit. Plerique enim ex quartana hydropici, alij phthisici redduntur. Qui sexagesimum ætatis annum superant, si à quartana

*22 Quartana
Hydropici & phthisici*

tana occupentur, rarò euadunt, & magna ex parte hydropici moriuntur. Iuniores minus periclitantur, nisi natura sint ad phthisim propensi, quibus quartana quandoque in hanc definit. In quartana facilè multi crudi ac etiam serosi tenuesque humores colliguntur, naturali facultate ventriculi ac Iocinoris per morbi diuturnitatem debilitata. Excernuntur hi quandoque per sudores: quandoque per aluum: nonnullis fluxus sanguinis è naribus accedit: quibus verò nulla harum vacuationum superuenit, vel hydropici fiunt, vel destillantibus in pectus & pulmones humoribus phthisici: quanquam tamè nec hi, ab hydropis periculo liberi sunt, quibus sanguis copiosior diutius è naribus profluit. Contingit verò & crudos crassos melancholicos humores splenem occupare, hydrope non rarò succedente. Quartanæ autem quò puriores, hòc etiam diuturniores, molestæ admodum, quæ calidis morbis succedunt. Impuræ, & præsertim ex humore melancholico bile permixta, breuiores sunt. Diem hæc subinde mutant. Cum enim accessiones multum anticipent, fit vt quandoque in meridiem vel paulò prius incidant: quod ubi contingit, mox mutato die, tertio, vespertina hora inuadunt, consuetum paroxysmi diem antecuerentes. quo die non recurrit febris,

*Quartana Iejini-
in phthisim*

*humores crudi
serosi sanguis
quartana*

*fluxus sanguis
è naribus*

febris, vel admodum clementer, citò recurrere desinens. Atque sic ter mutasse huiusmodi quartanam accessionis diem à nobis quandoque observatum est. Naturæ siquidem quartanæ repugnat, vt ante meridiem inuadat. Nam vt generatio eius inclinante anno; sic & particularis accessio non nisi inclinante die accedit. Imponit quandoque Medicis triplex quartana, verùm à quotidianâ dignoscitur ex eo, quod accessiones eius à meridie fiant: quotidianarum verò matutino tempore. Curari quartanam quandoque errore contingit. Sed qui vni benè cedit, alteri exitialis est. Sic duos fuisse Iuuenes quartana laborantes Amatus Lusitanus refert Curatione XLII. Centuriæ secundæ: Quorum vnus praua victus ratione euasit: alter vitam cum morte commutauit. Sic etiam quod quandoque vno tempore (si præter rationem fiat) prodesse videtur, alio tempore noxium est: vt Beniuenij villico contigit. Desinit verò & quartana febris quandoque alio superueniente affectu: veluti dysenteria, qua nonnulli à quartana olim liberati

Vnus Autumno nullo alio præcedente morbo quartana correptus, post detractum è sinistri brachij interna vena sanguinem, & assumptas aliquot ex hiera picra pilulas, in dysenteriam incidit, sed haud molestant.

Mox

*Quart. no inter
dit à meridiem*

*Quart. matut.
no tempore.*

*Dysenteria à
quartana Liberat.*

Mox febris mitior facta, & perseverante dysenteria febris citò desijt: Dysenteria verò breui pòst nullo adhibito remedio spontè cessavit.

Monialis quoque quædam, cum duplici quartana laboraret, superueniente spontè fluxu dysenterico, mox ab vna, deinde ab altera libera facta est. Cessavit & huius fluxus nullo alio adhibito remedio, quàm idonea victus ratione. Hùc facere videtur Aph. XLVIII. lib. VI. Lienosis difficultas intestinorum superueniens bonum. Si enim Lienosis expediens dysenteria est, quartana laborantibus profuisse à ratione haud alienum est. Nam per quartanas, Lien sæpè malè afficitur, & Melancholicus humor quartanæ & Lienì malè affecto communis est.

*Molesta tussis sola sanguinis
missione curata.*

C A P V T L X.

MOLESTA tussì afficiebatur puella quædam XV. agens annum: quæ tametsi per se grauis & formidabilis esset, eò tamen sese Medico formidabiliorem reddebat, quòd vnà sæpius cum ea sanguinem expuerat puella. Quamobrem cum Medici ipsi,

ipsi, quibus cura demandata erat, & hanc paulatim tabe consumptam iri, & nullis se posse auxilijs huic malo succurrere viderent, eam tandem Deo & naturæ dimittunt. Verum pater (vt est amor) ne quid omninò intentatū relinqueret, me aduocat, puellā ostēdit, & quæ hætenus facta sūt, plurimo sermone enarrat. At ego sputum primò colligi iubeo, quod vbi nullum pus subsequi, & sanguinem ipsum minimè etiam purulentum inspicerem, cœpi mecum cogitare, quænam huius vitij causa esset, & an sanguis ipse ex ore vel ex gingiuis, aut fortè ex naribus efferreretur: sed cùm ex his locis absque vlla profluat tussi, aliunde eum emanare arbitratus sum. Quare igitur si is ex gutture, aut ex arterijs vlceratis, vel ex pulmone potius, siue ex pectore, aut fortè ex iocinore prorumperet: sed cùm nulla essent certa indicia, puellam interrogo an menses illi profluant (solent enim feminæ, quibus sanguis per menstrua non respondet, sæpè eum aut cum tussi expuere, aut vomitione propellere.) Sed negante

gante illa, sanguinem mittendum cœ-
seo ex venis, quæ sub talo sunt: idque
singulis mensibus faciendum, donec
isto atque item alijs auxilijs, quæ san-
guinem promouere consueuerunt, &
menses ipsi ritè profluere cœperunt,
& puella quæ iam macie & tabe con-
fecta videretur, sex tantum mensium
spatio vires & corpus resumens, ad
pristinam, adiuuante Deo, reuersa est
sanitatem.

Difficultate spirandi mortuus.

C A P V T L X I.

MULTOS difficultate spi-
randi laborasse cognoui-
mus: sed inter cæteros
quendam, qui non nisi re-
cta ceruice spiritum tra-
hens, paulatim ex angustia deficiente
virtute toto corpore pallidus ac liuēs
efficiebatur: nullus tamen in pectore,
nullus in præcordijs dolor erat: sed nec
sibilus aliquis ob angustias, per quas
spiritus euadit, percipiebatur: ex quo
iudicare posses ægritudinem in pecto-
re concipi. Verùm cùm paucos post
dies

MEDICINAL. OBSERVAT. 225
dies inualefcente morbo ipfo, & nul-
lis conferentibus præfidijs, æger è vita
migrasset, incidere mortuum decerni-
mus, vt huius mali abditas ac latentes
causas deprehenderemus. Quod vbi
factum est, inuenimus nō parum atræ-
bilis & sanguinis nigrioris in eius cor-
de coiffe: vnde etiam per venas diffu-
sus, non est mirum si corrumpente eo
spiritum ipsum, hominem ad festinam
mortem deduxerit, quod etiam au-
ctore Galeno aliàs contigisse cogno-
uimus.

ANNOTATIO.

DE spirandi difficultate cum suffoca-
tionis periculo in nostris exemplis
cap. XIX. quoque scripsimus.

*Ex horrore flammæ in fe-
brim incido.*

CAPVT LXII.

IN Appiani basilica, cū adhuc
admodum iuuenis, vnà cū Pe-
regrino Allio literis Græcis o-
peram dabam sub Præceptore Fran-
cisco Castilionensi religioso viro. vbi
cum semel è cubili summo diluculo

Q

consur-

consurgens ædem ipsam ingrederer,
vixque limen transilissẽm, ecce video
flammas ab imo pauimẽto iterum at-
que iterum sursum ferri: horresco, &
pauens ac tremẽs cursim, vt poteram,
cubile ipsum repeto. Me verò Peregri-
nus condiscipulus meus, qui adhuc in
lectulo quiescebat, cùm anhelantem
& veluti lymphatum inspiceret, rogat
quidnam mali mihi cõtigerit: vix ego
trahebam spiritum, rem tamen vt po-
tui explico. Admiratus & ipse, timere
cœpit. Sed cùm interim præceptor
noster è cubili surrexisset, hominem
cõuenimus, rem exponimus, causam
quærimus. Ille verò, vt erat vir doctus
& in philosophia satis cruditus: vapo-
res, inquit, ex cadaueribus mortuorũ
eleuantur, qui calidissimum hunc aë-
rem nacti (id enim accidit in ipso men-
se Iulij) facilè inflammantur: quod &
nos etiam sæpius vidimus, ac propte-
rea nihil nobis pertimescendum est.
Hoc etsi ego autoritate viri suassus
verum iudico, ex præcedente nihilo-
minus timore, ex quo spiritus ipsi ca-
teruatim versus cor regredientes in-
flamma-

MEDICINAL. OBSERVAT. 227
flammati sunt, in eam, quam Græci
ἐφίμεραν vocant, febrem incidi.

Puer horrore mortuus.

CAPVT LXIII.

PVERVM nouimus, qui dum
rure paterno degeret, singulis-
que diebus ad vicinum sacer-
dotem studendi causa, vt fit, summo
mane mitteretur à patre, accidit semel
vt propè iam intranti illi sacerdotis
ipsius ædes, essetque cœlum paululum
adhuc subobscurum, præstò fuerint
duo viri nigris vestibus obuoluti: qui-
bus adeò perterritus est puer, vt toto
corpore contremiscens, altaque voce
auxilium clamitans, in admirabilem
sanè ægritudinem, ac demum in mor-
tem inciderit. Nam statò tempore, id
est, octauo quoque die, & eadem fer-
mè hora in eundem semper horro-
rem atque clamorem proruebat, do-
nec tabe consumptus, vitam, quæ
nullis præsidij contineri potuit, mis-
rabiliter finiuit.

Q 2 ANNO:

PVERVM quoque quandoque visitaui, qui aliquot noctes insomnes egerat, & angues circa se videre existimans, toto subinde corpore contremiscebat, & perterritus horrebat. Huic somniferum vnguentū temporibus applicatum anguium imaginationem sustulit, somnum procurauit, & sanitatem contulit.

Tussi scissa est tunica intestinorum.

CAPVT LXIIII.

TVSSI valida vrgebatur puer sextum agens annum, dumque vehementius tussiret, scissa est tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debet, & in scrotum, Græci *δοχλον* vocant, intestina deuoluta, Herniam fecerunt, qua & in hunc vsque diem laborat. Tanta enim fuit scissura, vt nec coire hætenus vllis potuerit medicamentis, nec etiam in futurum, nisi sola vstione, coibit.

A N N O T A T I O .

SI peritonæi vel vnitas soluatur, aut laxiora eius fiant foramina, per quæ vasa
ad

ad testes deferuntur, citò vel intestina vel omentum extra locum suum decidit, affectusque fit qui Græcis κοιλῆ, Latinis Ramex dicitur: qui quandoque circa inguina consistit, & Bubonocœle appellatur: alias in scroto, quò si intestina descenderint, ἐντεροκοίλη: si verò omentum, ἐπιπλοκοίλη nominatur. Curatio autem horum non nisi per sectionē perficitur: quod artis huius peritis relinquendum.

*Ictus in cordis tunica
conualuit.*

CAPVT LXV.

EX nobili familia nati fratres duo, eadem etiam cohabitantes domo, atque eodem victu viuentes, dum inter cœnandum orta (vt fit) inter eos lite, alter alterum gladio, quo in mensa vteretur, in ipsius cordis sede percussisset, plurimusque ex vulnere sanguis efferreretur, languescunt ilicò venæ, pallet facies, sudor frigidus toto corpore manat, arteriæ non eleuantur, omniaque demum mortis signa apparent. Verùm ne nihil omninò agerem, iubeo hominem

Q 3

his

his rebus foueri, quibus cordis vires
refici possint. cumque æger vsque ad
mediam noctem eodem sese habitu
haberet, & de eius potius funere quàm
de vita cogitaretur, coepit paulatim
spiritus reuerti. Quare sumpta spe cu-
ram prosequor, donec alijs atq; item
alijs præsijs vsus, hominem tandem,
Deo adiuuante, ad pristinam sanitatē
reduco: ex quo planè cognouimus nō
ictum cor, vt putabamus, sed eius tan-
tum tunicam leuiter fuisse perstri-
ctam.

Vitium stomachi curatum.

C A P V T LXVI.



INTER stomachi vitia vulga-
tissimum est resolutio, quæ vel
calidiorē, aut frigidiorē, humi-
diorēve, vel etiam sicciore habitu ple-
runque solet accidere.

Nobilis quidam vir Ioannes nomi-
ne, ciuis Neopolitanus, cū diu eius-
cemodi vitio laborasset, & ex Medicis
nostri seculi plurimi hominem curan-
dum suscepissent, nullum tamen in-
uenire auxilium idoneum potuit.

Qua-

Quare cùm Florentiam demùm veniens me conuenisset, & quæ hætenus ex Medicorum consilio huic vitio adhibuisset, ordine enarrasset: ex his quibus vsus est præsijs facilè cognouimus, existimasse Medicos omnes eum malo habitu frigido laborare. Nos verò & præcedenti curatione, & alijs haud sanè obscuris indicijs, longè aliter sentientes, calidiore habitu eius affici ventriculū arbitrati sumus. Quare ad ea auxilia conuersi, quæ aridum iā ac tabe penè consumptum corpus desiderare videbantur: primo die solas lactuculas ex aceto & oleo commenducare præcipimus: quas cùm vtilis stomacho atque idoneas percepisset, iubeo dimittat balneum, frictiones, exercitationes, præsertim superiorum partium, vnctiones omnes & cibos calidiores, quibus hætenus vsus fuerat, & ad frigidos potius ac difficilioris concoctionis sese conuertat. Vnde & veruecem magis quàm auem, aut venationem, aut piscem, nisi sit generis durioris, in hac sua ægritudine conlaudo. Potui quoque aptissimum illi

Q 4

vinum

vinum frigidum & austerum, ineptissimum calidum & crassum esse pronuncio. Quibus cum ille auscultasset, ac diligentissimè ea exequutus fuisset, hoc tantum genere victus & frigidioribus medicamentis vsus, infra duos menses pristinam recuperavit sanitatem.

*Melicera pro carbunculo
iudicata.*

C A P V T L X V I I .



LCERE subalbido furunculo simili, quod Græci, eò quòd faui speciem habeat, *μελικηρὴν* vocant, vir quidam nomine Paulus laborabat. Id autem cum febrem & inflammationem ingentem excitasset, Medicum quidem, sed qui per imperitiam vlceris ipsius naturam minimè calleret, accersit. Eo autem iudicante vlcus ipsum pestilens esse (venit enim cum dolore vehementi, habensque foramina per quæ fertur humor glutinosus vix maturescit) simul omnes cū consulente Medico aufugiunt, vni tantum viro ægri curam commendantes.

Quo

Quo factum, vt desperatis penè rebus ad me mitteret, rogaretque aliquod pereunti illi auxiliũ ferrem. Sciscitor itaque nuncium vlceris naturam, & an increseat ægritudo, vel deficiat virtus, aut fortè eo loco pestilentes sint febres. Refertur vlcus non nigrum, non lucens, non pallidum esse, febrem lentam & penè leuatam, sana omnia in regione illa. Accedo igitur ad hominem: cumque contrà hilari vultu resedissem, faciem primò oculosque sano similes intueor. Tum arteriam tangens, pleniorẽ quoque reperio. Quare sanitatem pollicitus vlcus detego, & omni sublato timore familiã reuocans curam aggredior: quæ licet difficilis admodum fuerit, ad integrã tamen sanitatem æger ille per Dei gratiam reuersus est.

Incisus coles sanari nequiuuit.

CAPVT LXVIII.



EDIUM sibi colem lino, & quidem arctè deligauerat puer inscijs parentibus, eoque tam diu inctus fuit, donec plagæ alti-

Q 5

tudo

tudo ad iter vrinæ ascenderet duobus locis: quibus & quòd vrina ipsa inde mitteretur, & quòd vtrunque oræ obcalluerint, coire vlcus atque conglutinari nullis vnquam remedijs potuit.

Monachum etiam iisdem fermè temporibus vidimus atque curauimus, qui ob zelum castitatis, sed indiscretum tamen, ac minimè secundum Dei rationabile obsequium, colem sibi & quidem pubetenus prorsus absciderat: ex quo cum sanguis copiosus efflueret, ac propterea medicamenta omnia vinceret & exuperaret, arduū sanè ac laboriosum fuit eiusmodi profluium sistere atque inhibere. Oportuit enim singulas venas, quæ sanguinem fundebant, apprehendere, atque ita deligare, vt ora præclusa coirent. Quo facto reliquum curæ genus haud admodum difficile fuit, donec vulnus ritè curatum penitus sanesceret.

Qui ex nimia plenitudine mori videretur, sola sanguinis missione sanatur.

CAPVT

CAPVT LXIX.

PLVRIMVM in morbis iudicandis tribuunt venarum pulsui: qui si imbecilli exiguique fuerint, mortem plerumque denunciant: sin contrà magni & pleniores, salutis spem adferunt. Nos tamen Philippum quendam vidimus, hominem sanè ebriosum & corpulentum, cuius pulsus, dum languens in lecto iaceret, ita parvus & exilis erat, vt cùm à Medico percipi vix posset, facilè crederes mortem instare, ni facies rubicundior, oculi, dentes, & venæ pleniores iudicio præsentis Medici obstitissent. Quare tanti mali causam diligentius perquirens, iudico id ob nimiam saturitatem sanguinisque abundantiam fieri, nullumque opportunius adhiberi posse auxilium, quàm sanguinis ipsius celerrimam missionem. Sed obstabant cognati atque amici, verentes ne huiusmodi præsidium hominem celerius occideret. Instanti tamen mihi, accertam, si id fieri permitterent, salutem pollicenti, tandem acquie-
runt.

runt. Quare accersito statim ministro sanguis mittitur. Nec mora pulsus simul & vires tam celeriter redeunt, vt festinātor adfuerit ipsa sanitas, quàm mors quæ præ foribus excubare visa est, ad futura crederetur.

ANNO TATIO.

QVANTVM periculi ex nimia plenitudine immineat Hippocrates Apho. 3. lib. 1. ostendit: Habitus Athletarum &c. & Galenus quoque in eiusdem Aphorismi commentarijs refert. Cùm enim vasa supra modum fuerint repleta, periculum est ne dirumpantur, vel calor naturalis suffocetur. Sicuti nonnullis accidit, vt Galenus ait, qui cum ad immodicam venissent repletionem, subita morte interierunt. Quemadmodum & Philippo, de quo Beniuenius, accidisset, nisi tempestiuè sanguis detractus fuisset. Adfui & ego olim homini ebrioso, qui cùm ad tantam plenitudinem venisset, vt quodammodò strangulari videretur, etiam mutus factus fuit. Huic verò & sanguis largiter detractus è communi dextri brachij vena, mox loquelam & sanitatem restituit.

Abscessus solæ theriaca apertus.

CAPVT LXX.

PVERV-

PVERVLVS thoracis abscessu laborabat, & cum condita & matura iam suppuratio esset, timeretque ille vlcus mucrone discindi, theriacam superpono: qua non secus vnus tantum noctis spacio abscessus ipse apertus est, ac si scalpello fuisset incisus: ex quo facile coniectari potest, quanta sit huius compositi vis. quod & nos sæpè aliàs experti sumus.

*Gangrenam mortem adferre,
si à digito pedis incæperit.*

CAPVT LXXI.

QVI vlcere nigro, quod γάγγραινα Græci appellant, afficiuntur, si id à digito pedis inceperit, & patiens fuerit senex, vel ex his quorum corpus mali habitus sit, celerius moriuntur. Nouimus nos Cambinum, Carolum, & Thomam ciues Florentinos, nec non & alios quamplurimos huiusce-modi affectos vitio, paucis diebus vitam finisse. Incipit enim caro ipsa in vlcere paulatim nigrescere, vel liuens fieri: quin & arida interim atque sicca,

&

& cutis circumiacens nigris impletur pustulis : tùm & quæ proxima est, amisso sensu liuet palletque. Nec prius serpere id malum desinit, donec ossa etiam inficiat : quòd si quicquid aridũ est, & proximum quoque locum, vel usque ad sanum prorsus excideris, reuertitur tamen & serpit. Verùm cùm aliæ partes corporis hoc malo afficiuntur, plerumque sanantur. In illiusmodi autem membris & calor est debilis, & nerui insunt plurimi: qui cum inficiuntur, facilè etiam circumiacentia loca inurunt. Vnde & proxima his statim liuent, donec totum membrũ miserabiliter occupant atque inficiunt.

ANNOTATIO.

COCTORI ceruiciæ, de quo nostro. rum exemplorum cap. XXVII. gangræna quoque à digito pedis incepit: veluti & puero, de quo cap. LIII. Malè affectis internis visceribus & facultatibus vitali ac naturali insigniter debilitatis, extremas partes vita & calore simul destitui contingit.

Ex

*Ex carcinomate exagitato**mors subsequuta.*

CAPVT LXXII.



ENIT ad me Philippus quidam textor, cui in leua frontis parte tumor erat immobilis inæqualisque, ac furunculo persimilis, qui etiam tangenti renitebatur. Et venæ, quæ circa locum erant, pallidæ quodammodo ac liuore quodam suffusæ, vltra decorum intumuerant. Cumque nostrum de hac re perquisiuisset iudicium, consulo ne id malum quoquo modo tollere præsumat, sed leuioribus tantum medicamentis illi blandiatur. Discessit, & cum in manus imperiti cuiusdam Medici incidisset, tota iam intra mensem fronte & altero oculo eroso, ad me reuertitur, sciscitansque an aliqua salutis super sit spes: vtinam, inquit, consulenti tibi fidem habuissem. Moneo igitur hominem, ne vllis præterea vtatur medicamentis præterquàm blandis & leuoribus. Quòd si asperis & erodentibus vteretur, fore vt breui reliquum etiã ipsius

ipsius faciei eroderetur. Audiuit tandem homo, & cum his tantum quæ nos illi secundum hanc intensiorem parauimus, medicamenti semper usus fuisset, vt ad decimum vsque annum superuixit, ita certè si id malum ex cōsilio nostro nunquam agitasset, ad vltimum senectutis peruenisset.

A Ramice curatus interijt.

CAPVT LXXIII.

RAMICE vexabatur Micholotius noster: cumque sacerdoti cuidam, qui hanc artem profiteretur, sese curandum tradidisset, duplici statim ille fascia inguen deuinxit, non repulso in superiores partes intestino. Dumque membrum ipsum ita vt erat arctius obligatum in octauum vsq; diem detinuisset, essetque interim ingens exorta inflammatio, quæ hominem ea parte, qua fascia deligabatur, miserabiliter cruciaret, repente omnis amotus est dolor, & ipse delirare cœpit. Quare cum ad ægrū serò quidem, sed tamen vocatus accederem, primò arteriam tango: cumq;
pulsus

pulsus vix eleuari perciperem, & faciem inspectans, eam nimio pallore suffusam, atque ipsos etiam oculos cauos effectos aduerterem, iubeo sacerdotem accersant: tùm fascia illa soluta, locum vndique nigrescentem cerno, cumque specillum vlceri imponerem, omnia circumiacentia intestina iam putruisse cognosco. Ex quo paucis dein horis è vita discedens, vtile nobis documentum sua morte reliquit; languentium scilicet corpora nō sacerdotibus, quibus tantùm animarum cura demandata est, sed doctioribus Medicis tradi oportere.

ANNOTATIO.

NON omnes, qui à ramice aut vesicæ calculo per sectionem curantur, in vita seruantur: plerique etenim eorum moriuntur: quibus videlicet per diuturnitatem mali ac dolorum vires debilitatæ sunt; aut aliquod ex internis visceribus corruptum: Quod calculo in vesica consistente facile fit. Tandem enim renes inflammantur, ac deinde suppurantur, vt cap. XLIII. nostrorum exemplorum annotatum est. Et tunc quidem artifex culpandus non est. Sed si sinistra adhibeatur curatio culpa in artificem cadit:


R

veluti

veluti in hunc sacerdotem, qui intestino nō
 sursum repulso, curationem ramicis temerē
 aggressus fuit.

*Puella oculo perforato vi-
 sum recuperavit.*


CAPVT LXXIIII.



QUATVOR annos natam
 puellam vidimus, cui dum
 ea nodum in panno solue-
 re acuto gladio niteretur,
 resiliens mucro oculum
 dextrum percussit: quo perforata ipsi-
 us oculi tunica, plurimus statim inde
 fluxit humor: quare & si visum pror-
 sus amiserit, ipsum tamen haud mul-
 tō pōst ritē curata recepit. Tanta enim
 inest vis tenellæ illi ætati, vt hunc ip-
 sum oculi humorem (quod sæpè acci-
 dit) in integrum reficere possit.

*Iocinoris vitio laborans sola
 sanguinis missione
 sanatur.*

CAPVT



IOCINORIS vitio afficiebatur Antonius Brunellescus, ex quo cum vehemens dolor à latere dextro in iugulum humerumque transmitteretur, & bilem quoque euomentem ægrum singultus etiam penè strangularet, ad hominem vocatus accedo. Verùm cum huiuscemodi vitij notæ eadem ferè sint, quæ & lateris abscessum indicant, Medicus cui primum ægri cura demandata fuerat, medicamentis & cataplasmatibus eius pectori medebatur. Sed cum dolor & angustia magis magisque hominem affligerent, iubeo sanguinem ex vena, quæ ad iecur dirigitur, statim deduci: & quæ ille insuper pectori adhibuerat medicamenta, iocinori ipsi impono, donec æger ad sanitatem reuertitur: quod paucis diebus factum est. Oportet igitur Medicum non solum morbum cognoscere, sed & locum etiam in quo sit, diligentius perscrutari.

R 2

Scisso

Scisso intestino graciliore vita amittitur.

CAPVT LXXVI.

IENVIORIS intestini morbo, quem Græci ἐίλεον vocant, vrgeri cōmune est: sed vrgeri, vt sic vitam tollat, inauditum. Corpulenta quædam mulier, cūm modò supra, modò infra vmbilicum intolerabili premeretur dolore, nec vllus hinc inde spiritus erumperet, adeò agitata est, vt scisso tandem intestino vitam finierit. Quod nisi incisa mortua pluribus innotuisset, nescio an citra mendacij suspicionem à me scribi potuisset. Sed & rusticum nouimus, qui cūm post longiores torsiones, & ventris diuturnas inflammationes diem obijisset, & mortui incideretur corpus, longior in intestino fissura inuenta est: ex qua etiam recentes vuas, quas paulò antè comederat, prorupisse cōspeximus.

Vermis

Vermis ex pectore propulsus.

CAPVT LXXVII.

LABORABAT Antonius Si-
culus molesta quadam tussi-
cula, & cum diu nihil confe-
rentibus auxilijs hoc malum tolera-
set, ad nos tandem venit: rem exponit:
consilium quærit. Nos verò & quòd
morbus diutius inueterasset, & quòd
multos expertus Medicos, nihil om-
ninò profecisset, putabamus hoc viti-
um ægrè elidi posse. Verùm ne quid
intentatum relinqueretur, marrubij
succum ex melle ægrum deuorare ius-
simus singulis diebus: tùm & interie-
ctis temporibus scyllam lambere, do-
nec vermis ex eius pectore vnà cum
tussi propulsus hominem sanitati re-
stituit.

ANNOTATIO.

VERMES in intestinis reperiri fre-
quenter contingit, qui & quandoque
vomitu reiiciuntur: sæpissimè verò per infe-
riora descendunt. In pectore autem & pul-
mone gigni, atque cum tussi expelli inter ra-
rissima & admiranda numerandum, atque
ideò quidem magis, quòd pulmo assiduè

R ;

mouea-

*Vermis
in vesica.*

moueatur, locum quo hærere ac quiescere posset nullum vermi relinquens. Nec minus admirandum est & in vesica nasci vermem: quod tamen cuidam viro accidit, cui in vesica existens, multis modis molestus fuit, quandoque etiam sanguinis mictu prouocato, donec tandem per penis meatum spontè egressus, finem doloribus imponeret.

Calculus visus decisus.

CAPVT LXXVIII.



NICOLAUS Rusticus calculo vexabatur, figura, vt postea conspeximus, longiore. Hic cum ab ima parte acutior & asperior esset, vesicam ipsam incidit: tùm & testiculorum tunica perfracta, post multos ac penè intolerabiles dolores, tandem in conspectum venit: quo haud magna postmodum difficultate deducto, cum multi hominem moriturum, & quidem rectè, iudicarent (neque enim vesica cum incisa fuerit, præsertim inferiore parte, cohæret) ille tamen præter omnium opinionem cõualuit: hoc solùm ex tanto malo homini incommodo relicto, quòd inde semper quoad vixit vrinam reddidit.

ANNO.

ANNOTATIO.

FORAMEN per quod vrina reddebatur, quale Nicolao Rustico in scroto relictum fuit à calculo illàc delapso, memini me quandoque videre in perinæo, non tamè ex calculo sed ab vlcere ceruicis vesicæ natum: vlcere enim vesicæ ceruix si quando afficitur, non rarò eousque hoc ipsum progreditur, vt tandem exesa cute perinæi, foras erumpat: Atque tunc quidem per foramen assiduè vrina profluit, vlcere curationem nò admittente. Quod in pluribus obseruatum.

Os feminis erosum.

CAPVT LXXIX.

VRGEBATVR Rogerij Corbinelli filia in ilibus dextris dolore ferè perpetuo. Quare multis diuerso tempore vocatis Medicis, cùm vnusquisque pro ingenio suo, (diuersi enim diuersa sentiebant) puellam curassent, & præsidia nihil omninò profecissent, è medio tandè sublata est. Quare consilium fuit incidere corpus mortuæ, & inuentum est os feminis erosum, maximamque ossis partem in puluerem redactam: nec non & circa matricis os quatuor qua-

R 4 si lu-

si lutei tuberculi instar pilæ, quorum tres aqua opplebantur, quartus paululum præ cæteris eleuabatur, vndiq; dentatus, & superficie inæqualis atq; durior, vtpote qui ex carne atraque bile genitus esset. Non igitur admodum mirandum est, si in eiusmodi morbis, quorum causæ incertæ abditæq; sunt, diuersi Medici diuersa sentiant, & loquantur. Nam & Antonij Iaceti filiū nouimus, qui cum ingenti coxarum dolore vexatus, in maximam primum debilitatem, tum & in mortem nihil iuuantibus Medicis, nihilque conferentibus præsijs deuenisset, inciso corpore inuentus est pestifer humor in coxa, quo magna pars ossis erosa, etiam in cinerem versa videbatur.

*Calculo euulso sanata est
mulier.*

CAPVT LXXX.



ALCVLVM non in viris tantum, sed etiam in feminis concreescere certum est. Monialis quædam duodecimo iam die
vrinam

vrinam nō reddebat, propterea quòd ipsius vrinæ iter calculo obstrueretur, quò etiam materia multa confluxerat. Quare cū neque ænea fistula, neque medicamentis alijs vinci hoc malum posset, insolitum alioquin, sed tamen opportunum consilium capiens, vncum calculo iniicio, ne scilicet concussus iterum in vesicam reuoluere-
tur. Tum ferramento priore parte re-
tuso calculum ipsum percutio, donec
sæpius ictus in frusta comminuitur: &
tunc omni qua potui diligentia, ne
quid intus omninò læderetur, vncum
ipsum pariter ac ferramentum redu-
co: ex quo simul vrina atque calculis
remissis statim sanata est mulier.

ANNOTATIO.

NON admodum dissimilis hæc cura-
tio est ab ea, de qua exemplorum no-
strorum cap. XLV. scripsimus.

Ex solo vento mors subsequuta.

CAPVT LXXXI.

LODOVICVM Nicolinum ge-
nerosi equitis Othonis filium vi-
dimus, qui cum solo vento viscera &
R s stomachum

stomachum impetente adeò in monoculo affligeretur, vt dum pars parte premitur, exitu hinc inde negato, non solum viscera & pectus, sed scapulæ etiam incredibili extenderentur dolore, & spiritus magna ac miserabilis fieret angustia, tertio denique die, nihil conferentibus auxilijs, è vita migravit. Inciso autem eius cadauere, & viscera omnia vento plena conspeximus, & in sinistro cordis ventriculo obduratum callum inuenimus, qui nucis magnitudinem æquaret. Quare vt illum, hoc est, ventum mortis ipsius, ita hunc, scilicet callum, aduersæ hominis valetudinis causam fuisse arbitrati sumus.

ANNO TATIO.

TYMPANITI quoque & hic affectus similis apparet, de qua exemplorum nostrorum cap. XXXVIII. egimus.

Brachiū ab humero diductum.

C A P V T L X X I I.



OHAERERE interdum mēbra exulcerata vel protinus in vtero, aut etiam vstione consue-

sueuerunt. Nos autem puellam vidimus & curauimus, cuius totum brachium feruentissimæ aquæ effusione humero cohæserat. Cumque nemo ex prudentioribus Medicis inueniretur, qui puellam curare auderet (periculum enim erat, ne dum membra ipsa scalpello discernerentur, neruus incideretur, & sanguis immodicus proflueret) ego solus vt eram iuuenis hanc curam aggressus, paulatim cicatricem ipsam scalpello discindo, sanguinem suppressens, donec ad cubiti iuncturam, vbi neruus est, deuenio: tùm separatim vtrumque molliore emplastro circundo: & quoniam extendere brachium non poterat, iubeo vt grauiore pondere sumpto, manu id perferat, donec paulatim extendatur. Quod cùm ipsa diuturnioris temporis spatio obseruasset, ad pristinum tandem statum reuersum est brachiũ ipsum, sola gratia & munere illius, qui est benedictus in secula.

Cor pilis refertum.

CAPVT LXXXIII.

IACO.

ACOBVS latro è patibulo quo suspensus fuerat, veluti iã mortuus, sed qui tamen adhuc viueret, depositus atque curatus conualuit. Verum, vt erat homo ingenio malo prauoque, ad eadem statim scelera reuolutus, quibus antea extremũ promeruerat supplicium, iterum capitur atque suspenditur. Quare hominis admirati nequitiam, mortui cadauer incidendum curauimus: & inuentum est cor eius ob eximiam caliditatem vndique pilis refertum. Hoc idem inuentum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibetur integras acies pugnando in fugam vertisse. Est ergo non tantum scelesti ingenij signum, sed quandoque etiam raræ fortitudinis.

Ex stata febre vita sublata.

CAPVT LXXXIIII.

IOANNES architectus singulis annis stato die, hoc est, quo natus fuerat, febre implicabatur: quæ ex putrescente bile genita, suum circuitum seruans, quartum & decimũ
non

non transgrediebatur diem: donec senio confectus, & eadem ex more complicatus febris natali suo die vi morbi prostratus, naturæ concessit.

Multitudo vermium reiecta.

CAPVT LXXXV.



LAVRENTII Lanij filium vidimus, qui septimū agens annum, triduo ex nimia lumbricorum vi ferè mortuus iacuit, solo potu ex gramine, aceto & saccharo viuens. Quarto autem die cū medicamentum ex aloë, myrrha, & croco ei propinaretur, duodequingenta supra centum vermibus aluo depositis, statim conualuit.

ANNOTATIO.

MULTOS quoque vermes puellam quandam excreuisse Alexander Benedictus scribit: frequenter verò & hoc contingit. Nota & mihi mulier fuit supra quadraginta annos nata, quæ grauissimis ventriculi doloribus, & nausea subinde correpta, ab assumpta hiera picra, quadraginta (plus minus) vermes excreuit. Puerilis autē magna

magna ex parte hic affectus est: sed tamen & seniores à vermibus quandoque malè habent. Hippocrates aut quisquis auctor lib. de morbis IIII. Lumbricos non modò latos, sed & rotundos in pueris, ait, dum adhuc in vtero sunt, nasci, quia aliquando cum recens natorum excrementis visi sint excerni. Eosdem verò & alios parere ait, quod quidem & quandoque contingere obseruatum. Nam per medicamenta expulsi reperti aliquando nonnulli sunt alios in ventre habentes. Atque hinc fit vt post expurgatos, alij subinde iterum in intestinis renascantur: veluti mulieri contigit, de qua scripsimus, quæ singulis mensibus præseruationis causa hieram picram assumens, tamen aliquot semper vermes aut vermiculos excreuit. Præter verò rotundos lumbricos, non modò lati, de quibus mox, sed & alij quandoque generantur. Memini enim puellam IX. annorum ab assumpto vermes pellente medicamento non lumbricis, sed erucis similes vermes reiecis- se, aliquanto tamen breuiiores, multipedes, & quidem adhuc viuentes. Narrat & Cornelius Gemma de diuinis characterismis lib. I. cap. VI. varias vermium species, tum & alia per aluum excreta.

Recre-

Recrementa ex naturalibus deiecta.

CAPVT LXXXVI.

PVELLAM quoque vidimus, quæ clauso ani meatu nata, octauo quoque die recrementa ex naturalibus deieciebat. Cumque hoc implicita malo vsque ad sextum decimum annum vitam duxisset, vi tandem morbi, quod *σποφόν* Græci vocant (id autem fit cum intestina circa vmbilicum torquentur) miserabili cruciatu deiecta è medio sublata est.

Vermes cucurbitini eiekti.

CAPVT LXXXVII.

IN Auinionis balneis, quæ sunt in agro Senensi, mulierem vidimus quæ continuis septem diebus aqua epota, quàm plurimos tandem ex ijs, quos Medici propterea quòd Cucurbitæ semina imitantur, Cucurbitinos vocant, vermes eiecit. Qui ita inter se, (dum scilicet alter alteri mordicus inhæreret) iungebantur, vt cum sua ipsi serie quatuor cubitorum longitudinem

nem excederent, vnum tantum corpus, vnum duntaxat vermem putares.

ANNOTATIO.


VERMES Cucurbitini, lumbricorum latorum nomen apud Hippocratem & alios veteres acceperunt: Cucurbitini verò etiam dicuntur, quòd quædam ab hoc abrupta cum excrementis alui quandoque excernuntur, Cucurbitæ seminum similitudinem referentia. Latum autem Lumbricū permutationem esse pelliculæ intestina intrinsecus ambientis in corpus quoddam viuum, Aëtius sermone primo cap. XL. Tetra-bibli tertij scribit. Hippocrates verò lib. III. de morbis, connasci pueris in vtero materno asserit: augeri verò cum puero, ita vt æqualis fiat intestino. Quod quibusdam pubertatis tempore: alijs serius fit. Posteaquam autem intestino adæquatus est, quandoque etiam maiorem ac longiorem fieri, atque vnà cum stercore prodire; excidens veluti Cucurbitæ semen. Aduersus hunc si medicamentum datum fuerit, & homo sit præparatus, totus rotundus & in pilæ modum formatus exit: si verò ab assumpto medicamento adhuc hæreat, pars eius abruptitur longitudine duorum aut trium cubitorum. Posteaquam verò abruptus est, nullæ eius partes

MEDICINAL. OBSERVAT. 257

tes longè pòst cum stercore exeunt: Hęc Hippocrates. Vidi verò & curavi olim honestū virum ab huiusmodi verme malè habentem, qui quandoque ab assumpta potione purgante ex ano suo lati lumbrici vlnas duas aut tres extraxit, & pòst aliquanto tempore melius habere sibi videbatur. Pallidus autē hic erat, & cibum quandoque vehementer appetebat, alio tempore fastidiebat.

Frustulum carnis eiectum.

CAPVT LXXXVIII.

LLVD etiam memoria dignum videtur: Mulier præfocata cum ab omnibus pro mortua haberetur, & de eius potius funere quàm de vita cogitarent assistentes, paulatim quasi grauiori somno excitata, in molestissimam incidit tussim: qua cum diu agitata esset, durioris tandem carnis frustulum eiecit, & sanata est.

Sed & Iulianus Medicæ artis professus, dum grauiter ægrotaret, & aduenienti Medico dolorem, quo circa ventriculum miserabiliter cruciabatur, exponeret, tangente illo (vt fit) ac manibus locum pertractante, erupit

S in

in vomitum: quo & ipse frustum carnis ad parvæ pilæ magnitudinem, in quo vermis non secus ac brucus in filiqua recludebatur, eiectans, ad pristinam statim reuersus est valetudinem.

*Quæ inciso mortuo notatu
digna inuenta sunt.*


C A P V T LXXXIX.

NON videntur silentio esse prætereunda, quæ nuper in inciso Iacobi cuiusdam furis insignis cadauere annotauimus: bifurcatam scilicet venam, quæ à liene ad ventriculum atram defert bilem, tum & abscessum in sinistro cordis ventre pituita redundantem: postremò & posteriorem eius capitis partem, vbi memoriæ sedes est, adeò breuem, vt tantillam cerebri portiunculam contineret. Quam ob causam cum priorum scelerum, & eorum quæ pro his sæpè passus fuerat, tormenta scilicet, exilia, & carceres minimè recordaretur, toties ad vomitum tanquam canis impudens reuersus est, vt in laqueum tandem

MEDICINAL. OBSERVAT. 259
tandem inciderit, vitæque ac furti fi-
nem fecerit.

Vrina ex alienis locis emanans

CAPVT XC.

ONTRAHITVR etiam ex
matris utero circa naturalia
vitium, vt obstructio meatus,
ex quo fluere vrina solet. Vidimus
enim & nos puerum quendam atque
puellam nobilem hoc vitio laboran-
tes. Quorum alter, cum adeò meatus
ipse clausus obstructusque esset, vt
meiere inde non posset, ex angusto
admodum foramine, quod paulùm
infra glandem vrina ipsa vi sua effece-
rat, emingebat, sed non absque ingen-
ti ciulatu, & genitalis membri tumo-
re. Altera verò ex loco qui est infra pe-
ctinem paululum supra vuluam vrinã
reddebat, nullis interim apparentibus
signis atque indicijs, vnde ipsa natura-
liter efferri debuerit. Hanc autem nos
cum parentum rogatu curare tenta-
uerimus, & nullum huic malo idone-
um inueniretur præsidium, ita vt erat
incurata ad vltimũ vitæ suæ terminũ
permanfit.

S 2

ANNO-

ISTIS exemplis annumerari potest & illud, de quo cap. XXVIII. tùm & illud cuius Amatus Lusitanus, & nos in eiusdem cap. scholio meminimus.

*Ex noxa illata nervis vox
deperdita.*

CAPVT XCI.

RVSTICVS quidam cum decliviore capitis prora percussus recidisset, & alteram capitis ipsius partem oppositam ad terram, ut par fuit, elideret, surrexit quidem, sed mutus: id autem siue ex repercussione nervorum, qui regrediuntur ex pectore, siue ex defluente materia, quæ nervos illos opplèverit, tam incertum, quàm certissimum ex hoc communicatam noxam nervis ipsis, qui vocem effingunt. Nam & Galenus facilè Medicorum princeps in libro, quem de interioribus scribit, affirmat fuisse hominem, qui dum glandula illi abscinderetur in collo, & scalpellum nervos ipsos, quibus vox effingitur, incideret, ilicò factus est mutus.

A lum-

*A Lumbricis vexatus puer
quiescere non poterat.*

CAPVT XCII.

PVERVM vidimus & cura-
uimus, qui cum nullo modo
quiescere posset, sed ita sem-
per hinc inde temerario quodam im-
petu & inordinato motu ferreretur,
vt etiam stare volens iterum titubaret
& caderet, quæsitum est à Medicis,
quænam esset abdita causa huius ma-
li: quod illi distentionem cum saltu
putabant. Sed cum nullam prorsus ali-
am inuenirent quàm timorem, in quẽ
paucis antè diebus puer ipse, nescio
quam ob rem, incidisse dicebatur,
idoneis secundum hanc rationẽ me-
dicamentis puerum curare cœperunt:
quæ cum nihil omninò proficerent,
& in nostras tandem deuenisset ma-
nus, deprehensa statim morbi causa,
quam solos lumbricos esse persensi-
mus, vsque ad eò ad hoc malum pro-
pulsandum facilem & expeditum adi-
tum habuimus, vt hac sola intentio-

S 3

ne

ne curatus puer, ad pristinam breui reuersus fit valetudinem.

ANNOTATIO.

PVEROS præcipuè à Lumbricis infestari in annotatione cap. LXXXV. scriptum. Superueniunt verò & his quandoque ab ipsis vermibus etiam Conuulsiones & Comitiales accessiones, quæ tamen, eductis ac expurgatis vermibus, ac sopitis doloribus, ut plurimum cessant.

Mulier ex lapsu urinam continere non poterat.

CAPVT XCIII.



VENIT ad me mulier quædam, quæ urinam continere non poterat: cumq; aliquod à nobis præfidiū plurimis iam defatigatis Medicis exposceret, interrogo an aliquam huius mali causam teneat. Negante illa, iterum quæro cecideritne, ex quo forte ani sedes elisa fuerit. Cūque & ipsa fateretur olim se de ficu prolapsam, ultimam spinæ vertebam elisisse, nullo tamen inde sensibili percepto nocumento: & nos non fugeret oriri

oriri ex ea ipsa vertebra neruum, qui
constringendi vesicam vim habet, hu-
ius statim ægritudinis causam depre-
hendimus. Attrito enim ex eius lapsu
neruo ipso, consequens fuit, vt relaxa-
ta vesica vrinam continere non pos-
set: quod & sæpè aliàs ex eadem causa
accidisse cognouimus. Hoc igitur nos
malo idoneis eliso præsijs, mulierẽ
ipsam per Dei gratiam pristinæ sanita-
ti reddidimus.

Calculus in tunica fellis.

CAPVT XCIIII.



CESSIT his diebus
mulier nobilis Diamantes
nomine, dolore prostrata
calculi: sed cùm nullum
antè ex eo percepisset no-
cumentum, visum est Medicis mortuę
cadauer incidere: & reperti sunt lapi-
des quamplurimi, non quidem vllus
in vesica, vt putabatur, sed præter vnũ,
qui in tunica fellis coloris atrii & ma-
gnitudine castaneæ aridæ contineba-
tur, cæteri omnes in panniculo, quo
contegitur hepar, vnde etiam veluti

S 4

in

in folliculo dependuli sacculum effecerant. Hanc autem nos mortis causam rati, sapientis viri consilium esse duximus, nihil omninò de incertis & occultis morbis statuere.

ANNOTATIO.

IN folliculo fellis natos quoque calculos & nos obseruauimus: Solent autem isti subluteo colore pallere: nausea & cibi fastidio laborare: & diutinè aduersa valetudine frui. Colligi verò & in membrana iocinoris cap. tertio annotatum fuit.

*Ex præcedentibus torminibus
erosi villi, quibus vis re-
tinendi fulcitur.*

CAPVT XCV.

INTESTINORVM tormina, quod Græci *δυσεντερίαν* vocant, exulcerare intestina intus consueuerunt, indeque descendunt cruenta & muccosa excrementa: cumque id malum diutius inueterascit, aut hominem tollit, aut (quod forsitan deterius est) nunquam sanescit. Nam & nos Iulianum quendam nouimus, qui cùm post quadraginta dies, quibus

bus hoc morbo vexatus est, sublatis
iam doloribus ac deijciendi cupidita-
te, eius alius impendiò liquidior per-
mansisset, & sapius quàm par fuerat
ferreretur, nullis vnquam auxilijs cu-
rari potuit, quin semper quoad vixit,
& impetum ventris cohibere nequi-
ret, & vbicunque deijciendi cupiditas
hominem vrgeret, ibidem excremen-
ta deponeret, erosio scilicet ex præce-
dentibus torminibus atque consum-
ptis villis, quibus vis ipsa retinendi
fulcitur.

villi. qd vi
retinendi ful-
tur.

*Ex iisdem torminibus ero-
sa viscera.*

CAPVT XCVI.

VIDIMVS & alium natione
Aretinum, qui cum ijs item
torminibus diutius vexatus
fuiſſet, ex iisdem denique in erodentia
ipſorum inteſtinorum vlcera, tum in
tabem, poſtremo in mortem incidēs,
eroſa intus viscera oſtendebat: è qui-
bus dum ita affectus ſuperuixit, vt tri-
enniū non exceſſerit, continuo ſanies
effundebatur.

S s

Morbus

Morbus Comitialis.

CAPVT XCVII.

ETSI nouissimus inter ceteros morbos esse soleat qui Comitialis nominatur, ignotus tamen apud multos plerumque est, ut quem nuper in puella vidimus Aretina: quæ cum huiusmodi inuaderetur morbo, minimè (ut assolet) concidebat, minimeque ex eius ore ferebatur spuma. Sed stans caput tandem hinc inde, ac si quid inspicere vellet, tota cum ceruice mouebat, nihil interim loquens, nihil audiens, nihil sentiens. Cumque iterum ad se reuerteretur, interrogata quid egisset, penitus ignorabat. Causam autem perquirentibus nobis, cur puella, cum comitali afficeretur morbo, non concideret, visum est ex hoc contingere, quod contractio & tensio ad cerebrum non ferretur, cum solus vapor sursum ascenderet. Ex quo nullo rigore cerebrum ipsum intentum ab inordinatis motibus reliqua membra præseruare poterat. Quod autem puella ipsa hoc morbo


MEDICINAL. OBSERVAT. 267
bo laborasset, & Medici omnes quicunque eam viderant, affirmabant, & rei euentus facilè comprobauit: cùm prorumpentibus menstruis hoc malū euaserit. Nam vt quandoque in pueris Venus, ita in puellis menstruorum initium huiusmodi morbum tollere solet.

ANNOTATIO.

MEMINI & ego virginem XX. annorum me curare subinde conuulsam & manus clausas habentem, quæ non concidebat, sed toto accessionis tempore sedens permanebat. Cùm autem occasio ex utero esset, adhibitis idoneis remedijs, breui sanitatem recepit. Huius affectus non dissimilis videtur ei, quo Aretina puella laborauit. Ex utero autem laborantibus varia superueniunt symptomata, & sæpenumero hæc similia.

Elephantia.

CAPVT XCVIII.

ONGIS morbis annumeratur is quem *ελεφάντια* Græci vocant: qui in Italia penè nunquam visus à Medicis, vix dignoscitur. Peregrinū quendam vidimus, in grabatulo

batulo iacentem,, cuius summa corporis parte maculis quibusdā ad atrū colorem vergentibus inficiebatur, & cutis inæqualiter aspera crassaque, & veluti squamis foeda ac liuens, diuersis etiam locis mollis ac dura ostendebatur: quin & ossibus ipsis, vt videbatur, iam vitiatis, & vniuerso corpore macie ac tabe confecto, ita suræ ipsius os, pedes & manus intumuerant, vt vtriusque partis digitus sub tumore ipso conderentur. Quare cū ad hæc mala etiam febricula quædam adderetur, quæ hominem absumeret, vnius tantum mensis spatio è vita migravit ad Dominum. Parcat igitur Auicenna, qui Elephantiam pedum tumorem dixit: cū hæc non solum pedes, sed vniuersum corpus afficiat, & species lepræ sit, quæ apud nostros nondum visā: apud Paulum probè descripta notatur.

ANNOTATIO.

ELEPHANTIASIS Græcorum ab Elephantia Arabum multū differens est, vt nostrorum exemplorum cap. LII. annotatum. Temerè hic Auicenna carpitur, quòd

quòd Elephantiam tumorem dixerit pedū:
Nam Elephantiasin Græcanicam Auicenna,
& reliqui Arabes Lepræ nomine compre-
hendunt. Tumorem verò pedum Elephan-
tiam idcirco appellant, quòd pedes crassi
Elephantinos referre videantur.

*Ex calidiore materia caput
impetente furit ac mo-
ritur puella.*

CAPVT XCIX.

INSANIAE tria sunt genera, &
acutum quodlibet. Vnum cum in
accessione febris, aut in suo vigore de-
sipit æger, & aliena loquitur, sed tamē
levata febre statim resipit. Alterum,
quod Græci φρένησι vocant, cui semper
dementia comes est. Nam licet inter
morbi initia resipere interdum videat-
ur æger, eius tamen mens quibusdā
semper imaginibus agitur. Tertium
verò genus est lethale magis ac pesti-
ferum, cum scilicet æger ipse non so-
lūm perpetuò desipit, sed & quæcun-
que agit, impetu quodam & violento
motu operatur. In huius autem gene-
ris lethalem insaniam cum nobilissi-
mi

mi cuiusdam viri filia prolapsa malè ageretur, & nos ad eam intempesta nocte vocati accederemus, adeò furentem puellam inuenimus, vt dùm hinc inde sese violento quodam impetu iactaret, quicquid interim obuium habebat, dentibus arriperet, frangeret, laniaret. Ex quo proprios capillos, brachia & manus, & si quid præterea aliud arripere poterat, ita mordicus, nullo habito discrimine suumne an alienum esset, apprehendebat, vt nisi scissum ac prorsus laceratum ex eius dentibus eripi non posset, adeò vt vinciri puellam oportuerit, ne sibi aut alteri noceret. Verùm cùm paucis post horis furor illi remitti cœpisset, in somnum incidit grauiorem, quo (tametsi nostris præsijs, studio & diligentia ægrè cederet) vix tandem excusso, ab insania quoque puellam ipsam liberauimus. Sed vt est ingenium mulierum, præsertim nobilium, cùm sanitate adepta nihil eorum, quæ pro tuenda firmandaque valetudine iniuncta fuerant, obseruasset, & sua viueret libertate, post integrum mensem,


sem, quo pristina vſa eſt valetudine, in eundem incidit morbum : à quo cùm nullis vnquam auxilijs potuerit à Medicis liberari, vnus tantùm diei ſpatio è medio ſublata eſt. Si quis autem huius morbi cauſam quærat, nos quantũ coniectare licuit, materiam credimus fuiſſe calidiorẽ, ſed paucam tamen: quæ cùm caput peteret, ſuo & incendio & mobilitate puellam furentem redderet. Et quoniam caput ipſum frigidiorẽ materia oppletum fuerat, hãc quoque, cùm & ipſa, (vt creditur & par fuit) exagitata fuiſſet, priorẽ illa materia extincta ac reſoluta, ipſum denique profundiorẽ ſomnum puellæ feciſſe putamus.

ANNOTATIO.

DE Maniaco etiam quodam cap. X. in noſtris exemplis ſcriptum: qui aliquando in eundem affectum relapſus, tandẽ ex Hæmoptoico tabidus factus eſt.

Vermis è nare proiectus.

CAPVT C.



SOLET interdum acutus & peſtifer dolor in capite excitari, quem Græci κεφαλαλγίαν vocant,

cant, sed talem, quo caligent oculi, alienetur mens, citetur vomitus, suppressatur vox, frigescat corpus, & ipsa denique deficiat anima, rarum est videre. Nam & nos amicum habuimus Philippum nomine, qui cum his omnibus ageretur malis, & aduentante die septimo mors ipsa, nullis conferentibus auxilijs, iam iam adesse videretur, vi tandem robustioris naturæ vermem è dextra nare palmo longiorem eiecit: quo propulso, omnis statim cum eo amotus est languor.

ANNOTATIO.


VER MEM vehementis doloris capitis causam in cerebro natum fuisse satis apparuit. Nasci verò & illic quandoque vermem Auicenna etiam scribit, & Iacobus Hollerius nostra ætate visum affirmat. Idè & Italo scorpius ex frequenti Ocymi odoratu natum refert. Quibusdam, inquit, vermes generantur in cerebro. Id rarum esse scripsit Auicennas, quod tamen memoria nostra visum est. Et cuidam Italo ex frequēti odoratu basilicæ herbæ natus scorpius in cerebro, vehementes dolores & longos, ac mortem denique attulit. Lib. de morbis internis primo, cap. primo.

Gigni

Gigni verò & quandoque vermes in auribus, formam habentes nucleorum strobilôn nucum pinearum, Valesci Tharantani testimonio constat: tùm & Arnoldi Villanouani cap. 32. lib. 3. In dentibus verò & reperiri haud infrequens est. In ano autem nasci vermiculos, Ascaridas dictos, omnium scriptis proditum est.

Spasmo Cynico mortua mulier.

CAPVT CI.

VM imperitus quidam Medicus cuidam mulierculæ ex gena dextra tuberculum furunculo simile scalpello abscidisset, nulla habita ratione neruorum ac venularum, quibus illud, cùm semiouï magnitudinem expleret, alligabatur, ilicò subsequuta est inflammatio ac dolor, ex quo simul infelix mulier in eum incidit morbum, quem Græci *κυνικὸν σπασμὸν* vocant: quo dum misellæ illi temerario quodam motu peruertitur os, & facies modò in dexteriores, modò in sinisteriores partem distenditur, ac totum denique corpus pallore quodam suffunditur, adeò afflctatur mulier, vt cùm neque sangui-

T
nis

nis missione, neque alui ductu, neque vnctionibus vllis, neque alio quouis genere auxilij hoc malum inhiberi posset, infra paucos dies è vita migraverit: hoc nobis suo ipsius infortunio documentum relinquens, vt cùm scilicet oportuerit, non passim nos omnibus, qui sibi chirurgici nomen vsurpant, sed his tantum qui doctrina simul vsu & iudicio prævalent, credamus.

Gelatus.

CAPVT CII.

POST graues diuturnosq; labores, quibus per ingentia frigora turbido & pluuiæ cœlo, per flagrantissimos æstus diu noctuq; perequitans sese fatigarat Antonius Collensis, in difficiliorem tandem incidit ægritudinem: qua statim vt corripiebatur (quòd sæpè homini contingebat) amissâ ilicò memoria sensuque, eodem quo erat, dum ab ea inuaderetur, habitu perseuerabat, patientibus etiam & inconniuis oculis: si enim inter ambulandum contingebat hoc
illi

illi malum, ambulabat: si inter quies-
cendum, quiescebat: sin verò inter ali-
ud quoduis agendum, tantisper ipsum
agebat, nihil interim audiens, nihil
loquens, nihil cognoscens, donec ce-
dente morbo ad se regrederetur, &
tunc etiam nihil eorum, quæ egisset,
reminiscebatur. Ex Medicis autem qui
hominem viderint, alijs virtutem, quæ
discernit & vnit coniungitque, læsam
esse iudicantibus, eiusque noxam cæ-
teris ventriculis iunctum iri volenti-
bus, adeò vt memoria ex hoc & com-
munis sensus intrinsecus paterentur:
alijs aliter, & quidem argutius, & mor-
bum & causam explicare conantibus:
nos hominem gelatum dicebamus:
cùm huius morbi notæ, quæ per se sa-
tis eruditioribus eas vestigare volen-
tibus manifestæ sunt, eiusmodi dete-
gerent ægritudinem. Fit autem id ma-
lum ex nigriore bile postremum ven-
trem cerebri impetente, quæ statim
memoriam tollens, sua etiam siccita-
te cæteros ventres contrahit: quibus
clausis tollitur pariter sensus & mo-
tus, & quoniam frigidior est, hominẽ
T 2 gelat.

gelat. Quibus verò medicamentis ad hunc morbum profligandum vſi ſimus, propterea quòd eius cura notiſſima eſt, intexere ſuperfluum iudicauimus.

ANNOTATIO.

EXEMPLVM iſtud Catocholaborantis eſt:quem & Catalepsiſ appellant. De nonnullis verò & Catocho abſque febris detentis in Medicinalium obſervationum noſtrarum exemplis cap. V. & VI. ſcriptum eſt. Catocho quoque affectus fuit Hieronymus Benciſ, priuſquam in Comitialemlaberetur; de quo ſuperius cap. quadrageſimo ſexto.

Tenſio neruorum cervicis.

C A P V T C I I I.

GRAVIORIBVS morbis obnoxia ceruix eſt: ſed inter cæteros importunior acutiorque, qui rigore quodam neruorum erectã ægri ceruicem intendens, eum ſæpè vel intra quartum diem interimit. Quo morbo cum Parmenſis quidam Franciſcus nomine grauiter vrgeretur, & nos ad eum vocati, hominem robuſtioris naturæ, & qui turgentibus
venis

venis faciem etiam atque oculos rubi-
cundiores haberet, inspiceremus, san-
guinem statim ex ea vena, quam κεφα-
λικήν Græci vocant, mitti iubeo. Tùm
parciore victu, hoc est, sola aqua ex
melle hominem cibans, hircino atque
caprino oleo detonsum madefacio
caput: superque imposito pileo, aluū
etiam his medicamentis duco, quibus
à capite ipso ac cæteris superioribus
partibus diduci resoluique possit hu-
mor, qui huius mali causa fuerat: ex
quo ocius adfuit illi sanitas, quàm
mors adfutura putabatur.

ANNOTATIO.

RIGOR neruorum ceruicis, rectam
& immobilem eam reddens, τέτανος
Græcis dicitur, Conuulsionis species, per
quam, vt Galenus ait lib. de musculorum
motu, partes immotæ in contraria trahun-
tur à musculis oppositis. Cōuulsionis enim,
quæ absque motu fit, tres sunt species: ἐμ-
προσθόρονος, ad anteriora; veluti cūm men-
tum pectori annectitur: ὀπισθόρονος, si ad po-
steriora; vt dum caput ad scapulas pertrahi-
tur: τέτανος, cūm in neutram partem immo-
bilis ceruix intenditur. Acutus autem & ve-
hemens affectus est. Memini olim me cui-
dam

T 3

dam

dam adesse, cui cum maximo dolore ceruix rigida in nullam partem inflecti poterat. Huic primum fomentum adhibuimus: deinde aurea dicta catapotia dedimus, quæ summo cum labore deuorauit. Subsequente autem ex his larga purgatione, à dolore & nervorum rigore citò liberatus fuit.

*Ex abscessu gula homo penè
iugulatus.*

CAPVT CIIII.



LIVD quoque morbi genus circa fauces oriri consuevit, & id interdum pestiferum acutumque: quale in Alexandro Serralio nuper vidimus, cui neque rubor neque tumor ullus intus in gula, aut extrà ostendebatur, sed aridum corpus erat & squalidum. Cumque nihil omninò alimēti demitteret, sed quicquid absumeret statim reiectans vix spiritum traheret, & vox adeò faucibus hæreret, vt ne mutire quidem posset, iugulari prorsus hominem putares: nos tamen & vrgentis morbi & ægri virium ratione habita, vtile & præsentaneum remedium duximus, sanguinem

guinem mittere: tùm & cucurbitulis natibus affixis, deducere humorem conati, frictionibus simul alijsque præfidijs, quæcunque extrinsecus iuare hominem poterant, tantisper vtendum censuimus, donec ægri fauces detumescerent. Verùm vbi malū his omnibus auxilijs non modò cedere aut leuari, sed in horas vehementius ac contumacius fieri aduertimus, omni abiecta spe ægrum, tanquam proxima nocte moriturum, Deo & naturæ reliquimus. Hunc autem cū assistentes, veluti iam iam spiritum exhalaturum, signo Crucis ex more in auroram vñq; singulis momentis consignarent ac munirent, ecce statim à summis ægri faucibus tam ingens ex adaperto intus abscessu purulētæ materiæ vis effertur, vt homine penè iugulato, catinulum, in quo recepta est, ad summum replet labrum. Qua expulsa, statim resumptus est spiritus, & æger, qui iam pro mortuo lugebatur, veluti ab inferis remeans, paulatim conualescere cœpit, donec integram consequutus est sanitatem.

T

ANNO-

TONSILLARVM inflammationes quandoq; adeò magnæ sunt, vt gutture occluso (vtraque videlicet tonsilla affecta) nec cibus nec potus transmitti queat; vel non absque summa difficultate. Tumores verò & quandoq; ita augentur, præsertim ad sup-
purationem vergentibus inflammationibus, vt ore hiare nequeunte, dentes cohæreant: ac strangulationis periculum immineat. Abscessu verò rupto, copiosoque erumpente pure, solutio fit, & ore patulo, gutturis quoque meatus patet. Initio venæ sectio necessaria: deinde inflammatione ad suppurationē tendente, vtiliter eò facientia cataplasmata etiam foris gutturi applicantur, interim ab alijs remedijs non cessandum, quæ recta mendendi ratio postulat.

A vitio lienis curatus.

CAPVT CV.

LIENIS vitio afficiuntur quāplurimi: horum sinistra pars tumens ac durior prementi renititur. Quod si diu perseuerat (nam interdum perpetuum id malum est) tumescunt crura: & si vlcera præterea innascuntur: vix sanescunt. Multos
nos

nos tali vitio affectos curauimus: inter quos vnum, quem, cū septennio hoc morbo vexatus frustrā multa cōsilia, ac penē infinita præsidia expertus fuisset, solo tandem capparī, qui tali ægritudini aptissimus cibus est, solaq; vi aquæ, in qua faber ferrarius sæpè candens ferrum extinguit, annua portione liberauimus: tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc vitium inest vis atque virtus. Vnde & compertum est, animalia quæ apud fabros educantur, perquā exiguos habere lienes.

A morbo cæliaco curatus.

CAPVT CVI.



N ipsius ventriculi porta morbus innascitur, qui à Græcis κοιλιακός appellatur. Durescere sub hoc venter solet, & torminibus premi, aliudque ipsa adeò nihil reddere, vt ne spiritus quidem infrā, sed nec suprā erumpere possit. Paulus pater meus haud mediocris ingenij ac doctrinæ vir, hoc morbo malè vexatus, cū diu multa ac varia auxilia, sed frustrā, expertus fuisset, clystere ex so-

T S

lo


lo lacte condito in ventrem iniecto,
ac multis subinde strigmentis deposti-
tis, ad pristinam reuersus est sanita-
tem.

ANNOTATIO.

PAVLVVS Aegineta Coeliacum mor-
bum Lienteriæ ac fluxus ventris speci-
em facit. Apud Galenum verò lib. IX. de
compos. medic. secundum loca Dysenteria
similis esse apparet. Nam communia quæ-
dam & Dysentericis & Coeliacis illic reme-
dia extant. Sed Cornelius Celsus lib. IIII.
cap. XII. huiusmodi affectum *κοιλιακόν*
nominat: Græci, ni fallimur, *κολικόν* appel-
lant.

*Extenuioris intestini mor-
bo sanatus.*

CAPVT CVII.

N tenuiore intestino acutus
interdum & pestifer oritur
morbus, ex quo etiam supra
umbilicum intolerabiles excitantur
dolores, nec spiritus vllus transmitti-
tur: & non solum cibus ipse, sed ster-
cus ipsum plerumque per os redditur.
Vomitibus autem variis aut niger ex-
istens,

istens, grauioris etiam odoris est. Tali igitur morbo adeò Laurentius amantissimus frater affectus est, vt cum neque missio sanguinis, neque alui ductio, neque aliud quoduis idoneum auxilium hoc malum frangere posset, materia tandem ad neruos prolapsa, in morbum incidit comitiales. Quo breui & in mortis discrimen adductus, cum triduò hoc habitu iacuisset, nihil omninò degustans, à Medicis derelictus est. Verùm die quarta, vbi paululùm reuiuiscens vinum lambere cocepit, resumitur spiritus, & morbus paulatim vi naturæ propulsus, præsijs cedit, donec tandem per Dei gratiam penitus sublatus, hominem sanum reliquit: quod non prius tamē effecit, quàm exactis quatuor mensibus, à die quo primùm ille huiusce modi affectus est morbo.

A morbo vuluæ inedia liberata est mulier.

CAPVT CVIII.

VEXA-

VEXARI vuluæ morbis vt mulieribus commune, ita sanè inauditum sic vexari, vt patiens nulum cibi genus deuorare queat. In cœnobio montis Cœlij monialem vidimus, quæ cùm huiusmodi vuluæ morbo grauiter affligeretur, ita prorsus quacunque illi subministrassent escam fastidiebat, vt quodam veluti impetu æstuantis stomachi, eam statim vt acceperat, vomitione propelleret: quod nos ab irresolubili & crassiore vento, qui à vulua ipsa versus stomachum ferreretur, fieri putantes, multa pro re ac tempore adhibuimus auxilia: quæ cùm nihil omninò proficerent, & ad decimum ipsa iam diem sola panis buccella (quod mirum est) vitam traduxisset, vi tandem inediæ deuicto ac penitus profligato morbo, ad pristinam reuersa est mulier sanitatem.

Aqua inter cutem eliso utero propellitur.

CAPVT

CAPVT CIX.



ACCIDIT interdum casu
& fortuna sanari nonnul-
los, quos Medicina curare
non potest. Mulierem sci-
mus, quæ dum aqua inter
cutem adeò laboraret, vt nulla de sa-
lute eius superesset spes, nescio quo
spiritu impulsa, de eminente quodam
loco ad terram deuoluitur, & vtero
ad lapidem eliso dissectoque, ita pror-
sus omnis effusus est humor, vt quæ
puerum octimensem gestare videba-
tur, enixam crederes. Sed nec multò
pòst aut tempore aut labore idoneis
ad hanc rem adhibitis præsijs, peni-
tus sanata est mulier.

ANNOTATIO.

SIMILE huic accidit mulieri, quod
Asciticis, quibus dissecto abdomine
aqua emittitur, de quo Paulus Aegineta lib.
VI. cap. L.

Alapa mortuus.

CAPVT CX.

EXORTA inter duos iuuenes li-
te, cùm alter alterum extento bra-
chio

chio alapa percussisset, in morbum statim, quem ἀποπληξίαν Græci vocant, resolutus vapulans, paucis etiam horis strangulatus interiit. Quare convocatis Medicis (in vinculis enim detinebatur reus) quæsitum est de causa mortis ipsius. Verùm alijs in ictum ipsum, quo materiam commotam fuisse putarent: alijs in humidiores locum, quo diutius obdormierat: nonnullis etiam in lautiores victum & potum pleniores, quo dum vixit est usus, huiusmodi mali causam referentibus, indiscussum apud præsidem remansit iudicium. Nouimus item fulionem quendam nomine Petrum, qui vnico pugno stomacho cuiusdam iuuenis violentius impetito, hominem interemit.

Gemini pueri.

CAPVT CXI.



GEMINOS nasci nullus dubitat, sed ita nasci, vt indistincti sint, monstruosum. Mulier quædam Alexandra nomine, ex Mediolanensi agro Florentiam veniens, gemi-

MEDICINAL. OBSERVAT. 287

geminos mares quæstui spectandos dabat: quorum alter integer toto corpore, distinctisque membris erat: alter verò ita scapulis alterius iungebatur ventriculo, vt illo totum caput iniecisse videretur: cætero verò corpore ab eo seiunctus, nō secus illo de mamilla matris lac exugente mouebatur, ac si ipse pariter sugeret. Sed & sub id ferè tempus vidimus & alios geminos, qui ab humero ad plantam pedis coierant capite excepto, alter sinistro, dextro alter; vbi iungebantur, carebat brachio. Coxa, crus, & pes vnus ac communis erat. Altera tamen corporis parte integra seiunctaque distinguebantur.

ANNOTATIO.

MONSTRVOSOS nasci tametsi rarum sit: rarior tamen superfoetatio est, & adeò quidem rara, vt nonnullis impossibilis habeatur. cuius tamen manifestum in honesti ciuis vxore exemplum apparuit. Peperit hæc filium plenè gestatum anno M. D. LXX. Decemb. die VII. hora decima vespertina, succedentibus omnibus, quæ ad felicem partum requiri solent. Postridie

stridie verò qui erat octauus, eadem hora, præter expectationem obstetricis, ac sui ipsius, peperit eadem foetum alterum, sed nondum quadrimestrem, utpotè cui neque oculi, neque nares, neque os paterent, quem idcirco post conceptum fuisse satis manifestum. Superfoetationis exemplum habet & Bernardus Gordonius cap. II. particulæ VII.

ANTONII BENIVENII
de abditis morborum & sanationum
causis, Finit.

MEDICI.


289

MEDICIN
NALIVM OBSERVA
TIONVM EXEM-

pla rara,

EX LIBRIS DE CVRANDIS
morbis Valesci Tharantani Medici
clarissimi, qui scripsit
anno 1418.

*De dolore & torminibus in-
testinorum.*

NOVI iuuenem vi-
ginti annorū, qui
habuit torturā in-
testinorum, & in
tēpore æstatis post
labores itineris, tūc
vnus volens ipsum
curare, applicuit ipsi super ventrem
filices madefectos in aqua frigida, &
ligauit, & fecit quod staret, vel iaceret
super ventrem, & infra quartam vnus
horæ fuit curatus à tortura. Credo
hoc fuisse ex caloris naturalis ad intra
V reuo-

reuocatione consumentis ventositatem; vel ex alteratione malæ complexionis membri vel humoris ibi missi. Et istam experientiam videtur confirmare Auicennæ consilium, qui in causa calida iubet fieri emplastrum cum rebus frigidis, vt cum solatro, & pampinis vitium. & credo quod hoc iubet post vniuersalia, vel vbi est mala complexio calida cum paucitate materiæ ad alterandum. Lib. 4. cap. 28.

De vermibus aurium.

DI CO quod vermes etiam in aure aliquando generantur: & ego vidi expellere ab aure vnus iuuenis febrem habentis acutam duos aut tres vermes ad formam granorum pini; erant tamen grossiores; & sanatus fuit homo. Lib. 4. cap. 30.

De vrinae incontinentia ab exciso vesicæ calculo.

EGO vidi mulierem fere quinquaginta annorum, quæ vrinam retinere non poterat: imò sicut continuè vrina ad vesicam per poros vrinarios delega-

delegatur, sic etiam per collum eius
exterius emittebatur. Et hoc accidit
quia vnus indoctus chirurgus abstra-
xerat illi duos lapides à vesica inciden-
do in collo vesicæ. in qua incisione in-
cidit lacertum dictum collum vesicæ
constringentem: & erant illi lapides
ad albedinem accedentes: & quantitas
vnius erat sicut ouum columbi; alte-
rius autem sicut ouum carduelis. Lib.
5. cap. 18.

*De Vetula cui post causam ca-
norum capillorum & dentium,
renati sunt nigri capilli,
& noui dentes.*

DIGNVM est quod illa quæ in
Medicina rarò accidunt in volu-
minibus conscribantur. Retulit mihi
mulier in alijs miles, quod in quodam
monasterio, in loco qui dicitur Mo-
nuerus, fuit quædam Priorissa, cui per
multum tempus propter senectutem
defecerunt menstrua, & tempestiui
venerunt in vertice cani, & ferè om-
nes cecidere molares, vberum verò

V 2

paruum

paruum aut nullum apparebat vestigium, & rugæ in facie profundissimæ apparebāt. Factum est itaque, vt quicquid de capillis & pilis oriebatur & crescebat, totum nigrum pullulabat, & exhibant dentes & molares, sicut mos est in infantibus fieri; sic etiam oriebantur menstrua, ac, vt in iuenculis, abundanter fluebant. Mammillæ verò velut in virginibus eleuatæ fuerunt, montuosæ: rugæ euanuerunt, & facies pulchra intantum, quod illa honesta & religiosa monialis Priorissā verecundabatur; & vixit per multum tempus in religiosa vita. & hoc fuit quasi mysterium rarò contingens. lib. 6. cap. 12.

De muliere quæ post sexagesimum ætatis annum tres liberos peperit.

EGO vidi mulierem bonæ habitudinis, quæ post sexagesimum annum habens menstrua concepit, & peperit filium, & continenter habuit duos filios, & erat in sexagesimo septimo

mo

MEDICINAL. OBSERVAT. 293
mo anno quando habuit ultimum fi-
lium. Erat autem femina carnosa, &
musculosa, & fortis. Ibidem.

*De Mola ventosa sine infla-
tione uteri.*


EGO tempore pueritię meę, dum
addiscerem artes liberales Vlissi-
ponę, vidi quod quędam Iudęa cre-
didit se pręgnantem, cui fuerunt prę-
parata omnia quę sunt necessaria, &
dum obstetrices matricem tractarēt,
tanta ventositas sine ullo alio liquore
exiuit à matrice, quod fuit mirum: &
hoc per totam ciuitatem Vlissiponę
& per totum studium fuit deuulga-
tum. Lib. 6. cap. 15.

V. 3 MEDICI-

MEDICINALIVM OB,
SERVATIONVM RARA EX-
empla ex Libris Alexandri Bene-
dicti qui vixit anno

1483.

De Cerebri concussione.



VI ex trabis percussione obmutuerat, suadentibus viribus sanguinem ex manu detraximus intrepidè, imposito ex hedera cum rosaceo emplastro bregmati. sine vino carneque, contentus ptisana & intrita panis, sine villo potu (nam aquam nolebat) & quoniam senex viribus valebat, eo victu ad decimum quintum diem, sermone carentem decrepitum, prospere duximus: sequenti die loqui coepit, paucisque sequentibus diebus, ex toto ex periculosa cerebri conquassatione præter omnium opinionem persanatus est.

Huius exempli fidem faciunt Hadrienses ciues, quoniam hic senex inter

MEDICINAL. OBSERVAT. 295
ter primarios horum habebatur. De
curandis morbis lib. 1. cap. 5.

De Catocho ex vermibus.

CVM Cydone essemus in Corne-
lia domo, puella quæ octauum
nondum compleuerat annum, in fe-
bri ardentissima, somno primum, de-
inde intentis oculis Catocho correpta
est. diebus septem nihil hauriendo,
præter ius pulli, in quo Portulaca de-
cocta fuerat. Iacuit hæc pallida, muta,
sine sensu & motu, grauitè respirans.
In hac suprema filiaë desperatione, ma-
ter ex melle glandem in aluum subdi-
dit, qua sine sordibus duos & quadra-
ginta vermes in globi modum extu-
lit, & statim ad vitam filia redijt. Ex
his ventris animalibus caliginosi va-
pores cerebri omnes sensus compre-
henderunt. Lib. 1. cap. 26.

*Vulneratis sanguinis profusio-
nem quandoque prodesse.*

VIDIMVS vulneratos post san-
guinis copiosum profluvium, si-
ne contractionis metu, paucis diebus

V 4

libe-

liberatos. In castris quendam Chirur-
gum vidimus, nobilem iuuenem in
humero vulneratum, curantem; cui
linceolos protinus vulnere admoue-
rant amici contra sanguinis profluui-
um; linceolos statim amouisse, nescio
quid in vulnere perquirentem, dum
amicos de profusione larga sanguinis
conquærentes frustaretur; sanguinem
pro ægri viribus citra animæ defectum
fluere permisit, haud ignarus, quomo-
do ægrotantem tutum à spasmo red-
didit, quem octauo circiter die per cu-
biculum ambulantem vidimus. Lib.
1. cap. 47.

*De senenonagenario vulne-
re frontis à cæcitate
liberato.*

OMNES senectute visu hebetio-
res fiunt: aliqui ad octogesimum
annum sine specillis, vt Laurentio pa-
tri meo contigit, clara oculorum acie
vitam duxêre. Vidimus senem visu
hebetiorem nonagenarium Hadriæ
super frontem vulneratum, cæcitate
&

MEDICINAL. OBSERVAT. 297
& vulnere pariter liberatum. Lib. 2.
cap. 1.

Venæ in naribus sectio mortis causa extitit.

NO STRA ætate Venetijs tonfor quidam cum in narib⁹ pilos incommodos forcipe conscinderet, venulam incautè secuit, tantoque impetu sanguis erupit, vt sistendi modum Medici plurimi non adinuenerint: & ille miserè vitam finiuit. Lib. 4. cap. 4.

De virgine quæ aliquot mensibus à cibo abstinuit.

QUIDAM non appetunt, quia membra non resoluuntur: Sicuti in quadam, ætate nostra, virgine sacerdotali, quæ in ediam (pudet referre) pluribus mensibus sustinebat. In miraculum Romæ Patribus venerat, unde experimentum pluribus custodientibus dedit Columba nomine.

Quidam etiam Venetijs 46. diebus continuis ieiunus fuit, habitudine membrorum frigida, crasso phlegmate intus concocto, meatibusque corporis

V

s

poris

poris adstrictis. Lib. XI. cap. XI.

*Fætores interfectorum canum
pestilentia luem cessasse.*

EXEMPLVM vnum non præter-
mittam ætate nostra memoran-
dum, quod ratione Physica confirma-
tur. Quidam mercator Cretensis no-
bilis nobis narrauit, cum in Taurica
regione negociaretur, & sæuissima pe-
stis orta esset aëris vitio, quo finis mo-
riendi non erat, in ea summa hominū
strage à se Medicum visum loci eius in-
colam, nam Sarmatæ ea loca tenent,
qui canes omnes interemptos passim
per vias perque vicos omnes abijci
iussit, qui distenti & putridi tetro odo-
re coelum impleuerunt: quo remedio
statim ciuitas sanitati restituta est: &
Sarmatas id remedium facitare soli-
tos, putrescentes enim canes aëris na-
turam immutant, quæ hominibus
duntaxat exitialis erat. Ita enim dissi-
militudo facit & rerum discordia, nā
venenum veneno interdum debella-
tur, quod etiam Zoar quidam inter
posteriores Physicos affirmat. Lib. de
peste cap. 6.

ANNO

ANNOTATIO DODONÆI.

FOETOREM ac foetida pestilentis
aëris contagio aduersari nonnulli & alij
sentiunt, qui multò vtilius esse rentur, a sam
foetidam, castorium, vel aliud foetens pesti-
lentiæ tempore naribus frequenter admo-
uere, quàm suauè odorata, vel pilas illas cum
moscho & ambra formatas, quas plerique
veluti singulares assiduè in manibus gestant.
Nam odoratis animales spiritus aiunt allici,
patientioresq; odoratus organi meatus red-
di, atque idcirco ad recipiendum infectum
aërem promptiores: E contra à foetidis &
graucolentibus spiritus repelli.

De ossium abscessu.

IN homine ossa, vt facilè videri po-
test, circiter 248. connumerantur;
ea corrumpi nouum non est. Sed ab-
scessus innasci mirum est, vt nuper vi-
dimus, dum mulierem quandam Gal-
lico morbo interemptam rescare-
mus: causam morbi perquirendo, ossa
sub membranis suis tumentia, & ad
medullam vsque suppurata inueni-
mus; ea duntaxat ratione, quoniam &
ipsa nutriuntur, abscessibus ob id affi-
ciun-

ciuntur. Histor. human. corp. lib. 1.
cap. 6.

De Cornu è vulnere nato.

VIDIMVS in Creta dum hæc
conderemus, vulnerato genu sa-
gitta, cornu nigrum rupicaprae capitis
simillimum prodijisse, materiamque,
quæ in ossis substantiam conuerti de-
buiisset, in corneam naturam aëris af-
flatu facile conuersam, continueque
gummi modo indurescentem. Lib. 1.
cap. 14.

*De virgine quæ acum assump-
tam per vesicam reddidit.*

PVTANT nonnulli virginem æ-
tate nostra Venerijs, quæ crinalem
acum quatuor digitorum longitudi-
ne, quam inter dentes dormitura con-
tinebat, incauteque per somnum de-
glutiuit, per vrinam post menses decem
demisisse maximis cruciatibus. Lib. 2.
cap. 9. De eadem.

Quidam qui inter magnos Medi-
cos habitus est, fungi frustum per vesi-
cam emissum se vidisse prædicabat, sed
acus

acus illius exemplum per vrinam redditæ plurimos dissectionis ignaros cōmouet, qui eam per venas Mesenteriacas à stomacho ad iecur, per venam maiorem ad renum angustias, inde ad vesicam penetrasse falsò arbitrantur, ora fibrarum in viuētibz patentiora esse ad acum & frustrum fungi suscipiendum putantes. Acus enim acie sua paulatim multoque tempore intestina penetrauit, viam enim sibi facit, quo à natura propellitur, & ad vesicam qua parte carnosā est, inde per vrinam reddita. Lib. 5. cap. 13.

De viro lactāte suum puerum.

M• Maripetrus sacri ordinis equestris tradidit, Syrum quendā cui filius infans mortua coniuge supererat, vbera sæpius admouisse, vt famem filij vagientis frustraret, continuatoque suctu lacte manasse papillam, quo exinde nutritus est magno totius vrbis miraculo. Idem Aristoteles de lacte in maribus, verum tamen, inquit, per suctum frequentiore vel multū prodisse aliquibus traditū est. Lib. 3. cap. 4.

De

*De virgine quæ lac habuit
in uberibus.*

VIDIMVS mulierem, quæ etiam cum virgo esset, quoniam infœcunda erat menses substituerant, lacte semper diffuisse. Ibidem.

*De cruento pure per urinam
in pleuritide reddito.*

IN pleuritico morbo cruentum pus per urinæ meatum dare quandoque solet. Quod Helio Basso Cymbriaci nostri filio contigit in maxima morbi desperatione, vel per aluum aliquando, ut ipsi vidimus. hoc magis mirum est, quàm quod acies scalpelli fracta dum venam imprudens veniseca cui-dam incautè incideret, meatus diuerfos penetrauerit, postque aurem constituerit, ubi continuis ferè puncti-
bus percipiebatur, qua molestia liberari sæpè à nobis quæsiuit. Lib. 3. cap. 9.

Sagitta

*Sagitta ferrum dorso impactis
post biennium per infer-
na descendit.*

RVSTICVS in quodam seditio-
so tumultu sagitta circa dorsum
impacta vulneratus fuit: euulsa sagitta
ferrum intus in thorace relictum est.
vulnus, frustra perquisito ferro, Medi-
cus persanauit, quod post biennium
per inferna extulit, id miraculi gratia
barbatæ figuræ duum digitorum lati-
tudinis ostentabat. Secundum enim
diaphragma prius mucrone penetra-
uit, ubi pars carnosior est, deinde se-
cundum intestina delapsum iuxta al-
uum sensim podicem secuit, viamque
sibi ad exitum fecit semiexesum, de
qua rem magna Medicorum concerta-
tio fuit. Ibidem.

*De strangulatis propter rem
quampiam in asperam ar-
teriam delapsam.*

GVTTVRI epiglottis sub ipsis
faucibus quoddam operculum
linguæ

linguæ postremæ annexum, accommodauit, ne quid cibi potusnè in alienum delabatur iter, quoniam, si quid inciderit, spirandi meatus intercluduntur. sicut Anacreonti Poëtæ accidit, qui vux passæ acino necatus est. Sicut & Fabius prætor in lacte pilo hausto strangulatus est. & si ætate nostra Venetijs dum hæc conderemus anno à salute vniuersali 1483. Lucretiæ perquàm familiari nostræ simile contigerit, ea cum nucem ponticam dente frangeret, oborto risu, nux in spiritus meatum protinus respirando deuoluta est, moribunda statim concidit, in eo ancipiti strangulatu, ad interiores pulmonis partes impacta est, tùm minus affligi cœpit, vnde nihilominus spiritus grauior, sonantiorq; obfesso meatu audiebatur: tùm vitæ spem habere cœperunt, quoniam cōfractis quibusdam venulis, vomica in pectore exorta est, quæ tandem persanata, obfessis meatibus reciprocantis animæ raucus sonus etiamnum percipitur. Lib.3. cap.18.

Teli

*Teli pars post XXV. annos
sternutatione reiecta.*

QUIDAM Græcus Suirus nomine mihi notissimus Chalcidis in expugnatione tempore sagitta vulneratus, ductus inter captiuos à Turcis, perſanato quoquo modo vulnere, annis XX. vitam duxit ſeruilem. Tandem liber Cydonem venit, poſtque quintum annum, dum aqua per æſtatem frigida os collueret, concitatis ſupra modum ſternutamentis, magno pruritu inter maximos conatus proſilit è naribus ſagittę fruſtum digiti medi longitudine, ferrea acie, nec aliam vulneris notam reliquit. Dum id Medicis Venetis inter mira naturæ refero, aliquibus non credentibus, alijs inter contentiones, vt fit, viam indagantibus: Ecce ex improuiſo Suirus Græcus noſter, qui fortè tùm Venetias venerat, rebus dubijs accitus, imò fide carentibus, ſagitta demonſtrata, quã miraculi gratia ferebat, teſtimonium veriſſimum dedit, qui cum antea per annos X. in urbem non veniſſet, pro
X. discu-

discutienda veritate casu oblatus non
credentibus, fidem attulit. Lib. 4.
cap. 24.

*Matthia Cornacis Philosophi
& Medici Romanorum Regis
Physici Historia gestationis in
utero fœtus mortui per annos
plus quatuor: qui tandem opera
& consilio Medicorum, ex ute-
ro ita per alium, Deo adiuuan-
te, exectus est, & membratim
exemptus, ut mater viua per-
manens, integræ restitueretur
sanitati: atq; post biennium
denuò conciperet, ut se-
cunda testatur hi-
storia.*

ANNO Domini M. D. XLV.
quædam conciuis Viennensis,
nomine Margaretha, filia Vvolfgangi
Karlin-

Karlinger ciuis Viennensis : vxor verò Georgij Vvolczer, hospitis eo tempore ad ædes Rubri cancri appellatas Viennæ: postquam antea etiam enixa esset aliquot liberos, cōcepit anno ætatis suæ XXV. omnia denique habuit signa felicitis imprægnationis. Foetum insuper temporis progressu sensit, ante festum D. Bartholomæi eodem anno valentem, & strenuè sese mouentem, vsq; ad festum D. Luciae sacrum. Quo sanè illi tempore superuenerunt partus dolores, adeò vehementes, vt antea experta iam sæpius ipsa, iamiam se crederet enixuram. Statim igitur aduocari iussit matrem, & vnam ex suis sororibus: acciri etiam obstetricem confestim præcepit. Quæ cum aduenisset, statim re animaduersa, iussit omnia ad manus esse parturienti necessaria, hæc verba adiiciens: Statim, Deo volente, puellum natum habebimus. & quemadmodum postea euentus comprobauit, vera vates extitit. Interea prægnans in sedem parturientium confedit: & cum instanter admodum à circumstantibus mulieribus

admoneretur, vrgeretur etiam ab obstetrice, omnibus nisibus elaborauit ad pariendum: in quibus heu nimium vehementibus conatibus, fragor quidam increpuit satis sonorus: quique non temerè argueret, magnam vim vel foetui, vel matri illatam fuisse, vel certè conquaſſatum infantis caput in partes disceſſiſſe. Ab eo fragore, viuacitas foetus deprehendi amplius nullis argumentis potuit. Grauida inde maiorem in modum coepit ægrotare: ac propterea in lectulum suum reducta & reposita est. interim lac accurrens, quod parturientibus vsu venit, vbertim vbera repleuit, adeò vt stillatim etiam è papillis gliscentibus colostræ deflueret, spectantibus multis, & ijs honestis ac prudentibus mulieribus, quæ dies noctesque assistentes præstolabantur felicem partum. Dum verò res ita protraheretur, semperque maior difficultas, minor verò spes elucesceret, deliberatum est ab omnibus, quæ tùm præstò erant, & itum in eam sententiam, vt plures obstetrices accerſerentur in rem præsentem, aliquod
fortè

fortè salubrius allaturæ consilium. Sed ex harum etiam aduentu nil miseræ adminiculi accessit: neque quicquā ab his in medium dici potuit, vel consuli salutare, præterquam quòd vna ex ijs iudicatum habebat (& fortassè non malè) rem nimis festinatam fuisse, os sacrum nondum satis hiasse. nihil itaque etiam tùm effectum datum est. Gestansque vterum mulier tandem per multas septimanas grauissimè decubuit, ventris tumore, duricie, fluxu qui superuenerat, doloribus nihil remittentibus: quæ omnia, continuæ denique corporis graues afflictiones, animi percussiones, ad summam desperationem miseram videbantur cōpellere: effeceruntque, vt ad tentanda omnia omnium consilia animum aduerteret, ad vsurpandas omnium medelas, doctorum & indoctorum, Christianorum & Iudæorum. Quæ tamen nequicquam adhibitæ, auxilij nihil, plurimum mœroris & desperationis (cum res difficilis ad impossibilitatem videretur vergere) attulere. Hisce periculorum & ærumnarum acervis cir-

cum uenta, atroci insuper ventris ac inuitabili onere summè implicita mulier, per quadriennium, vsque ad annum Domini M. D. XLIX. semiuiua perdurauit. Sed quod prætereundū hoc loco non est, propter has enumeratas à nobis difficiles calamitates, missella insuper adflicta est defluxu continuè putrilaginoso, qui per locum muliebrem perrumpens, totum hoc quadrienne tempus durauit: ita tamen, ut aliquando parcius, aliquando copiosius profluens, dispari ratione mulierem affligeret, cessaret tamen nunquam. Cruciatus igitur hisce ac grauedinibus diu perstantibus, tandem natura (quæ semper Indiuiduum conseruare contendit) a core & copia putridi humoris non cuicta, sed compulsa (utpote cui inferna humoris subductio non sufficeret) ad umbilicum, matricem ipsam, totum denique abdomen, multis alioquin partibus munitum perfodit. Foramen igitur factum est primò anno Domini M. D. XLVIII. in loco prædicto, ex quo multum saniosi foetidique mucoris pro-

profluxit. Successu deinde temporis, post aliquot menses, adhibitis externis emplastrorum adminiculis, apertio coaluit: posteaquam (vt videtur) colluies humorum nocuorū abundè excreta esset, vel aliquantis per necessitate euacuationis diminuta. Sed, quod efflictim obseruandum est, paulò post anno Domini M.D.XLIX. mense Iunio, cum scilicet multa putrida superfluitas omni conatu mox per naturam expellenda, iterum collecta esset, natura denuò eodem consilio & via, proximo in loco, non ita procul à priore apertione distante, per ventrem iterum perrupit, & affatim eduxit necessariò euacuandam purulentiam. In hoc foraminulo exhibebatur omnium conspectui & tactui, os quoddam, quod euentus postea (resecta aluo & matrice) comprobauit, infantis fibulam sinistri brachij fuisse. Durauit iterum hæc apertio, eodem statu & effluxu, cum magna feminæ in vtero habentis virium prostratione, ad menses aliquot. Cum autem periculi magnitudo, dolorum foetoris-

que intolerantia indies magis ac magis ingrauescerent, viderenturq; omnia ad interitum spectare: ipsaque miserrima præ cruciatibus immensis, animi crebris deliquis iamiam crederet sibi exitum imminere, denuò iniit consilium asciscendi Medicos: si fortasse ex singulari Dei misericordia, felix horula salubris consilij elucesceret: si denique fortè fortunà, Deo ita disponente, in hora cōtingeret, quod non contigisset in annis. Vocati igitur sunt Chirurghi tres: Aulæ regiæ Chirurgus, Sixtus Vvirt: Paulus Dirleuung, vrbis Viennensis ordinarius Chirurgus: & Petrus Vvinckler. qui cum aduenissent, rem omnem intuiti, atrox periculum præ oculis esse animaduenterunt: simulque moderatè omnes vnanimis responderunt, Maius esse negocium hoc, quàm vt ipsi quippiam certi in hoc casu statuere vel debeant, vel possint: accersendos esse Medicinæ aliquot doctores, quorum consilia meritò accedere debent: & si quid in re tam ardua faciendū superesset, sibi consultum videri, vt id
ex

ex eorum matura deliberatione profiscatur. Acciti igitur sunt doctores duo, Ioannes Enzianer, & Matthias Cornax: alter vix senex, & reuerà miles (vt dicitur) emeritus: hic publicus Medicinæ in Viennensi Gymnasio ordinarius professor. Qui cum venissent, aliquoties post crebram inspectionē, ægræ virium explorationem, circumstantiarum diligentem inquisitionē, nihil aliud videbant superesse consilij, quàm vt ad sententiam Hippocr. extremis morbis extrema adhiberentur remedia, quantumuis periculosa. Decretum itaque ab ijs est, de aluo aperienda. A chirurgis etiam in eandem itum sententiam. quod cum certò cōstitutum esset: etiam feminæ, eiusque marito & propinquis, Medicorum consultum indicatum est. à quibus omnibus assensum. Stata tandem dies est, decima mensis Nouemb. anni M. D. XLIX. hora duodecima pomeridiana. Christi igitur Domini auspicijs, cum tempus statum aduenisset, rebus ritè auxiliaribus denique paratis, & dispositis præsidijs, si quid for-

X 5 tè

tè grauius contingeret, præsentibus Doctoribus nominatis, & chirurgis, sectio cum summa diligentia peracta est. Linea autem sectionis, ex mea designatione ducta est, ab apertione ea inchoata (quæ paulò supra umbilicū à natura, ut diximus, facta erat in latere dextro) recta deorsum per tractum musculi recti, abdomini incumbentis, longitudine plus minus octo uncias: hoc est, semipedis antiqui & duorum pollicum. qua facta incisione, propter necessitatem & intolerabilem foetorem, subito contentum in utero, à chirurgis undique liberatum est, & exemptus frustillatim foetus masculus emortuus, & semiputridus. Sequutus est hanc extractionem foetor incredibilis: adeò enim putredo inualuerat, ut bona pars membrorum pueri consumpta appareret: caput verò totum confractum, & ossa cranei dispersa extraherentur: cerebri verò videretur nihil, nimirum quod totum putredine diuturna consumptum esset.

Absoluta hac sectione, ex summa
Dei

Dei Opt. Max. misericordia feliciter:
mulier debita ratione, infarctis laceris
& rugosis vteri cavitatibus, ligata &
curata est: illique de rebus necessarijs
quàm optimè prospectum à Medicis
& Chirurgis. In omni autem ista ad-
ministracione, misella quæ rescebatur,
nullum est passa animi deliqui-
um: sed forti & sedato animo omnia
pertulit: adeò vt Deus & Natura ipsa,
in conseruanda hac inopi & ignobili
femina contendisse videantur. Succes-
su deinde temporis, cum omnia ex
singulari Dei nutu feliciter procede-
rent, sine vlla sutura, rugis (detumes-
cente ventre ob exinanitum vterum)
coëuntibus, postliminio venter ab
onere putrido liberatus per optimè
coaluit, & femina præter omnem ex-
pectationem curata est, & vterus ipse
vnà cum abdomine & eius partibus
planè consolidatus: quinetiam ita ma-
trice probè restituta, menses bono or-
dine & modo rediere: vt spem etiam
aliquam conceperimus, membro
quantumuis sensibili & spermatico
ita persanato, mulierem denuò con-
ceptu.

cepturam, & fortassè foetus edituram. Quod tamen postremum, vt valdè ex multis rationibus est ambiguum, ita incertum Diuinæ Omnipotentiae relinquimus determinandum.

Historia secunda: quod eadem femina denuò conceperit, & gestauerit foetum viuum, perfectum, masculum, ad legitimũ pariendi tempus: quodque ex posthabita sectione, mater vnà cum puello interierit.

POSTEA QVAM supernè à nobis descripta Margaretha ex sanctiss. opificis Dei voluntate conualuisset, conuixisset denique sana marito annum plus minus integrũ, satis frugaliter, denuò concepit, & gestauit puerum beneualentem, & ritè succrescentem vsque ad secundum diem mensis Iunij, Anno Domini M. D. LI. quod erat legitimum tempus pariendi.

endi. Ea dies cum manè illuxisset, & belle se haberent omnia, infans robustus strenuè palpitauit, & elaborauit ad egressum vteri: mater mœsta omnibus neruis ad expellendum fœtum incubuit, præsentibus multis mulieribus: sed incassum omnes conatus cefere. quapropter vocatus est Paulus Dirleuuang Chirurgus Viennensis, qui antea illam secauerat, vt in medium consuleret. ille verò præ oculis cernens graue discrimen, consuluit me etiam esse vocandum. Adueniens itaque & ego, cum perlustrassem ventrem enitentis, vidissemq; fœtum validum: matrem autem omnibus viribus, quæ ad certamen enitendi requirebantur, destitutam: cicatricem præterea veterem quasi per rimam longā hiscere, omninoque impossibile esse vt conatus feminæ tam lacero vtero, incis per longum musculus & abdomine, tanti esse possent, qui in vtero contentum quantumuis viribus præstans, & sese adiutans, per os sacrum possent expellere: suasi cuestigiò, ventrem ferro, vt prius, ressecandum esse.

Firma-

Firmauit meam opinionem & hoc, quod rimula sectionis pristinae laxata, pellucens madebat, & per se discessionem parietum cicatricis minitabatur. Hisce perurgentibus rationibus, nos vterque compulsi, & commemoratione prioris felicitis euentus animati, sectionem iterum instituendam censuimus, acquiescebat consilijs nostris: alioquin moritura puerpera. Verum enimuerò mater eius, & reliquæ aliquot præsentes feminae assentiri nullo pacto voluerunt. interim ego ordinatis quibusdam præsidijs confortantibus, consolatus afflictam discessi: & paulò post reuersus, acriter institi iterum peragenda caesura. Sed perperam tum obtinuit matris affectus, quæ cū cæteris feminis in ea perseuerabat sententia, vt Deo omnia committerentur, reiecta periculosa sectione: quæ tum etiam satis tempestiuè adhiberi posset, cum extremum anhelitum mater spiraret. Expectatum igitur vsq; ad horam decimam noctis. eo tempore infelix, cum frustrà diu & strenuè luctata esset, viribus omnibus exhaustis,

stis, cruciatibus oppressa animam exhalavit. Quod cum factum esset, subito chirurgus prædictus vocatus est, & citissimè ventrem aperuit: statimque infantem perfectum, masculum, omnibus numeris absolutum exemit. Ibi videre erat (superueneram enim & ego) certamen adnitentium puello vitam, quæ paulò antè abierat, reuocare, & sufflando omnia tentare spiracula, sed perperam & frustrà omnia fiebant. In promptu causa est cruditis & Anatomix peritis: siquidem in confesso est, vitam & motum cordis in infante à duabus arterijs vitalibus matris per umbilicum foetus, ceu per insertionem insertis dependere, quæ vasa natura fabricauit pro cordis refrigeratione. Quare cum arteriarum motus in matre cesset, earundem etiam motum euestigiò in infante cessare necessum est: siquidem fieri minimè potest, vt puer ante præcisionem umbilici, in ipso denique utero inuolutus tunicis, spiritum per os attrahat. Præterea, esto quod continuatio umbilici foetus à matrice sit libera, ruptis cotyledonibus

bus partus tempore: tamen nihilominus umbilicus secundinæ adhæret, necessariò ab obstetrice præcidendus: vel etiam si à secundina in vtero existente puello umbilicus solutus esset, tamen respirare per os non posset infans, panniculis inuolutus: vteri præterea parietibus inclusus, mucoribus denique & aquositatibus circumfusus: quæ certè res sæpè solutos infantes, hærentes tamen diutius in angustis faucibus ossis sacri, enecat suffocando.

Cùm ex prædictis itaque necessarium sit, vita & motu arteriarum in puerpera cessante, cessare etiam infantis in vtero contenti vitam & motum: impossibile est, tam immediatè excindi infantem posse, in eo ictu temporis, quo anima ex matre migrat: quæ si semel euolauerit, certè reuocari humanis præsidijs nullo modo potest. Si autem fortè fortunà exemptio infantis contigerit in agone puerperæ, aut in animi deliquijs, præsentibus adhuc spiritibus vitalibus: tùm censemus omninò superuiuere infantem posse, quemad-

MEDICINAL. OBSERVAT. 321
quemadmodum sine dubio de Iulio
Cæsare contigit.

*Historia memorabilis de mu-
liere, quæ annis tredecim in
utero gestavit sceletum fœtus
mortui, quod tactu cum ab ipsa
matre, tum ab omnibus illi præ-
sentibus percipitur, scripta ad
Matthiam Cornacem ab
Ægidio Hertogio
Medico.*

CATHARINA quædam, vxor
Michaëlis de Menne, viri ruralis
& pauperis, annis duodecim vtere ge-
rit fœtum mortuum, vel potius scele-
tum fœtus emortui, res penitus mon-
struosa, ac miraculo digna dici potest.
Ita tamen se res habet, sic vt ipso tactu
vnicuique fuerit manifestissima. Mu-
lieris enim ventrem inferiorem pro-
prijs manibus attrectavi, non bis ter-
uè, sed pluries. idem quoque mecum
Y egere

egere cùm viri, tùm mulieres illustrissimæ, non sine omnium admiratione maxima: quos omnes honoris gratia præterimus. At vel vnius viri hac in re testimonium oculare sufficere poterit, puta excellentiss. D. Henrici Cornelij Mathisij, qui quondam CAROLO eius nominis Quinto Augusto Medicus fuit domesticus. Hic, inquam, cum stantem & supinè decumbentem dictam mulierem crebrius attrectasset, omniaque ossa foetus mortui ipso tactu optimè deprehendisset, præ stupore nimio, tùm admiratione summa dicebat: Deo & Naturæ nihil impossibile.

Anno igitur Domini M. D. XLIX. eadem Catharina, posteaquam antea enixa esset duos liberos, concepit mēse Martio, omnia signa habens felicitis imprægnationis: foetum insuper temporis progressu à quarto mense conceptus sensit valentem, & strenuè se mouentem, vsque ad festum Diuo Andreæ sacrum, eodem anno: quo sanè illi superuenère dolores partus adeò vehementes, vt iamiam crederet
se

se enixuram. Vterus quoque mirum
 in modum prominebat, vberaque la-
 cte copiosissimo turgebant: idq; ma-
 gis instante iam partu, quàm multis
 diebus antea. At cum ad parturiendū
 nulla amplius mora expectaretur ac-
 cidit vt vetula quædam malefica &
 præstigiatrix ventrem huic vtero ge-
 renti attigerit, in aures susurrarit, & in
 faciem sufflarit, aliaque peregerit: quæ
 quoniam parum ad rem nostram fa-
 cere existimo, pluribus nō persequor:
 illius tamen meminisse placuit. nam
 in vetulam mulier culpam omnem
 reijcere videtur, quod illi res tam infe-
 liciter successerit. Vt autem parturi-
 entium dolores cū in ventre inferi-
 ore, tū in lumbis sensit, statim acci-
 ri obstetricem & mulieres vicinas iu-
 bet, quæ dies noctesque aliquot partū
 præstolabantur; nullum tamen partus
 breui futuri signum obseruat obste-
 trix, præter illos dolores qui toto bi-
 duo increbescebant. Quare discedit,
 reuersura, si ita res postularit. Quid
 multis? Dolores nihil interim remit-
 tuntur, sed diebus totis quadraginta

Y 2

& diu

& diu & noctu illam sæuissimè affligere non desinunt, vt totum id temporis misella ista in somnis egerit. Ab vtero quippiam interea effluxisse, nunquam animaduersum fuit. Fœtus vehementissimè semper mouebatur ac calcitrabat, ita vt manifestè illius motus ab adstantibus obseruari posset: toto isto dolorum tempore, sudoribus quoque copiosissimis madebat. Lac præterea è mammillis vberius fluebat: quod quia acrius, tùm plus iusto biliosum erat, omnes ferè partes vicinæ, quas defluens attigit, exulcerabantur. Quadragesimo demum secundo & quarto dolorum die, fœtus tam validè amplius moueri destitit. Dictu profectò mirum, quod tanto tempore subsistere potuerit incolumis. tandem conatu vehementissimo ita fœtus mouebatur, vt inde transuersim in vtero reuolutum mater narraret. Dolores ab illo impetu fœtus multò mitiores euasere, & paulò pòst planè recesserunt. Pòst verò diebus quatuor vel sex, cruenta quædam ac nigra per aluum deijcere coepit, illis similia (vt illa

illa inquit) excrementis, quæ pueruli iam in lucem editi primum excernere solent, cuiusmodi excrementum egebat diebus singulis ad sex libras. Cūque antea nullus in vtero collisionis ossium sensus voluntarius perciperetur: hic tandem putans misella se ab omnibus ærumnis liberam, vnicuique tangenti vterum sese prodere cœpit: ut etiam illam non lateat ossium fœtus mortui situs, quippe cū digito monstret, hic caput, illic costas: hic humeros, illic femora contineri. Quod ego & alij complures, me monitore, deprehenderunt. Cadaver istud seu sceletum in vtero matris iacet transuersim, capite & cruribus introrsum, dorso verò extrorsum prominente. Sub ilio dextro caput reconditur: quod cum profundius quàm matris spinam dorsi respiciat, non sine ratione tactus nostri iudicium refugit. ibi tamen ossis humeri, caput superius contineri, manifestò constat. Sub ilio sinistro sunt crura & pedes: sed introrsum reflexi, ut attingi minimè possint. Coniectura tamen artifi-

ciali & anatomica ita esse: iudicare nō est difficile: tūm ex situ reliquo corporis, tūm quia ibi os femoris apertissime deprehendatur. In medio ventre dorsum euidentissime cognoscitur, vertebræque omnes facillimè distinguuntur: costæ quoque maiori ex parte, tam superiores quàm inferiores dinumerantur. turget venter maternus tumore oblongo, qui in pudendum desinit: eleuat totam istam molem sursum, eandemque pro animi arbitrio deprimat, non sine assistentium summa admiratione. ossa verò sic satis induruisse sentiuntur, ita vt validiori compressioni difficulter cedere videantur. Venter maternus interea dum attractatur, nullo dolore angitur: nisi id plus quàm par est, fiat diutius. Valet sic satis illa mulier, omniaque sua munia tam domi quàm in agris vnà cum marito suo optimè peragit: hilaris est, prudens mater familias, & vtcunque faceta, annum nunc temporis agens quadragesimum quintum. Corpore gracili, nec habitu illaudabili. Menses cum annis quatuor essent detenti, potiuncu-

tiunculis nonnullis illos promouentibus vsa, rursus manare cœperunt in hunc vsque diem. At mensibus singulis, dum eorum terminus instat, venter inferior intumescit, illamque dolores inuadunt vehementissimi: haud aliter quàm si nunc nunc esset enixura: nec antea cessant, ni menses omninò eruperint. Quod si mulierem aliquo morbo laborare contingat, iisdem planè doloribus ad integrum morbi terminum corripitur. Aliud præterea notatu dignum refert, quintum nunc esse annum ex quo natura quodammodo istius sceleti expulsiōnem tentarit. Vteri enim osculum hiasse, & inde aliquot ossicula fuisse egressa. qua de causa euestigiò accersitur obstetrix. at cum satis imperita, vel potius rei nouitate perculsa, nullum remedium ferre se posse indicaret, omni ope humana hanc multis modis longè infelicissimam destituens, recessit. Ipsa verò interim nihilo minus intrepido fortique animo, ossicula illa vt in proprium locū retrocederent, proprijs manibus alla-

Y 4

bora-

borauit, sic vt in pristinum redierint. Ab isto verò, vti nec antea, huiusmodi quid sinistri illi accidit. Mirum denique, quantopere rustica illi flagitet, summisq; precibus contendat, vt abdomen ei manu medica aperiatur, scelerumq; ab vtero eximatur. Sic enim seipsam sanitati pristinae restitui posse, confidit optimè. At quo minus id tentatum hætenus sit, adhuc sub iudice lis est.

*Historia altera de gestatione
fætus mortui ab Achille P.*

Gassaro Medico ad D.

*Matthiam Cor-
nacem missa.*

NON absimilis tuæ Viennensis illius Historiæ, ante annos plus minus viginti sex, apud nos quoque contigit, in comitatu Feldkirchiensi: qui immediatè Serenissimo nostro D. Regi attinet. Nam muliercula quædã, cui à mariti familia Pflegerin cognomen erat, quæque in pago Gettzig sub arce

arce Montis fortis tùm habitabat, verè imprægnata ad decimum vsq; mensem, satis incolumis pro sua conditione sibi visa est. Ac instante tandem partus tempore, iusti dolores, necnon humorum excretiones consuetæ, præsentibus & agnatis & obstetrice, nulla abortus suspicione innata, per aliquot horas illam debito exagitarunt modo. Cum autem incassum diutius laborare videretur, astantes vicinæ ad fortius enitendum subinde illam adhortatæ sunt: imò pro sua ruditate, tàm incessanter ægram ad cogendum accelerandumque partum impulerunt, ac miseram mulierculam ad eiusmodi animi deliquia, tamque crebras syncopes sua ista importunitate adegerunt: vt non solum fœtus inscijs illis suffocatus sit, sed & mater etiam euidenter de vita periclitaretur. idque defectu Medicorum omnium, in tertium, aut fortè plures vsque dies factitatum est: donec commiserantibus cunctis, ægra illa soli Naturæ & Diuinæ clementiæ, tanquam omninò desperata, relinqueretur: ac veluti omni

Y 5

momen-


momento moribunda, offulis ac gallinarum iusculis per intervalla refocillata solum sit. Et sic misera illa per reliquum puerperij spacium utcunq; curata, paulatim dolores remittere, menstruorum tamen fluxum perseverare sensit: & quæ est Omnipotentis ineffabilis bonitas, nullius Medicinæ beneficio post aliquot septimanas, indies magis ac magis, habere melius cœpit: donec & muliebri profluuium cessarit, & dolores magna ex parte evanuerint quoque: adeò vt illa domesticis negotijs iterum qualicunque valetudine præesse sategerit: ac decrescente insuper nonnihil vteri mole, cuncta sibi prospera ad integrum ferè annum repromiserit. Quo tamen nō plenè euoluto, tumor quidam particularum in sinistra inferioris ventris parte, paulò supra inguina apparere de nouo cœpit. quī dum quotidie augeri, & demum etiam dolorem apostemosum cum cutis liuore superinducere pergeret: ibi mulier illa de fœtu nihil amplius sollicita, chirurgi auxilium

xilium inuocauit primùm. Is fuit magister Nicolaus Clæsi, ciuis Feldkirchensis, suæ artis peritissimus: qui sæpissimè quoque strenuissimi quondam militis Marci Psittaci ab Emsis castra, tam in Vngariam quàm Italiam, non infeliciter sequutus est. Is, inquam, vigentibus tùm accidentibus, quæ generationem puris concomitari solent, tùm ingenti necessitate, abscessum illum iam ad humani capitis magnitudinem excrescentem, omninò detumefacta aluo, decussatim nouacula, vt in fungorum apertione vsus obtinet, discidit: quo facto, tanta foetidissimæ virulentiae copia effluxisse fertur, vt præsentium nullus, ne dum ægrota mulier, aut ipsemet chirurgus facile sufferre potuerit. Nihilominus tamen vlcus illud sordissimum, præfatus chirurgus mundificare & abstergere pro more non destitit: quousque intra pauculos dies semiputrida quoque ac corrosa ossicula, vnà cum pure exire cœperunt. Quæ cum is, remittentibus indies tùm dolore tùm fœtore,

tore, vndénam in ventrem, concauitatem nimirum exossem, peruenissent, stupidus miraretur: en tandem erumpentibus integris tibiæ ossibus, posterioribusque caluariæ fragmentis, manifestè deprehendit, ea ipsa reliquias esse foetus illius, quem mulier ea ante annum peperisse debebat. Vnde vehementiore admiratione captus, decoctiones, loturas, & vnguenta qua potuit solertia, pro vlceris profundissimi mundificatione exiccationeque semper adhibuit, donec illud, femina nihil vltra conquerente, per sese ad consolidationem properare animaduertit. Ibi cicatrificationi, quam vocant, inuigilans, mulierem eam omninò persanauit. Quæ posthac plures superstes fuit annos, ac redeuntibus in ordinem naturalem mensstruis purgationibus, ni fallor, feliciter postea quoque viuum adhuc enixa puerum est. Hæc, Marthia doctissime, non relatione tantum aliorum recito: sed prænominatam mulierculam viuam & valentem, vnà cum particulis ossiculo-

MEDICINAL. OBSERVAT. 333

culorum priorum illius infantis sui
coram vidi, & allocutus sum. Facta-
que super prædicto negotio sufficien-
ti inquisitione, non modò quæ iam ab
alijs fide dignis hominibus percepe-
ram, credere didici: verum etiam ve-
rissima esse, oculari demonstratione
asserere possum. Nec dubito quin tota
ea regio, si opus sit, testimonium
abundè narrationi huic
perhibitura
sit.



ME

T

RE

Phyilogices
M E D I C I N A E
P A R T I S,
Tabulæ expeditæ:

P E R
REMBERTVM DO-
donæum Medicum
Cæsareum


Olim conscriptæ, nunc verò
primum editæ.

C O L O N I A E.

M. D. LXXXI.

REVERENDISSIMO
AC AMPLISSIMO DOMINO
D. LAMBERTO GRVTERO
Episcopo Neapolitano in
Austria, Ecclesiastæ
Cæsareo,

Remb. Dodonæus Medicus S. D. P.

 NNI sunt (plus minus) triginta
Reuerendissime Præsul, quod in
gratiam nonnullorum Medicinæ
studiosorum, tabulas quasdam
conscriberem, quibus Physiologi-
ce Medicinæ pars proponitur. has multo tempore
neglectim habitas, quum inter veteres meas sche-
das, unâ cum aliquot libris huc Mechlinia ad-
nectas reperirem, & obiter reuoluerem, studiosis
haud ingratum me facturum existimari, si luce
frui & in publicum has dari permitterem. Quod
quidem eo facilius annuimus, quòd in his descri-
bendis alia instituta sit methodus, quàm ab alijs
hactenus observata. Vera est sententia: Nihil di-
ctum quod prius quoque non dictum sit: neque in
his tabulis alia adferuntur, quam prius tradita,
ut ab alijs explicata, Hippocratis & Galeni do-
ctrinæ consentanea. Sed refert, quo ordine quid
dicatur aut scribatur. Placuit multis Ioannij
ut Arabum doctrinæ ratio. Nobis potior est visa
Platoni ac Aristoteli probata. Arabes Medici-
nam

nam in duas partes diuidunt, Theoricen videlicet
 & Practicen. Sub Theoriceres comprehendunt
 (præter & alias) ab ipsis Naturales appellatas,
 hoc est, ad hominis naturam facientes. Galenus
 verò, ac eius sequaces, Medicinam in quinque
 partes diducunt, quarum vna & prior Physiolo-
 gia est, quæ de hominis agit natura. De qua qui
 secundum methodum differere laborat; quid ho-
 mo: quibus partibus constet: quales ad agendum
 facultates obtineat, & si quæ sunt alia eiusmodi,
 prosequi & explicare opus habet. Requirit ipsa
 proposita materia longam aliquam commentatio-
 nem: nec desunt auctores qui prolixè de his scrip-
 serunt. Galenus quidem multis libris de his scri-
 bite; ut, de elementis, de temperamentis, de admi-
 nistrationibus Anatomicis, de naturalibus facul-
 tatibus: tum & in Commentarijs quos in com-
 plures Hippocratis libros edidit, ac alijs suis ope-
 ribus sparsim multa, de his quæ ad Physiologiam
 faciunt memorie prodita reliquit. Posteriores in
 libros aliquot contrahere, à Galeno latinus ac fusi-
 us scripta tentarunt, ac recto quodam ordine di-
 gerere. Inter quos Ioannes Fernellius vir doctis-
 simus, facile primas tenet, qui in sua Medicina,
 Physiologiam, & quacunque ad eam pertinent
 diligentissimè prosequutus est. Quæ verò cum
 hic, tum & alij aliquot voluminibus docuerunt,
 vel Galenus plurimis scriptis prodidit. Id omne
 aliquot tabellis studiosis proponere olim studui-

Z

mus.

mus. Non quidem, ut aliorum doctorum virorum
prolixiora scripta à manibus abicerentur, sed po-
tius ut studiosi promptiores & magis idonei red-
derentur, ad lectionem librorum Galeni, tum &
aliorum, qui de Physiologia scripta reliquere.
Quod has tabulas præstare posse speravimus. Uti-
le siquidem frequenter, breuem & summariam
cognitionem prius habuisse, eius quod postea plu-
ribus verbis tractatum, prolixiore sermone expli-
catum, reuoluendum ac cognoscendum est. Bre-
uis siquidem & summaria notitia hoc præstat,
ut eadem res latius descripta, fusiusque proposita
melius intelligatur. Atque hac quidem una est
tabularum non contemnenda utilitas. præter hæc
verò & aliam commoditatem eadem conferunt,
quòd videlicet prius lecta, & multa oratione co-
gnita, aut audita, paucis verbis in memoriam
reuocent. Sic duplici nomine tabule utilitatem
studiosis conferunt: iùm quòd studiosos præpa-
rent, ad aliorum longiora scripta rectè percipi-
enda: cùm quòd ad prius auditorum aut lecto-
rum memoriam & recordationem, non parum
faciant. Has autem tabellas, rudes fortassis, ac
minus politas, R. D. T. offerimus ac dedicamus,
certò nobis promittentes non minore affectu reci-
piendas, & à vitiligatorum morsibus defenden-
das, quàm me olim isthic coram agentem, summo
fauore, ac singulari amicitia prosequuta ac
complexa est. Cuius cum perpetua nec un-
quam

P R Æ F A T I O. 338

*quam penes me inter moritura memoria resideat,
has tabellas mittendas existimamus, futu-
ras apud R. D. T. mei μνημόσυον. Bene
vale, his Ianuarij Calendis. Anno*

M. D. LXXXI.

Colonia.

(.·.)

Z 2 TABVLA

T A B V L A I.

De προλεγόμενοις siue præfatis.

PHYSIOLOGICES MEDICINÆ parte per tabulas explicatione instituta præfanda quædam videntur: videlicet,

1. *Quid Medicina sit.*
2. *Quæ aut qualia huius principia.*
3. *Quot partibus constat.*
4. *Quod ipsius subiectum.*
5. *Quis finis Medicinæ.*
6. *Quæ ac qualia ipsius instrumenta.*

I. Quid Medicina.

Prima
Medicinæ
definitio.

Medicina autem definiente Hippocrate, πρόσθεσις ἐστὶ καὶ ἀφαίρεσις, hoc est, additio siue adiectio & ablatio. Adiectio quidem deficientis: Ablatio autem redundantis, & in humano corpore superantis.

	}	alimentum administratur:
		virium, calorisque naturalis robur augetur, amissa aliqua facultas vel qualitas reuocatur.
Adiicitur autem, ut cum	}	vulnus aut vlcus curatur.
		membrum luxatum, vitiatum, aut fractum ad suum locum & naturalem situm reducitur.

Aufer-

Mala qualitas remouetur:

Aufertur ve-
rò, vt cum

venæ corporis
& concepta-
cula inaniun-
tur, idq;, aut

venæ sectio.
ne ac san-
guinis de-
tractione,
purgatione,
sudore, aut
alijs mo-
dis,
Inedia & ab-
stinencia.

Superflua, quæ præter natu-
ram alicui parti accesser-
unt, tolluntur.

A recentiorum nonnullis & his verbis
Medicina definitur.

Medicina est ars, qua humani corporis
sanitas integra seruetur, aut amissa restitui-
tur. vel sic:

Altera
Medicine
definitio,

Medicina est scientia conseruatrice sani-
tatis, & morborum repultrix. Sed hæc defini-
tiones, cum à fine ipsius artis petantur, im-
perfectionem obtinent, veluti & omnes, quæ
à fine constituuntur, vt Galenus ad Thrafi-
bulum ait. Quamobrem rectius videtur, hoc
modo definita:

Medicina est ars, ad humani corporis
sanitatem tuendam, & profligandos morbos
comparata.

Tertia
Medicine
definitio.

Herophilus hanc medicinæ definitionem
adfert.

Z 3 Iatpixa

Quarta *Ἱατρικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη ὑγιεινῶν καὶ νοσούντων*
 Medicine *καὶ ὁυδευερῶν*, id est. Medicina est scientia salu-
 definitio. brium, insalubrium, & neutrorum. Hanc
 Galenus habet, in initio artis medicinalis.

2. De Medicinæ principijs.

Veluti aliarum artium principia siue in-
 uentionis instrumenta sunt experientia, &
 ex ratione iudicium: Galeno teste: ita & me-
 dicæ artis, hæc duo quoque principia sunt,
 nempe:

*Experientia, &
 Ratio.*

Experientia ex obseruationibus, ex vsu
 quotidiano, & subinde ex his quæ casu ali-
 quo offeruntur, remedia inuenire docet, ac
 ostendit.

Ratio viam siue methodum common-
 strat, qua ab experientia inuentis vti conue-
 niens sit. Inuenit & ipsa subinde quædam,
 sed quorum experientia iudex esse debet.
 Sola etenim per se absque experientia nihil
 solidi aut certi potest: sicuti nec multum ex-
 perientia absque ratione præstat. Neque
 enim hæc inuenire omnia potest, nec sola
 ratio.

De sectis Medicorum.

Quandoquidem autem duo hæc princi-
 pia, non omnes olim medici necessaria exi-
 stimarunt, vnicū sufficere volentes: & non-
 nulli

nulli quidem experientiam tantummodo commendarunt: alij solam ex ratione quadam methodum, factum est, ut in sectas medici fuerint diuisi, & præcipuè in tres: ut in

Εμπειρικὴν Empiricam

μεθοδικὴν Methodicam

λογικὴν siue δογματικὴν Rationalē.

Empirice usu atque experientijs artem cōstituit, & quæcunque simul acciderunt symptomata diligenter considerat, quam συνδρομὴν & concursum appellant. Huius primus auctor extitit Serapion quidam, qui cognitionem naturæ, rationalemque disciplinam nihil ad medicinam facere professus, in usu atq; experimentis eam constituit.

Methodice, experientia tanquam incerta, & parum sibi constante spreta: cognitio neque loci affecti vel causæ neglecta: virium etiam ægrotantis nulla consideratione habita: κοινότητοis, id est, communitatibus quibusdam adhæret, affectus omnes, ad adstrictum, vel fluens, vel horum medium refert. Huius princeps proditur fuisse Themison Laodiceus, qui ab Asclepiade institutus, ad Methodicæ sectæ inuentionem se contulit.

Rationalis rationem experientiæ adiungit: de natura rerum disputat: morborum & symptomatum causas per signa inquirit; communes curandi indicationes, cū usu, tū ratione iuuentas probat: & ad hæc

Z 4 aëris,

aëris, locorum, alimenti, consuetudinis, & similia rationem habet. Princeps huius Hippocrates est. Refertur hæc ad Aesculapium inuentorem, qui Græcis ἀσκληπιὸς. Ab hoc omnes rationales Medici Asclepiadæ dicuntur.

3. Quot partes Medicinæ.

Cum rationalis medici officium sit, hominis ac singularum partium naturam cognoscere: causarum & morborum genera per signa inquirere: sanitatem non modò lapsam restituere, verùm & præsentem conseruare, quinque in vniuersum Medicinæ partes existant, consequens est: vt,

1. *Physiologicæ* φυσιολογικὴ
2. *Æthiologicæ* αἰθιολογικὴ
3. *Semioticæ* σημειοτικὴ
4. *Hygienæ* ὑγιεινὴ
5. *Therapeutica* θεραπευτικὴ

1. *Physiologicæ*, id est, rerum naturæ contemplatio. De qua præsentis institutæ sunt tabulæ.

2. *Æthiologicæ*, quæ & παθολογία, morborum & symptomatum præter naturam incidentium, genera, species, differentias, ac causas profert.

3. *Semioticæ*, siue signorum observatio, præsentia cognoscit, præterita ad memoriâ reuocat; ac de futuris prædicit.

4. *Hi-*

4. *Hygiene* bonam valetudinem tuetur ac
conseruat: imminetia pericula arceat.

διατητική quæ
idoneâ vi-
ctus ratio-
nem adhi-
bere docet:
atque hac
morbos præ-
fligare.

5. *Therapeutice* morbos sa-
lutariū remediōrū vsu pro-
pulsat: & sanitatem reduce-
re studet, varia auxilia sug-
gerit, quibus toti corpori,
tūm & cuique laboranti par-
ti succurritur, præcipua pars,
quæ sola à veterum nonnul-
lis *Ιατρική*: hoc est: Medici-
næ nomen meruit. Huius
partes sunt

φαρμακευτική,
quæ medi-
camenta ad
morborum
curationes
adhibet.

Χειρουργική
quæ manu
ac instru-
mentis sa-
nitatē par-
tium pro-
curat.

4. Quod Medicinæ subiectum.

Subiectum siue materia subiecta, circa
quod hæc ars versatur, humanū est corpus,
non morbus aut vulnera. Vt enim dum ex
rudi ære statuam aliquam artifex effingit,
hæc ipsa artis opus est; æs verò materia subie-

Z 5

cta.

Sta. Ita dum medicus, ægrum corpus curat, sanitatemque conseruare aut reducere laborat, sanitas quidem finis est; sed subiectum corpus humanum.

5. Quis Medicinæ finis.

Medicina finis sanitas est. Nihil enim agit medicus, nihil considerat quod non ad vnicam referat sanitatem, vt videlicet vel præsentem tueatur, vel amissam restituat. Et finis quidem propriè, vbi eam assequitur: scop⁹ verò tantū, si vel morbi magnitudine, vel viriū defectu impedit⁹ eā nō assequatur.

6. Quæ instrumenta Medicinæ.

Instrumentis Medicina tribus præcipuè utitur: vt,

A *Viētus ratione:*

B *Medicamentis:*

C *Manuali operatione.*

A *Viētus* autem ratio non modò in cibi aut potus administratione consistit, sed & eorum recto vsu, quæ causæ perpetuò alterantes à Galeno artis Medicæ cap. LXXXV. dicuntur; à recentioribus verò Res nō naturales appellantur. quæ sex sunt:

1. *Ær ambiens:*

2. *Motus aut quies:*

3. *Somnus & vigilia:*

4. *Quæ assumuntur vt cibus, potus etc.*

5. *Quæ excernuntur aut retinentur:*

6. *Animæ affectus.*

B. Me-

Simpli- cia pe- tuntur velà	Stirpibus, harumq;	floribus.
		fructibus, aut se- mine.
	Animan- tibus vt	folijs.
		corticibus aut li- gno.
B. Medicamenta quedam.	Terræ fossilibus quorum multiplex quoque genus.	radicibus.
		succis.
	Generalia toti cor- pori cō- munia: vt,	aquatilib.
		volucris.
Com- posita quorū nō vnū est ge- nus. quædā enim	Particularia locis suis ac quibus- dam cor- poris par- tibus ad- dicta: vt,	quadrupedi- bus
		serpentib.
	Antidota Electaria Hieræ Pilulæ siue cata- potia Trochisci siue pastilli & quæ- dam alia. Emplastra vnguenta, & si- milialia.	ho- rūq; par- tib.
		Collyria Errhina Aphlegmatismi Gargarismi Eclegmata, & id genus alia

C *Manualis* operatio siue χειρουργία, manu utitur, à qua nomen accepit, & instrumentis ac machinis quibusdam.

T A B V L A I I.

De Physiologia.

Physiologice siue naturæ contemplatio, pars est Medicinæ humani corporis integræ (quantum quidem possibile est, aut Medico necessarium) naturam docens. hoc est: Quæ integræ substantiam hominis, cuiusmodi sit, simplex scilicet ne an multiformis; quibus partibus constet; & quæ & toti ac singulis partibus sua ratione facultates, cum ad agendum, tum ad patiendum insunt, perquirat. Talis siquidem est vera de natura disputatio, ut Socrates apud Platonem in Phædro docet. Quæ videlicet qualis sit rei substantia; & quæ toti ac singulis partibus facultates adsunt, ostendit. quibus & eorum, quæ perpetuò ac propriè accidunt cognitio, haud abs re consequitur. Proinde in hac Medicinæ parte consideranda ac cognoscenda præcipuè occurrunt quatuor:

1. *Quid homo:*
2. *Quot, & quæ eius partes:* quas Tabula tertia ostendit, & sequentes:
3. *Quales ad agendum, & patiendum,* cum uniuersum corpus, tum singulæ partes facultates habeant. sub quibus & actiones

nes continentur. De his autem Tabula
oſtaua.

4. *Quæ homini* accidentia propria, ei perpe-
tuò adiuncta. de quibus Tabula nona.

I. Quid homo.

Homo animal eſt rationale, conſtans ex
anima rationali ac corpore.

Animæ autem rationalis tres ſunt partes.

λογιſτικὴ ſiue rationatrix } De his lati-
θυμοειδὴς Irascibilis } us, Tabula
ἐπιθυμητικὴ concupiſcibilis } oſtaua.

Corpus humanum ex elementis inter ſe
confuſis ac commixtis conſtat. Hæc autem
genere duplicia. quædam animantium natu-
ræ propria alia communia.

<i>Animantium</i> naturæ propria ſunt.	{	Genitale ſemen, opi-
		ficis rationem ob- tinens.
	{	Sanguis, ceu materia apta concinnaque opifici ad quiduis ſequax.

<i>Communia</i> nō modò animā- tibus, ſed & ſtirpibus adeo que omnibus quæ naſcuntur ac interūt, ſunt	{	Ignis	{	Calidum	
		Aër		ſiue vt Hipp & Ga	Frigidū
		Aqua		lenus loquū	Humidū
		Terra		tur.	Siccum.

De

De Temperamentis.

Ex elementorum autem mixtura nascuntur quæ temperamenta dicuntur. Temperamentum autem proportio ac harmonia quædam in mixtione est, quatuor primarum ac principum qualitatum. Sunt autem huius genera,

A *Temperatum unum.*

B *Intemperata* verò complura alia.

A *Temperatum* autem temperamentum dupliciter dicitur; aut

1. *Simpliciter* & propriè, siue ad pōdus; aut

2. *Ad Iustitiam* in singulis generibus.

1. *Simpliciter* & propriè siue ad pondus (vt vocant recentiores) temperatum, id est, quod ad vniuersam substantiam collatum, & totius naturæ comparatione, medium ad vnguem extremorum & primarum qualitatem obtinet: paribus contrariorum portionibus coëuntibus, exacta que æqualitate permixtis constat. *Ευκτατον*, id est, benè temperatum istud appellatur. & in vniuersa substantia verè ac prorsus, pondereque medium habetur.

2. *In singulis* generibus, quod temperatum ad iustitiam vocatur, paritatem quidem exactam contrariorum in se non habet; sed eā mediocritatem decoram, quæ suæ naturæ debetur; & generi aut speciei maximè conuenit.

uenit. Quo tanquam numeris, omnibus absoluto, medio, ac temperatissimo omnibus facultatibus, ad quæ à natura sua ducitur, incorruptè fungitur. Veluti in hominum genere temperatam naturam, habere dicitur *ευσάρξος*, (Latinè benè carnosus) qui scilicet, nec gracilis, nec crassus dici potest: sed nec calidus, nec frigidus, nec alio nomine ex ijs, quæ defectum aut excessum significant.

B *Intemperata* temperamenta dicuntur, quæ à medio ac mediocri ad aliquod extremorum deficiunt. horum quædam sunt & dicuntur

1. *Simplicia:*

2. *Composita alia.*

1. <i>Simplicia</i> in-	{	Calidum	} cum humidi
temperata di-		Frigidum	
cuntur, in qui-	{		} litate.
bus vna tanum			
ex quatuor qua-		Humidum	
litatibus supe-	{	Siccum	} tione caloris
rat, vt vel			

• 2. *Composita* intemperata temperamenta vocantur, in quibus duarum qualitarum excessus est:

{	Calidum & siccum
	Calidum & humidum
	Frigidum & siccum
	Frigidum & humidum

Sub

Sub his autem intemperatis temperamētis, continentur omnium eorum naturæ ac temperies, quæ ab æqualitate ac medio recesserunt, & intemperata habentur; Dicuntur autem intemperata temperamenta

quandoque { *simpliciter* A
 comparatiuè. B

A *Simpliciter* autem, & absoluto sermone intemperata sunt, quæ medijs scilicet, quod in vniuersa substantia est respectu, talia existunt: vt cum lapidem siccum dicimus (nulli alteri collatum) quia in eo siccitas humiditatem superat ac vincit.

cum eiusdē generis symmetro siue temperato conferuntur; veluti si equus aut formica homini comparetur.

B *Comparatiuè*, & non absoluto sermone, idque trifariam, vel enim quando

cum eiusdem specie tantummodo medio comparantur: vt quando homo, qui ab *ἐὐκρασία* & mediocritate recessit temperatissimo confertur.

ad rem quamlibet obuiā, nō ad medium aliquod cōparantur: velut si homo stirpi alicui, aut equo cōferatur: vel animalia mortua cum se ipsis viuentibus.

TABVLA III.

De partibus humani corporis,

Partium nomine omnes humani corporis substantiæ meritò continentur, siue solidæ, siue fluidæ, quæ ad humani corporis constitutionem, functiones, & actiones omnis generis à natura comparatæ, homini ita cohærent & coniunctæ sunt, vt citra certam perniciem atque interitum totæ auferri aut separari non possint: sed nec vitari, mutari, minuique citra nocumentum, functionum noxam, actionum impedimentum queunt, quæ ad tria genera ab Hippocrate referuntur: nempe

1. ἰσχυρὰ continentia
2. ἰσχύμενα contenta
3. ὠρμῶντα impetum molientia.

1. ἰσχυρὰ autem siue continentes dicuntur corporis partes solidæ, quæ non vt humores ac spiritus diffluunt, sed corpori etiā mortuo adsunt. Continentes autem vocantur, quòd humores ac spiritus contineant.

2. ἰσχύμενα, id est, contenta appellantur, humores ac liquidæ fluidæque substantiæ, de quibus Tabula quinta & sexta.

3. ὠρμῶντα, hoc est, impetum molientia spiritus sunt, de quibus Tabula septima.

Aa

1. De

I. De solidis corporis partibus.

Partes solidæ sunt, quæ toti corpori cohærent, vitæque coniunctæ sunt, & ad illius usum functionesque comparatæ. Has solas, partium appellatione, non modò posteriores, sed & veterum plurimi dignantur. Quibus Spiritus ac humores idcirco ex partium numero non habentur, quòd nusquam hæreant, sed per venas & arterias motu ferantur.

Distinguuntur autem partes istæ dupliciter: & primò quidem

in partes { Similares $\delta\mu\omicron\iota\omicron\mu\epsilon\rho\epsilon\iota\varsigma$ A
 { Dissimilares $\epsilon\tau\epsilon\rho\omicron\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\varsigma$. B

De altera partium diuisione postea agitur, Tabula quarta.

A *Similares partes* siue $\delta\mu\omicron\iota\omicron\mu\epsilon\rho\epsilon\iota\varsigma$, id est, eiusdem naturæ dicuntur, quæ vna parilique substantia constant, & vndique sibi simili, in quæ cùm corpus vniuersum, tùm & membra eius (tanquam sensu minimis) dissolutio consistit. Quam ob causam simplices ac primæ non rarò dicuntur: quandoque verò & elementa. Harum autem partium

quædam { ex semine constant
 { à sanguine originem habent.

Ex

Ex femi-
ne constāt
quæ σπερ-
ματικῇ ac
feminales
ea de cau-
sa dicun-
tur: vt

1. Os

2. Cartilago

3. Nerui

4. Tendines

5. Ligamentum

6. Membranæ

7. Venæ

8. Arteriæ

9. Cutis interior

Robustiores
solidioresq;
hæ partes,
sunt, quàm
sanguineæ: &
quædam ea-
rum actionū
etiā instru-
menta. harū
autem si ali-
qua pars au-
feratur non
renascitur.

A sangui-
ne verò
originem
habent:
vt

10. Caro

11. Medulla os-
sium

12. Adeps siue
pinguendo.

Hæ autem par-
tes, si aliquādo
absumātur, re-
nascuntur.

1. Os, ὀστέον, durissima, solidissima, ac sic-
cissima pars, sensus (exceptis dentibus) ex-
pers, vniuerso corpori tanquam fundamen-
tum & basis, qua reliquæ corporis substan-
tiæ innitantur, subiecta.

Connectuntur autem ossa

per	{	Articulum	A
		γόμφωσιν	B
		Suturam	C
		Ἀρμόνιαν	D
		σύνφυσιν	E

A Per

A *Per articulum*
 siue ἄρθρον com-
 missuræ species,
 ἄρθρωσις, id est, co-
 articulatio nomi-
 natur. ad volun-
 tarium motum à
 natura ordinata,
 cuius modi sunt

ἐνάρθρωσις, Enarthrosis,
 articulationis species,
 in qua excipientis of-
 fis sinus profundus ad-
 modum est, caputque
 quod inseritur oblon-
 gum, vt qua femur cū
 coxa inarticulatur.

Ἀθρόδια Athrodia in qua
 cauum leuiter & in su-
 perficie tantum ex-
 sculptum est, & caput
 ossis depressum, quo
 modo tarfi ossa cum
 pedij ossibus coniun-
 guntur.

γίγγλιμος, quando ossa se
 inuicem ingredientia
 iunguntur, ita vt vni-
 us ossis gibba, alterius
 sinus subintret, & rur-
 sus vnus cauum alte-
 rius gibbum.

B γόμφωσις, cum os instar clauī infigitur,
 vt dentes maxillarum alueolis.

C Sutura siue ῥάφης, per quam capitis ossa
 committuntur.

D Ἀρμόνια dicitur, cum per simplicem li-
 neam, citra omnem sinus, aut as-
 peri-

PHYSIOLOGICES. 356

peritatis ingressum commissa stru-
ctura; vt superioris maxillæ ossa.

E *σύνφυσις* non aliud est, quam naturalis
ossium vnio, qua commissuræ spe-
cie appendices suis ossibus adnasc-
untur.

2. *Cartilago*, *χονδρὸς*, particula alba, læuis,
molliter flexilis, sensus medullæque expers,
solo osse mollior, reliquis omnibus partibus
durior.

3. *Nervus*, *νεῦρον ἢ τόνος*, oblongum teref-
que instar chordæ corpus, substantia medio-
criter dura constans, animalem à cerebro spi-
ritum & sentiendæ vim in omnes partes de-
ferens, & voluntarij motus instrumen-
tum.

Aa 3

Nervus

T A B V L Æ

Prima Syzygia ad oculos fertur, videndiq; spiritum, ipsis infundit; *πόροι ὀπτικοί* ac nerui visorij dicuntur.

Secunda in oculorum musculos, illorum præfecta motioni.

Tertia ad gustatum pertinet, complures in linguam propagines mittit, quæ in latitudinem fusæ tunicam eius constituunt gustandi sensum communicantes: nonnullæ verò in frontem, supercilia, maxillas, labiaque pergunt motum ijs suppeditantes.

Quarta in oris & palati vestientem tunicam degenerat.

Quinta in auditorium meatum, auditus sensui præsidet, & quibusdam ramulis ad aures temporumque musculos abit.

Neruo-
rum au-
A cerebro,
quorum
septē sunt
συζυγίαι,

Sexta interioribus corporis partibus tangendi sensum suppeditat, in multos diuisa ramulos, cuius quidam ramuli per costarum fines in lumbo-

rem origi-
nem ha-
bent, alij

Latinis
paria
aut cō-
iugia

lumborum interiores mus-
culos, & ofsis sacri extre-
mum abeunt: ramuli tenui-
bus ad interiora viscera di-
missis. Alij soporali arteria,
& iugulari vena primum co-
mitati, in pectus delabentes,
ad œsophagum inclinant;
tandemque ostiolo ventri-
culi impacti, in reliquum
eius corpus, per exiles ramu-
los funduntur. Ab hac pro-
pagine, vbi in thoracem ali-
quantulum descenderit, ori-
untur rami, qui retrò ferun-
tur ad laryngis musculos,
qui nervi reuersiui & recur-
rentes dicuntur.

Septima linguæ motioni præ-
fidet, fertur huius propago
vna, in villos musculorum
linguæ, quos multifariam
intexit: Minima in rectos
laryngis musculos; quædam
in lacertos, qui humeros
sursum adducit: alia quo-
que ad tonsillas & fauces
abit.

A spinali medulla, quæ à cere-
bro

Aa 4

bro originem ducens per vertebrae delapsa, tanquam caudex plurimis ramis fruticatur; in omnes corporis partes ramos & propagines fundens. A singulis siquidem vertebrae, singulae Syzygiae per corpus variè sparsae, motum voluntarium corpori suppeditant, Quae ab Anatomicis XXIX. numero traduntur.

4. *Tendo*, τένων, καὶ ἀπνεύρωσις, musculorum ossa mouentium finis; voluntario articulorum motui inseruit.

5. *Ligamentum*, σύνδεσμος, siue vinculum, neruosum praedurumque corpus, solidum & exangue, extrinsecus rotundo ambitu, articulos cingens, ossa copulans, firmissimeque colligans, ne motus agitatione luxentur aut diuellantur.

6. *Membrana*, ὑμὴν, ossium, musculorum, neruorum, & internorum viscerum omnium commune tegumentum, substantia tenui sed firma constans: vndique sui similis, motu expers, sensus tactus tamen compos, per quam viscera sensum accipiunt. Differt ab arteriarum, venarum, ventriculi, intestinorumque tunicis. Hæ etenim multis villis intertextæ sunt: membrana villorum nullum genus agnoscit.

7. *Vena*, teres ac fistulosum corpus, canalis modo

PHYSIOLOGICES. 360

modo cauum, molli simpliciue tunica contextum, sanguinis & humorum receptaculum: Ab hepate nascitur & in plures soboles diffunditur.

Venarum
autē caudices duo
sunt maiores.

vena porta, *σελεχιᾶνα*, ex Iocinoris caua nascitur; versus finistrum procedit, in multos digeritur surculos, quorum vna pars ad intestinum ieiunum: plurimæ ad mesenterium & omentum: quædam in ventriculum: aliæ in fellis vesiculâ: nonnullæ ad splenem feruntur.

vena caua, *χόιλη*, dicta, ex Iocinoris parte gibbosa procedit, mox in duas soboles diuisa, quarū vna ad superiores partes transiens, supra septum transuersum dextro cordis sinu commissa, inde in plures ramos multifariâ diuisa diffunditur. Altera ad inferiora in multiplices quoque diffusa propagines vergit: vtraque autem sanguinem & alimentum ab hepate ad vniuersum corpus detert.

Aa 5

3. Artic.

8 *Arteria*, vas membranaceum, teres, fistulæ modo cauum, duplici contextum tunica, quarum exterior mollis venarû instar, interior durior ac χονδροδής siue cartilaginea. A corde initium sumit, indeque in plures diuisa ramulos, per vniuersum corpus diffunditur, arterialem sanguinem & vitalem spiritum motu suo deducens ac distribuens per διαστολὴν autem arteria dilatatur, per συστολὴν contractior fit.

9. *Cutis*, δερμὰ haud dissimilem membranis conditionem sortitur, membranis tantò crassior, quantò vniuersi corporis moles amplior; paulò item rarior, crebris meatibus porisue peruiis, per quos corpus transpirat, & fuliginosa excrementa sudoresque expurgat. Huius extima superficies Græcis ἐπιδερμὶς dicitur, quasi summa cuticula.

Musculus
quid
io. *Caro*,
σάρξ, mol-
lis substā-
tia, veluti
nuper cō-

Musculorum, quæ propriè caro dicitur. tota sanguine madēs, quo plurima perfunditur, mediam villorum inanitatem implens ac infarciens, robur musculis ac molem adferens. Est autem Musculus corpus, media carne permixta.

Glandularum, ἀδενῶν, quarum ingens in corpore est numerus, quæ omnes ex crassa densa-

cret⁹ sanguis, solidioribus villis partibusque adnata & circumiecta. Carnium autem alia est

densaque materia, concreuerunt: veluti sunt quæ inguinū & axillarum cavitatem implent: & quæ sub iugulo summa parte pectoris reperiuntur, item hæ ex quibus πάχρεας, πάχρεας magna ex parte conditur. Glādulosum hoc est corpus in medio Mesenterio situm, viscerū diuisiones confirmans.

Viscerum, quam παχύχυμα nominant cuiusmodi est cordis, pulmonis, Iocinoris, Lienis, renūque substantia.

11. *Medulla* quæ in ossium cauernis reperitur, liquidi speciem referens, ossium est alimentum, quod à sanguine diductum tempore eius albescit, concoquitur, & sensim in ipsius naturam transit, propriè idcirco corporis pars solida non est.

Medulla autem quæ in spinæ fistula tenetur, non minus corporis pars est, quam cerebrum, à quo oritur.

12. *Adeps* siue seuum ex sanguinis pingui portione cum in animalis partes influens

influens in pulpam non conuertitur, à frigore cogente ac densante nascitur: Ideoque in frigidis tantum locis & corporibus inuenitur. Nec hæc corporis solida pars habetur, cum & per inediam, sanguinis & alimenti penuriam in vtile alimentum conuerti queat, nulla etenim pars solida alteram nutrit.

Pili &

Vngues non sunt quoque corporis partes: Neque enim ita coniuncti sunt, vt communi vita cum corporis partibus fruantur; nec os-
fium aut stirpium modo viuunt, nec incrementum in latum ac profundum accipiunt, sed materia quadam ad radices coniuncta, in longitudinem tantummodò proferuntur.

De partibus dissimilaribus.

B Dissimilares Græcis ἀνομοιομερεῖς ac ἑτερογενεῖς, dicuntur, quæ non ex partibus eiusdem naturæ componuntur, sed ex pluribus ac differentibus; appellantur verò hæ & ὀργανικὴ siue instrumentariæ siue officiales.

Harum autem duplex est genus

Quadam { minus } C
 { magis } } compositæ sunt D

{ Cerebrū ἐγκέφαλος, mollis candidaque substantia, qualis in vniuerso corpore non reperitur, ad cerebri actiones idonea.

Pulmo

Pulmo, πνεύμων, cuius caro mollis, fungosa
rara, levisq;, ac veluti ex spumoso san-
guine, aut spuma sanguinea concreta,
multis venarū arteriarumq; propagini-
bus intertexta.

Cor, καρδιά, dura carne cōpositū multisq;
fibris intertextum, quibus dilatatur ac
contrahitur.

Ventriculus, γαστήρ καὶ κοιλία, ciborū rece-
ptaculum, neruosum membranofum-
que corpus sortitur, quo promptè con-
trahi ac extendi possit.

Iecur, ἥπαρ, rubrū, molleq;, multisq; venis
intercursantibus cōtextū, nuper cōcre-
to sanguini simillimū, nisi durius foret.

Lien, σπλὴν, sanguini crasso nigroque simi-
lis, spongix modo rarus, frequentibus
vasorum fibris implicatur, melancho-
lici succi receptaculum.

Renes, νεφροί, duo, carnea, solida, dura, den-
saq; materia cōstantes, ad serosorū hu-
morū expurgationē à natura ordinati.

Testes, ὀρχις, horū substantia alba, lactea,
mollis, vnde quaq; sibi similis, nisi quod
venulis ijsque frequentibus oppleta sit.

Vterus, μήτρα Græcis, crassus impactus,
carneum quiddam præ se ferens, ceterū
neruosus membranofusque, vt in am-
plitudinem extendi posset. ad concipi-
endum fœtum à natura comparatus.

C Sim-
pliciores
& ex pau-
cioribus
composi-
tæ. & quæ
ad vnam
aliquam
actionem
compara-
tæ viden-
tur, sunt,
vt

Vesica, κύστις, pars membranosa, quæ latissimè distendi potest: & in valdè angustum contrahi. urinam à renibus excipit, ac foras mittit.

D Compositæ, ex pluribus & nō modò similibus,	Caput, κεφαλὴ, & κέφαλος, quod compositure ex	Cranij, κρανίου, ossibus, quibus includitur cerebrū, cuius membranæ duæ:	cutē super-tenfa.	vna tenuior, λεπτή μυνίνξ, tenuis Meninx, vulgò pia mater.
		Sensuum organis siue instrumentis, ut sunt	Oculi Nares Aures Lingua	altera crassior, παχὴ μυνίνξ, dura meninx, vulgò dura mater.
		facie, quæ & multas alias partes complectitur.	βρόγχος siue guttur in quo	παρίσθμια. tonsillæ ἐπιγλοσσῆς λάρυγξ
		Cervix, ἀρχή, ex tendinibus, vertebis, & alijs constans.	anterior σῆθος pectus in quo	foris mammillæ cōsistunt. interius Cor, pulmo, & aliæ partes conduntur.
		Thorax θώραξ cuius pars	posterior, ὠτός, dorsum cū suis partibus.	

sed &
dissimi-
laribus
alijs con-
stant: vt

venter, γαστήρ, pars cu- ius	{	anterior, ἐπιγάστριον, abdomen
		octo musculis compositum, sub quo
		ποσιτοναῖον, intra quod viscera continentur.
		Inferior, pubes, ἡβη, & genitales partes.
	{	posterior, ὀσφύες, Lumbi, & quæ eò pertinent.
Artus: vt sunt	{	Brachia cum ma- nibus
		Crura cum pe- dibus
		quæ ex mul- tis dissimila- ribus parti- bus compo- sita sunt.

TABVLA IIII.

De altera partium solidarum
diuisione.

Diuiduntur præterea & alio quàm supe-
riore modo, omnes humani corporis solidæ
partes, & quidam à Galeno artis Medicinalis
Cap. IX.

1. *Nonnulla principia sunt:*
2. *Aliquæ ab ipsis originem habent, atque
ipsis subministrant:*
3. *Quædam nec aliarum gubernationi præ-
sunt, nec aliundè gubernantur:*
4. *Reliquæ licet à seipsis originem habeant,
arterijs, venis, & nervis etiam opus
habent.*

I. Prin-

i. Prin-
cipes fi-
ue prin-
cipia
quæ alia
rum gu-
berna-
tioni
præfunt,

Cor, καρδιά, faculta-
tis, & spiritus vi-
talis fons: natura-
lis & insiti caloris
præcipua sedes.

Cerebrum animal-
um facultatum
cùm sentientium
tùm motiuarum
omnium origo,
animalis spiritus
sedes, & neruorū
principium.

Iecur, ἥπαρ, faculta-
tis naturalis & ap-
petitricis, vena-
rumque omnium
principium & pri-
mum generandi
sanguinis instru-
mentum.

Testes, ὄρχις, generationis &
propagandæ sobolis officina.
Hęc pars ad indiuidui conser-
uationem nō facit, sed ad spe-
ciei humanæ conseruationem
omninò necessaria; Ideoque
inter principes quartū locum
occupat.

Tres hęc par-
tes ad con-
seruationē
hominis
necessariæ.
Nobilissi-
mum Cor,
quòd ne mi-
nimam of-
fensam ci-
tra vitæ dis-
pendiū ad-
mittit: dein-
de cerebrū;
tertio loco
Iecur quod
cum mino-
re pericu-
lo offēditur
aut lēditur.

Sub-

PHYSIOLOGICES.

367

Subministrantes ipsis principijs, quarum nonnullæ ab ipsis originem ducunt: ut

Cerebri
ministri
sunt

Nerui sensitiui, sensum singulis organis distribuentes.

Nerui motiui
Musculi
Tendines

} motui voluntario ministrantes.

Cordi
famulatur

Aspera arteria, τραχὴς ἀρτηρία, fistula à faucibus usque ad pulmones protensa.

Pulmo qui aëre quo refocillatur cordi præparat.

Arteriæ vitales spiritum & sanguinem per corpus diffundentes.

Ventriculus cibum potumque in chylum conuertens.

Vena porta, quæ & σπληνικὴ, & πύλη dicitur, per mesaræi venas, chylum ad hepar deferens.

Iocino-
ri sub-
mini-
strant.

Vena caua, κοιλὴ, sanguinem per vniuersum corpus diffundens.

Renes serosum humorem ex sanguine expurgantes & attrahentes.

Vesica aquæ superfluitatis receptaculum.

Intestina ad concoctionis, quæ in ventriculo perficitur excrementorum expulsionem destinata.

Testibus
autem sub-
seruiunt.

Vasa seminaria, materiam gignendo semini aptam suggerendo.

Uterus in mulieribus, virile semine concipiens ac retinens.

Bb

3. Quæ

3. Quæ aliarum gubernationi non præfunt, nec aliunde gubernantur, sed insitas à natura potentias habent, quibus reguntur, sunt

Os
 Cartilago
 Vinculū siue
 ligamentum
 Membrana
 Adenes
 Caro simplex.

4. Reliquæ quæ & à seipsis gubernantur, ac arterijs insuper, venis, nervisque egent, dissimilares compositæ sunt, quæ ex similibus, & principum partibus ministris variè componuntur.

T A B V L A V.

De humoribus.

Humor generali nomine apud medicos liquidam substantiam significat, quam Græci ὕγρον. Quo nomine vniuersum substantiæ genus significatur, quod in corpore profluens existit, siue chylus, siue muccus, siue sanguis, siue pituita, siue bilis, siue vrina, siue sudor, siue aliud quoddam in corpore, liquidum ac humidum. Atque cùm hoc omne varium multiplexq; sit, necessum est in species diuidi distribuique.

Sunt igitur
 humorum
 quidam

{ Naturales ad naturæ functiones
 vtilis: A
 Supernacui ac inutiles. B Tabula sexta.

A. Natu.

PHYSIOLOGICES. 369

A *Naturales* ad nutriendum sustentandū corpus vtilis; & ad naturę functiones idonei.

Horum alij { *primi:* C
secundarij: D

C Primi humores sunt in quos assumptū alimentum prius necessariō conuertitur, quā in substantiam ac naturam corporis transire queat; quamobrem & prægredientes quandoque dicuntur. Hi autem omninō quatuor sunt:

1. *Sanguis*
2. *Bilis flava*
3. *Pituita*
4. *Melancholicus humor.*

I. Sanguis autem intelligitur

quandoque { *proprie* A
generaliter. B

A Proprie quando accipitur, purus & solus nulliq; alteri humori permixtus sanguis intelligitur. qualis præcipuē in corde residet, si in hominis corpore continetur. Hic autem pulcherrimus, colore rubens, consistentia mediocris, prauo odore carens, dulcedine præditus, temperatura calidus & humidus, faciens quotiens in miscella humorum redundarit, homines blandos, moderatos, venustos, floridos, carnosos: viget in adolescentia, & ex anni temporibus in vere.

Bb 2 B Gene

B *Generaliter* siue cōmixtus & ex quatuor humorum mistura cōpositus: qualis est humor in arterijs & venis contentus, qui nō solum sanguinis, sed & pituitæ, & bilis & atri humoris particeps est. Et hæc omnia inter se, quam diu vita super est, continet. Qui quidam ex miscella quatuor humorum confusus, à prædominante in eo sanguineo humore, sanguis generali nomine dicitur: & erit quidem

Optimus & maximè naturalis, colore rubens, substantia mediocris, puri videlicet sanguinis naturā, colorem, & substantiā referens; si iustam & temperatam humorum proportionem & harmoniam seruauerit. Seruabit autem si purus sanguis multum antecellat, cæterisque humoribus præstet; ab hoc deinde pituita redundet; tertio loco melancholicus succus; & omnium paucissima sit flaua bilis.

Non optimus, cū humor quispiam in eo iustam commoderationē excesserit, qui à superante dicitur aut

Biliosus,
qui flauus
& cōsistentia iusto
tenuior:

Pituitosus
liquidior
& albidior:

Melancholicus crassior ac nigrior.

2. *Bilis*

2. *Bilis* colore flaua, substātia tenuis, mordax, amara, calido siccoque temperamento prædita, æstate viget, & in iuuenibus, ac ætate consistentibus. Huius

Vna pars cū sanguine in venis & arterijs meat, vt affines naturæ suæ partes nutriat, tum & reliquo sanguini trāsuectionis prōptitudinem adferat, in quo plus iusto redundans homines efficit macilentos, duros, ficos, calidos, agiles, & iracundos.

Alia pars ad fellis vesiculam amandatur, vt ad excrementorum deiectionem incitet atque extimulet; lentamque intestinis adhærentē pituitam detergat.

Bb 3

3. *Pitui-*

3. *Pituita* frigida
& humida, sapore
dulcis, aut potius
ἀπώριος, ac saporis
expers, veluti aqua,
sola concoctionis
integritate à sang-
uine distat, sanguis
nempè ex dimidio
coctus. Hyeme au-
tem hæc excellit, &
in infantia, præci-
puè in pueritia;
quamquam & per
accidens in decre-
pita: Quæ aut

Per venas cū alijs mix-
ta humoribus fertur,
tūm vt humidis &
frigidis partibus ali-
mentum ministret,
cuiusmodi cerebrū
est, tūm vt si penuria
aliquando sanguinis
adsit, in eum conuer-
sa reliquis etiam par-
tibus in alimentum
cedat, Miscellæ mo-
dum temperatū hæc
excedēs, corpus red-
dit crassum, pingue,
candidum, molle; ho-
minesque segnes &
somniales.

Ad artus & iuncturas,
vt ipsis motus prom-
ptitudinem præstet,
ipsoque madefaci-
at, ne ob motus calo-
rem aut attritum, re-
siccatio quædam ip-
sis inde accidat, quæ
motus facilitatē im-
pediat.

4. *Niger*

4. *Niger* siue
Ater, & Melan-
cholicus humor,
qui imppriè atra-
bilis dicitur, fa-
cultate frigidus ac
ficcus, colore ni-
ger, substantia
crassus ac terre-
stris: autumnō po-
tissimum viget, &
in senibus, fertur
autem huius

Vna pars cum sanguine
& alijs humoribus in
venis, vt solidiores
corporis ficcioresque
partes, veluti ossa, nu-
triat. Hic autem in ve-
nis cæteris humoribus
antecellens homines
gignit tristes, cogita-
bundos, corpore gra-
cili, macro ac frigido.

Altera ad Lienem ipsi
fomentum & alimen-
tum suppeditans: tum
vt ab ipso in ventricu-
lum effusa, ciborum
appetentiam excitet,
& eos exquisitè retine-
ri donec concocti sint
cogat.

Bb 4

De

D De secundarijs humoribus.

Secundarij appellantur humores, qui ex prioribus varia concoctione permutati per cœcos viuentis corporis recessus, ad similarium partium alimentum destinati sunt, & tandem in earum substantiam conuertuntur. Qui & idcirco alimentarij dicuntur:

Primus is est, qui in exilibus venis arterijsq; continetur, hinc mox in vacua spacia influxur⁹. Constat hic ex sanguinis portione concoctione elaborata.

Alter, qui in partis substantiam diffusus, propius singulis adducitur; nondum tamen agglutinatus, sed roris modo, vt Galenus ait, per eas spargitur.

Tertius, qui circa villos concreescens, ceu proximum partis alimentũ, illis connectitur, ac agglutinatur.

Quartus, ceu concretus liquor, solidis fibris adherescit; iam moles similis partis

Tres hi ad partium similarium substantiam nondũ pertinent, sed varia commutatione tandem in corporis naturã cõmigrant.

Sunt autem hi quatuor

tis factus. Carnosam substantiam, & nonnulli carniformem humorem, hunc appellant. Videre autem istum manifestè licet in carnibus, dum igni torrentur. liquatus siquidem plurimus diffluit ac in prunas largiter fertur.

De humore primigenio ac calido innato.

Præter hos verò est & alius humor pinguis ac oleosus in solidiore corporis substantia situs, à quo partium robur ac firmitas existit, qui primogenius humor, natiuus humor, salutare ac vitale humidum, & à nonnullis humidum radicale appellatur, caloris ac spiritus innati fundamentum ac sedes. Est siquidem & quoddam calidum innatum, ac omnibus animantibus insitum, cuius beneficio viuunt, aluntur, augentur, sustinentur, procreantur, sentiunt ac mouentur. Huic subternitur tenuissima quædam substantia, spiritus videlicet innatus, ac vitalis, obeundarum functionum instrumentum. Quæ sic sibi inuicem cohærent, vt Calidum innatum humidum dicatur primigenium insito spiritu ac calore vndique perfusum. In hoc calido ac humido hominum animantiumque omnium vita consistit, hoc deficiente animal quoq; deficit.

Calidum
innatū.

T A B V L A V I.

B De superuacuis humoribus.

Supernacui appellantur, humores ad nutriendum sustentandumque corpus inutiles. Horum autem

Vrina tenuis liquor, eiusmodi ferè quale in lacte serum: in locinore gignitur, atque cum sanguine, veluti eius vehiculum in venam cauā influit: hanc renes à sanguine secernentes ad vesicam per vreteras transmittunt, quæ eam colligit ac feruat, donec copiâ extimulata ipsam profundat.

In corpore secundum naturam habente naturaliter & necessario proueniunt. quæ excrementa natu-

Alij

Sudor tenue quoque humidum, quale nimirum illud, quod ex venis in vesicam influit: in singulis nascitur, partibus ex ipso quo aluntur succo. Huic nullus à natura

ralia idcirco
nominantur,
vt:

tura præscriptus est
meatus, sed per πό-
ρος, hoc est, exiguos
corporeæ molis me-
atus, quorum tota
cutis est plena, ex-
pellitur.

A causis præter naturam gignuntur,
qui vbi in corpore coaceruati fue-
rint, naturæ multis modis molesti,
morbos procreant. Horum autem
origo ex primis quatuor est humori-
bus vitiatis & à naturæ modo per-
mutatis, ac in nõ conuenientem sub-
stantiam conuersis: vt sunt

1. *Sanguis vitiosus:*
2. *Pituita deprauata:*
3. *Bilis à natura sua permutata:*
4. *Melancholicus humor adustus.*

1. *Sanguis*

ex permutatione, in ipso genitus est vi putredinis, aut aliarum causarum vehemētium impulsu. Dum enim corrumpitur pars eius tenuissima simul ac pinguis in flauam; crassior verò in atram vertitur hilem

i. *Sanguis* venarum & arteriarum vitiosus redditur, cum alio quopiā extraneo humore perfunditur, qui aut

ab influxu aliorum humorum, qui vel ex Iocinore, fellis vesicula, liene, alijsuè partibus in venas influxerunt. hic ex multis permixtus & variè compositus, complures sortitur differentias, pro humorū qui illabuntur varietate.

2. *Pitui-*

In venis

Acida facta, quæ summè quidem est cruda, & præter primam in ventriculo alterationem eamque imperfectam, vix ullam aut minimam præterea concoctionem accepit.

Salsa reddita, aut ex dulci pituita putrescente, vel ex seroso tenuisq; humoris admixtione talis facta.

Tenuis & aquosa, qualis plerunq; aque modo è naribus stillat, aut à cerebro in plurimas corporis partes effunditur.

Mucosa ac mucco similis, quæ calore corporis cogente, ex tenui crassior reddita est.

Extra
venas
facta

Vitrea, ac vitro fuso substantia ac colore similis, mucosa, crassior ac frigidior, quæ in locum aliquem impacta, maximos excitat dolores.

Gypsea, crassa admodum ac dura, qualis quandoque in articulis cernitur, in quibus post præcedentes destillationes, tenuioribus humorum partibus resolutis, huiusmodi relinquitur. quæ tandem in extremam tophi & calculi duritiem euadit.

3. *Bilis*

T A B V L Æ

Pallida ex admixtione tenuis ac serosi humoris, syncera, tenuior, ac mitior; quo plurimo affuso, ad serosorum humorum etiam naturam accedit.

Vitellina siue λευκωδής ex flauabile aut pallida, dū caloris non naturalis acrimonia vehementius coquitur, ac quasi torretur, sic vt inde, ex tenui substantia crassiorem consequatur, & color eius intendatur, crudi lutei ouorum speciem & crassitudine & colore referens.

Vna ex atro siue melancholico humore profertur; quando putredinis aut caloris ardore, quasi in cinerem vertitur.

Hæc species acris & mordax est, hoc discrimine à Melancholico succo dissidens, quo fex vsta à non vsta.

permu-

Intra venas facta

3

Bilis à natura sua

Atra, quæ

permutatur:

duplex

Altera ex bile quā vitellinam nominant, per summam exustionem hæc fit, & tantò priore malignior, quantò bilis atro humore est acrior. Hæc in terram impacta fermēti modo effervesceat, & crassitudine sua parti alicui adhaerescens, eam accendit & exulcerat. Semper autem hæc, siue per aluū, siue vomitū in perniciē excernitur:

extra venas

πρασοειδής, porri colore referēs: ἰώδης æruginea ab æruginis similitudine: ἰσατρώδης, colore cæruleo glastū referēs.

Proueniūt hæc potissimum in ventriculo, & sæpe numero ab esculentis vitiosis & mali succi. Conuertitur verò in has quandoq vitellina in ventriculū effusa ex loci frigidity aliū colorem cōtrahēs.

* *Melancholicus* humor caloris non naturalis odore in atram bilem (vt paulò antè dictum) conuertitur,

TABVLA

T A B V L Æ
T A B V L A V I I.

De spiritibus.

Spiritus aërea, tenuis, & pellucida est substantia, caloris naturalis sedes, facultatum vehiculum, primumque obeundarum facultatum instrumentum, qui dum per uniuersum corpus diffunditur, à tribus ceu fontibus, principatum obtinentibus partibus, manat: corde videlicet, cerebro, ac hepate, qui pro harum partium numero, triplicem quoque differentiam obtinet.

Spiritu enim alius

Vitalis, qui à corde initium ac originem sumens, in sinistro eius sinu potissimum relidet, innati siue insiti caloris naturalis præcipua sedes, cordis & arteriarum pulsus, causa.

Animalis, qui in cerebri ventriculis à vitali gignitur, atq; inibi sedem habet. hinc verò per nervos motiuos ac sensitiuos distributus, omnes corporis partes motus ac sensus compotes reddit.

Naturalis à Iocinore proficiscens, per venas cum sanguine, in extremas corporis partes diffunditur, generationis, nutritionis ac incrementi auctor, qui quia vsque adeò sensu percipi non potest, nonnulli non modò dubitan-

bitanter affirmant; sed & in corpore esse pernegant. Qui singulis corporis particulis, vim quandam attracticem adesse aiunt, qua alimentum ad se, absque spirituum subsidio, pertrahant; haud aliter quam Magnes ferum. Verum si vis vlla demonstrationis, neque omnia sensuum iudicio æstimanda sunt, si qua in Iocinore communis admittitur facultas, illinc quoque Naturalem spiritum dimanare consequens est, qui huius distribuendæ sit vehiculum.

TABULA VIII.

De facultatibus & actionibus.

De partibus quibus humanum corpus cōpingitur, superioribus tabulis actum est. sequitur vt quales, & toti & singulis partibus ad agendum aut patiendum facultates adsint explicetur.

Quandoquidē autem facultatibus actiones siue operationes earum ita cohæreant, vt vnus ex alterius notitia cōparetur, de vtrisque pariter agendum est: facultatem etenim actio sequitur, & omnis actionis facultas siue potentia causa est. 1

Facultas autem animæ quædam vis insita ac propria est, qua ad proferendas actiones ipsa vtitur.

Facultas.

Cc

Actio

Actio

Actio autem siue functio, motus quidem est à facultate procedens, quam *ἐνεργίαν* Greci, Latini quandoque & operationem appellant.

Facultatum autem tres sunt species, quot videlicet animæ partes. Sunt autem hæ tres: vt Tabula secunda scriptum:

1. *λογιστικὴ*, ratiocinatrix, omninò diuina:

vtraq; hæc affe-
ctibus obnoxia
& irrationalis:
& non sedibus
tantum sed &
functionib; dis-
sident.
2. *θυμοειδὴς*, irascibilis
3. *ἐπιθυμητικὴ* concupiscibilis

3. Concupiscibilis in Iocinore residet, quæ ad singula, quæ appetit, animal pertrahit, & voluptates corporeas concupiscit: vnde & appetitrix anima dicitur.

Appetit autem quod cupit:

Attrahit quod elegit:

Annuat ad id quod sibi suppeditari cupit:

Expellit & abs se reijcit quod ingratum est & voluptate caret.

2. Irascibilis in corde sedem habet:

1. Ratiocinatrix cerebrū occupat, hæc affectus moderatur & coërcet.

Appellantur autem facultates siue potentia istæ

Concupis-

<i>Concupiscibilis</i>	} quidem	{ Naturalis Vitalis Animalis	} quas con- sequuntur actiones	{ Naturales Vitales Animales.
<i>Iracibilis</i>				
<i>Ratiocinatrix</i>				

De facultatibus naturalibus.

Naturalis facultas ea animæ potentia est, quæ generationem, auctiōem, nutritionē, (& si quæ sunt alia appetentis animæ opera) producit, non animantibus modò, sed & stirpibus omnibus communis; quæ ab hac sola reguntur, viuunt, ac vegetantur. Diducta autem est Naturalis facultas, in tres alias, quæ sunt

- | | | |
|----------------------|----------------------|---|
| 1. <i>Generatrix</i> | } quarum
actiones | } <i>Generatio</i>
<i>Auctio</i>
<i>Nutritio.</i> |
| 2. <i>Auctrix</i> | | |
| 3. <i>Nutrix</i> | | |

1. *Generatrix* facultas producendæ nouæ substantiæ potentia est. Motio verò ipsa nouam substantiam produciens *Generatio*, actio videlicet generatricis.

Generatrix autem facultas simplex non est, sed ex duabus alijs componitur:

videli- } *Alteratione*
cet ex } *Formatrice*

Alteratrix primæ substantiæ (ex qua generatio fit) commutatio est, & in idoneam conuenientemque ipsius, quæ generatur materiam conuersio.

Cc 2

Forma

Formatrix verò est, quæ formam toti corpori & cuique parti congruam effingit: vt hominis staturam erectam: condecentem partium ac membrorum omnium compositionem: ventriculi cavitatem: intestinorum inter se plexum; & alia his similia.

Harum autem duarum facultatum actiones sunt.

Alteratricis { quidem { *Alteratio* } quibus
Formatricis { *Formatio.* } duobus
 omnis generatio siue procreatio absoluitur. Dum enim substantia quæuis in aliam transmutatur, propriæ essentiae mutatione subit: veluti quando ex semine genitali & sanguine os aut neruus, vel alia pars generatur: simul verò & in conuenientem naturæ figuram effingitur.

Principatum autem hæc præcipuè obtinet, quo tempore foetus in vtero gestatur. huius autem ministræ sunt & auxiliares, ad generationem requisitæ,

Auctrix

Nurix.

2. *Auctrix* siue augendi facultas, quæ genita sunt in omnem partem ac dimensionem extendit & profert. Ipsa autem eius functio siue actio *Auctio est*: Nempe corporis in longum, latum, & profundum simul, secundum naturalem proportionem incrementum & amplia-

ampliatio. Augeri enim tunc corpus dicitur, non quando carnis ac pinguedinis moles & tumor dilatatur, sed ubi incrementum solidiores corporis particulæ accipiunt: ut sunt venę, arteriæ, nerui, cartilagine, membranę, ligamenta, maximeque ipsa ossa, ad quæ potissimum incrementi ratio pertinet. Hęc edito partu (sensim languescente generatrice, ut quæ mox ab editis dentibus cessat) usque ad ætatis vigorem dominatur; eousque videlicet, dum ad magnitudinis constitutum modum corpus sit prouectum. Auxiliaris verò huius ac ministra,

Nutrix.

3. *Nutrix* siue altrix facultas alimentum assumptum, in corporis substantiam varia mutatione conuertit & assimilat. Restaurat hęc, quod assidua corporis resolutione deperit, & ad usque extremum vitę diem permanet. fit tamen ætate languidior ac imbecillior. Huius autem actio *Nutritio* est, quæ citra ampliationem ac incrementum solidarum fit partium & triplex est:

Vna priorem corporis habitum conseruat:

Altera minuit & extenuat:

Tertia saginat & amplificat.

Nutricis autem facultatis auxiliares, ac quæ illi parent ministrę, quatuor sunt:

Cc 3

1. *Attra-*

1. <i>Attractrix</i>	} quarum } actiones	<i>Attractio</i>	} alimē- } ti.
2. <i>Retentrix</i>		<i>Retentio</i>	
3. <i>Concoctrix</i>		<i>Concoctio</i>	
4. <i>Expultrix</i>		<i>Expulsio</i>	

1. *Attractrix* convenientem cuique parti-
culæ succum, & idoneum alimen-
tum attrahit simul & appetit:
2. *Retentrix* facultas, quod attractum est,
retinet, continet, ac conseruat, vt eo
natura vtī ac frui posset:
3. *Concoctrix*, quæ & alteratrix dicitur,
idipsum alimentum interea dum
retinetur, cōficit, mutat, & in con-
uenientem ac idoneam ei, quod nu-
tritur, substantiam conuertere la-
borat:
4. *Expultrix* inutile & ad corporis nutri-
tionem alienum, haud idoneum, &
super vacaneum segregat & ad exi-
tum propellit.

Sunt

Sunt autē
harum fa-
cultatum
ministra-
rū ac nu-
trici sub-
seruenti-
um quæ
dam

Communes ad
totius corporis
omniumque par-
tium nutritionē
deseruietes, quæ
in partibus ac in
strumentis nutri-
tioni dicatis resi-
dent, quarū quæ
dam

Singulares, quæ
Tertiæ inter mi-
nistras dicuntur,
& singulis parti-
bus propriæ. hu-
ius autem partes
sunt

Primæ
quæ ab-
soluuntur in

Secun-
dæ quæ
fiunt in

Apponens ali-
mentum attra-
ctionis finis ac
perfectio:

Agglutinās, quæ
per retentionē
fit, & conco-
ctricis quoddā
est initium:

Assimilans, quæ
per absolutam
cōcoctionē, ali-
mentique in pro-
priā substantiā
cōuersionē fit.

Oesophago ac sto-
macho, qui alimē-
tum appetunt &
attrahunt:

Ventriculo, qui re-
tinet & cōcoquit:
Intēstinis, per quæ
superflua excre-
mēta expurgantur:

Venis mesenterij,
Mesaraicis dictis,
quæ chylū attrahunt:
Iocinore, quod re-
tinet, & in sangui-
nem chylum con-
coctione cōuertit:
Venis emulgenti-
bus ac

Renibus, quæ sero-
sum excrementū
attrahunt & ad
vesicam ablegant:

harum actiones

Appo-
sitio.
Agglu-
tina-
tio.
Assimi-
latio.

De

De facultatibus animalibus.

Animalis facultas, animæ vis est, sensum
& motum præstans, solis animalibus indita:
vnde & animalis dicta. In cerebro sedem ha-
bet, per nervos verò in vniuersum corpus di-
stribuitur. Partes huius, ex Galeni sententia,
tres sunt:

1. αἰσθητικὴ, externa sentiens:
2. κινητικὴ, motrix siue mouens facultas:
3. ἡγεμονικὴ, rectorix, siue princeps, quæ &
cognoscens dicitur.

Videndi, in oculis residens,
colores qui rebus per sum-
ma insident excipit; eadem
de rerum magnitudine &
forma iudicium promit:

Audiendi, per aures sonos cō-
prehendit:

Odorandi, quæ per narium du-
ctus, cum aëre rerum hau-
stos odores percipit:

Gustandi linguæ insidens sa-
pores rerum internoscit:

Tangendi vis non vno aliquo
organo conclusa, sed per
vniuersum corpus sparsa,
toti corpori, tum & aliarum
facultatum instrumentis cō-
munis, Hæc de omnibus
corpo-

1. Externa
sentiens in
alias distri-
buitur, vt in
facultatem

corporum tractabilibus qualita-
tibus cognoscit, quæ non vno no-
mine, sed multorum pugnanti-
um contrarietate continentur;
quorū extrema sunt: calor frigi-
ditas: humiditas siccitas: durities
mollities: asperitas læuitas: quæ
sub vnius tactus iudicium veni-
unt.

Actiones harum
facultatum sunt { *Visio*
 Auditus
 Odoratus
 Gustus
 Tactus.

De facultate motrice.

2. Mouendi facultas in quamuis partem
motum (quæ ipsius actio) animali suppedi-
tat, vt quæ bona & vtilia consecretur; tristia
verò & aduersa fugiat. Instrumenta huius
sunt, nerui originem ducentes à cerebri par-
te posteriore, vel à spinali medulla; tum &
musculi tendinesque, qui ab his oriuntur:
Motus videlicet voluntarij, qui animalis di-
citur, non autem eius qui naturalis dici-
tur.

Cc 5 Motus.

Motus
vitalis

Motus siquidem duplex

Vnus, qui sentientis ac cognoscentis animæ arbitrio per nervos regitur, quæ sedari & excitari pro voluntatis arbitrio contingit: unde voluntarij appellationem accepit.

Alter non à consilio aut voluntate; nec per voluntarij motus instrumenta perficitur, sed sua sponte incitatur, quem naturalem idcirco vocant: ut sunt cordis & arteriarum. Hunc Galenus, quia à vitalis functionis fonte, ipso nempe corde, procedit ζωτικόν, id est, vitalem dixit.

De rectrice siue cognoscente facultate.

3. *Rectrice* siue cognoscentis facultatis, auctore Galeno, tres sunt species, pro numero videlicet manifestarum ac evidentium actionum, ab his prodeuntium, quæ tres quoque sunt: ut

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Imaginatrix | } quarum } actiones | { Imaginatio
Cogitatio
Memoria: |
| 2. Cogitandi vis | | |
| 3. Reminiscendi potentia | | |

in quas veluti species interior cognoscendi potentia, siue, ut Græci ὑγεμονικὴ, diducta est.

1. *Imagi-*

1. *Imaginatrix*, φανταστικὴ, omnia sensu exteriorē recepta, apprehendit, & à ministris veluti nuncijs sensibus per ipsorum organa recipit, rerumque imagines extrinsecus allatas & ante se positas contemplatur.

2. *Cogitandi* vis διανοητικὴ, versando ac voluendo, ea quæ imaginatio attulit, & recordatrix recondita habet, quid fugiendum aut amplectendum sit inuenit: & de rebus omnibus iudicium promit.

3. *Recordatrix*, μνημοειδικὴ, siue reminiscendi potentia, formas & imagines rerum, quas sensus præbuerunt, excipit, continet, recondit, & in se veluti consignat. His omnibus in homine imperat, 'diuina illa animæ pars λογιστικὴ, id est, ratiocinatrix dicta.

λογιστικὴ

De vitali facultate.

Vitalis facultas in corde residet, vbi & θυμὸς δὴς siue Irascibilis animæ pars; Sola hæc vitam corpori suppeditat & motionum ζωτικῶν, id est, vitalium causa est. Hæc enim eius propria actio: non vt corpus alat, aut sensum motumque administret: sed vt vitam & integritatem conseruet; corruptionem ac putredinem arceat.

De

T A B V L Æ
De actionibus.

Actionum, vt antè scriptum est, tot sunt genera, quot effectricium facultatum; proinde qui facultatum meminit, actiones ignorare non poterit. Idcirco & nihil de his adferendum; nisi quod considerandum restet: duplices omninò actiones esse, &

Nonnullas perfici	{	<p>ab vna facultate, vt visus, auditus, odoratus, nutritio. & eiusmodi aliæ:</p> <p>à duabus, videlicet quæ & à natura & voluntate pariter reguntur: vt cibi deglutitio: vrinæ & alui excrementorū egestio; & similes.</p>
----------------------	---	--

T A B V L A I X.

De accidentibus proprijs
hominis.

Accidentia propria hominis nuncupamus, quæ humano corpori, præter substantiam ex qua consistit, necessitate quadam perpetuo coniuncta sunt, vt sunt:

I. Temperamentum, de quo Tabula secunda.

2. Cor-

2. Corporis & singularum partium	Forma, in qua consideranda	Figura aut	bona	mala: vt in	varis, varijs: fractura malè curata: callo emnente.	Quæ autem forma magnitudo, numerus, constructio ac cōnexio, partium humani corporis iusta ac condencens, in Anatomicis requirendū est.
	Magnitudo	partiū aut	asperitas, læuitas:	angustia laxitas.		
	Numerus	maior æqualis minor.	superfluus æqualis minor.			
	Constructio	situs connexus				
	Color per quem & de temperamento, & cuiusque sanitate aut aduersa valetudine, iudicium subinde promitur.					

3. Aetas, de qua Tabula num. 3. sequente.

4. Sexus { virilis, qui calidior ac sicciior:

femininus, frigidior ac humidior

5. Locus siue regio, vide Tabulam num. 5. subsequentem.

Num. 3.

T A B V L Æ

	Infantia vsq; ad tertium aut quartum an- num:	
	Pueritia, quæ ad X. aut XII. se extendit:	In his humidita- tis & caloris ex- cessus est, maxi- mè in infantibus, dein in pueris:
Adolescen- tiam cuius partes sunt	Pubertas, ἡλικία, à pueritia ad usque XVIII. annum:	in pubertate mi- nuitur; plus verò in adolescentia.
	Adolescētia to- tius huius eta- tis appellatio- nem sortita ad XXV. eta- tis annū pro- ducitur.	Manente tamen humidi excessu, quo perfundi po- stulant quæ cres- cunt & adoles- cunt.

Num. 3.

Ætas, quæ

Iuuentutem siue florentem ætatem, quæ cir-
ca annum XXXV. expirat, quo tempore confi-
stendi tempus, ἀκμή, siue status vitæ humanæ esse
creditur. Hæc in humido ac sicco temperatissima
ætas est: calorē autem non habet, vt Galenus vult,
prioribus ætatibus maiorem, sed acriorem: Cali-
da & sicca dicitur non simpliciter, sed ad puero-
rum ætatem comparata.

Maturam ætatem iuuentuti succedentem, &
in duas inde annorum septimanas extenditur.
Initium habet declinationis, sed non manifestū,
à Græ-

dividitur in

à Græcis παραχμαστική; Latinis ferè constans: ab alijs ἀνδρία, id est, virilis, dicitur, In hac ætate calidum minuitur, & corpus siccus redditur. maior tamen caloris, quam siccitatis excessus.

Senectutem, quæ triplex est:

Prima senectus siue ingrauescens ætas ad LX. extenditur, in qua degentes πρεσβῦται, Latinis senes dicuntur, & ὠμογέροντες, id est, virenti senecta præditi:

Altera, senium LXX. terminatur, hos γέροντες, Latini seniores dicunt:

Tertia decrepita ætas, exitu vitæ terminatur, qui ad hanc peruenerunt à Græcis πεμπέλοι vocantur.

Frigidi ac sicci in his excessus est, maximè in decrepita, quæ omnium frigidissima ac siccissima. Homo enim cum nascitur calidissimus & humidus; cum verò senio extinguitur frigidissimus ac siccissimus: solidis quidem partibus, existit.

Num. 5.

TABVLÆ PHYSIOLOGICES.

	Calida ac sicca		homines: graci- les, macilentos, agiles, tempera- tè biliosos.
Num. 5.	Calida & humida		magnos, proce- ros, carnosos, sanguineo hu- more perfusos.
<i>Locus sine</i> regio, p quorum diuersa natura humana corpora mutatio- nem sub- eunt. si- quidem	frigida & sicca	significat	candidos, mole corporis haud grauatos, perti- naces: cuiusmo- di Asiatici Scy- thæ esse feruntur.
	Frigida & humida		magnos, ping- ues, carnosos, triuentres, defi- des, somnolen- tos.

TABVLARVM PHISIO-
logiæ Finit.